

Annexe 5/Tableau 2 : Dose d'exposition - Marmotte commune

Substance d'intérêt	LSIC95% (valeur déterministe) (mg/kg/d)	Moyenne (valeur probabiliste) (mg/kg/d)	Écart type (mg/kg/d)	Minimum (mg/kg/d)	Maximum (mg/kg/d)	Coefficient de variation (%)
<b>Hydrocarbures aromatiques polycycliques</b>						
Benzo(a)pyrène	1,73E-02	7,23E-03	1,21E-02	6,61E-05	1,32E-01	167
Naphtalène	3,53E-03	1,64E-03	1,59E-03	3,26E-05	1,12E-02	97
<b>Métaux et inorganiques</b>						
Arsenic	1,13E-02	8,04E-03	9,01E-03	2,75E-04	8,51E-02	112
Baryum	5,09E-01	4,43E-01	2,64E-01	4,52E-02	1,97E+00	60
Chrome (VI)	2,25E-03	1,50E-03	8,29E-04	2,47E-04	5,29E-03	55
Cuivre	1,71E-01	1,32E-01	1,50E-01	1,29E-02	1,50E+00	113
Plomb	2,92E-01	2,22E-01	2,49E-01	1,19E-02	2,20E+00	112
Zinc	2,78E-01	2,38E-01	1,78E-01	2,86E-02	1,78E+00	75

Légende

LSIC95% : Limite supérieure de l'intervalle de confiance à 95 % sur la moyenne.