

Annexe 6/Tableau 1 : Indice de risque - Écureuil gris

Substance d'intérêt	LSIC95% (valeur déterministe) (mg/kg/d)	Moyenne (valeur probabiliste) (mg/kg/d)	Écart type (mg/kg/d)	Minimum (mg/kg/d)	Maximum (mg/kg/d)	Coefficient de variation (%)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques						
Benzo(a)pyrène	2,10E-02	1,29E-02	2,28E-02	1,36E-04	3,15E-01	177
Naphtalène	2,15E-05	1,42E-05	1,48E-05	2,41E-07	1,10E-04	104
Métaux et inorganiques						
Arsenic	1,10E-01	1,15E-01	1,42E-01	2,65E-03	1,40E+00	123
Baryum	6,15E-02	7,74E-02	5,22E-02	5,82E-03	4,36E-01	67
Chrome (VI)	4,43E-04	4,32E-04	2,78E-04	4,89E-05	1,86E-03	64
Cuivre	7,28E-03	8,22E-03	9,79E-03	5,06E-04	1,30E-01	119
Plomb	2,36E-02	2,55E-02	3,01E-02	9,27E-04	3,27E-01	118
Zinc	1,12E-03	1,42E-03	1,18E-03	1,25E-04	1,16E-02	83

Légende

LSIC95% : Limite supérieure de l'intervalle de confiance à 95 % sur la moyenne.