

Annexe 6/Tableau 2 : Indice de risque - Marmotte commune

Substance d'intérêt	LSIC95% (valeur déterministe) (mg/kg/d)	Moyenne (valeur probabiliste) (mg/kg/d)	Écart type (mg/kg/d)	Minimum (mg/kg/d)	Maximum (mg/kg/d)	Coefficient de variation (%)
<b>Hydrocarbures aromatiques polycycliques</b>						
Benzo(a)pyrène	6,19E-02	2,58E-02	4,33E-02	2,36E-04	4,72E-01	167
Naphtalène	6,53E-05	3,03E-05	2,94E-05	6,03E-07	2,07E-04	97
<b>Métaux et inorganiques</b>						
Arsenic	2,82E-01	2,01E-01	2,25E-01	6,88E-03	2,13E+00	112
Baryum	1,85E-01	1,61E-01	9,58E-02	1,64E-02	7,18E-01	60
Chrome (VI)	1,34E-03	8,96E-04	4,96E-04	1,48E-04	3,17E-03	55
Cuivre	2,20E-02	1,70E-02	1,93E-02	1,66E-03	1,93E-01	113
Plomb	7,16E-02	5,44E-02	6,11E-02	2,92E-03	5,40E-01	112
Zinc	3,40E-03	2,92E-03	2,18E-03	3,50E-04	2,17E-02	75

Légende

LSIC95% : Limite supérieure de l'intervalle de confiance à 95 % sur la moyenne.