



Qualité de l'orge brassicole de l'Ouest canadien

Données qualitatives sur les échantillons composites de l'enquête sur la récolte de 2004 et 2003 - Cultivars à deux rangs

Variété	AC Metcalfe		CDC Kendall		Harrington		Stein		CDC Copeland		Merit		CDC Stratus	
	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003
Campagne	320	333	145	111	94,5	146	21	64,4	24		9,2	52	5,6	28
Propriétés physiques														
Poids de 1 000 grains, g	43,4	43,1	43,3	40,5	41,8	39,9	43,3	43,4	46,9		43,0	40,8	45,1	46,8
Gros, par le tamis de 6/64 po., %	92,3	88,0	94,7	89,4	89,8	84,7	90,2	84,3	95,6	Non disponible	89,7	82,4	93,1	91,9
Moyens, par le tamis de 5/64 po., %	6,3	10,4	4,3	9,2	8,8	13,6	8,3	13,8	3,4		8,7	15,4	5,5	7,2
Analyse chimique														
Teneur en eau, % ¹	12,6	11,4	12,0	11,1	11,6	10,8	12,4	11,8	13,2		11,4	11,2	11,9	11,7
Teneur en protéines, %	11,9	12,5	11,8	12,4	11,6	12,1	11,7	12,1	11,4		10,9	12,0	11,8	12,1
Germination, 4 ml (3 jours), %	97	99	98	100	98	99	98	99	99		98	99	99	98
Germination, 8 ml (3 jours), %	73	95	74	98	91	98	65	90	88		90	97	71	97

¹ La teneur en eau n'est pas représentative de la teneur en eau de la nouvelle récolte car les échantillons n'ont pas été prélevés ou entreposés dans des contenants étanches.