



Qualité de l'orge brassicole de l'Ouest canadien

Données qualitatives sur les échantillons composites de l'enquête sur la récolte de 2006 et 2005 - Cultivars à deux rangs

Variété	AC Metcalfe		CDC Kendall		CDC Copeland		Harrington	
	2006	2005	2006	2005	2006	2005	2006	2005
Campagne								
En milliers de tonnes ²	419	335	130	120	121	132	14	21
Propriétés physiques								
Poids de 1 000 grains, g	42,8	43,5	42,1	43,2	43,8	44,8	41,1	40,5
Gros, par le tamis de 6/64 po., %	88,8	90,0	92,9	94,0	89,6	91,8	88,9	88,2
Moyens, par le tamis de 5/64 po., %	10,3	8,7	6,4	4,9	9,5	6,9	9,6	10,3
Analyse chimique								
Teneur en eau, % ¹	11,8	12,2	11,5	11,7	11,5	11,5	11,3	11,6
Teneur en protéines, %	12,1	11,9	11,8	11,7	11,6	11,2	10,9	11,5
Germination, 4 ml (3 jours), %	99	98	99	98	99	97	99	95
Germination, 8 ml (3 jours), %	97	88	95	88	98	92	98	90

¹ La teneur en eau n'est pas représentative de la teneur en eau de la nouvelle récolte car les échantillons n'ont pas été prélevés ou entreposés dans des contenants étanches.

² Les tonnages n'indiquent pas la disponibilité totale des récoltes.