

Données sur le suicide – 2003

Introduction

Le présent rapport fournit une description des décès par suicide au Nouveau-Brunswick pour l'année civile 2003.

Résultats

- En 2003, on a enregistré 90 cas de décès par suicide au Nouveau-Brunswick, dont 74 hommes et 16 femmes, soit environ cinq fois plus d'hommes que de femmes.

Le **Tableau 1** montre le nombre de décès par suicide et le taux de décès selon l'âge et le sexe pour les années 2002 et 2003.

- Le taux de suicide chez les hommes était moins élevé en 2003 qu'en 2002. Chez les femmes, le taux de suicide a augmenté au cours de la même période. Quoique pour ces deux groupes, la différence n'était pas statistiquement significative.
- Le taux de suicide continue d'être beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes.
- Chez les hommes, le taux de suicide était le plus élevé dans la catégorie des 65 à 79 ans (32,6 suicides pour 100 000 habitants). Chez les femmes, le taux de suicide était le plus élevé pour le groupe des 15 à 19 ans (12,4 suicides pour 100 000 habitants).

Tableau 1. Décès par suicide et taux de décès* pour 100 000 habitants, selon le groupe d'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick, 2002 et 2003

Groupe d'âge	Année	Homme		Femme		Deux sexes	
		Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
0 à 9 ans	2003	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2002	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 à 14 ans	2003	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2002	1	4.0	0	0.0	1	2.1
15 à 19 ans	2003	1	3.9	3	12.4	4	8.0
	2002	6	22.9	1	4.0	7	13.8
20 à 24 ans	2003	5	19.2	1	4.1	6	11.9
	2002	3	11.6	0	0.0	3	6.0
25 à 34 ans	2003	8	16.1	0	0.0	8	8.0
	2002	17	33.7	1	2.0	18	17.9
35 à 49 ans	2003	29	31.5	6	6.6	35	19.1
	2002	27	29.2	5	5.4	32	17.3
50 à 64 ans	2003	19	27.6	5	7.1	24	17.3
	2002	20	30.0	7	10.4	27	20.2
65 à 79 ans	2003	11	32.6	1	2.5	12	16.2
	2002	6	18.0	0	0.0	6	8.2
80+ ans	2003	1	10.4	0	0.0	1	3.6
	2002	1	10.7	0	0.0	1	3.7
Tous	2003	74	20.0	16	4.2	90	12.0
	2002	81	21.9	14	3.7	95	12.7

* Taux basés sur les estimés de la population, Statistique Canada, le 30 novembre 2004

Remarque : Les décès par suicide excluent les non résidents et les gens du Nouveau-Brunswick qui se sont suicidés à l'extérieur de la province.

Tableau 2. Taux de décès par suicide* pour 100 000 habitants, selon le Centre de santé mentale communautaire et le sexe, Nouveau-Brunswick, 2002 et 2003

CSMC	Homme		Femme		Deux sexes	
	Taux		Taux		Taux	
	2003	2002	2003	2002	2003	2002
Moncton	17.9	20.7	4.9	5.0	11.3	12.7
Richibucto	18.4	48.8	12.8	0.0	15.6	24.9
Saint John	13.3	14.9	0.0	3.1	6.4	8.9
St. Stephen	14.6	14.5	7.0	0.0	10.7	7.1
Sussex	25.8	8.6	0.0	0.0	13.0	4.3
Fredericton	14.4	16.1	1.6	1.6	7.9	8.8
Woodstock	9.2	18.3	4.6	0.0	6.9	9.1
Edmundston	78.5	38.9	6.2	12.3	41.4	25.3
Grand-Sault	13.4	40.0	0.0	0.0	6.6	19.9
Campbellton	23.8	35.3	5.8	11.4	14.6	23.2
Bathurst	30.9	35.5	15.0	9.9	22.8	22.5
Caraquet	21.8	17.2	4.4	4.4	13.1	10.8
Miramichi	20.7	20.6	4.2	0.0	12.5	10.3
N.-B.	20.0	21.9	4.2	3.7	12.0	12.7


* Taux basés sur les estimés de la population, Statistique Canada, le 30 novembre 2004

Remarques : a) Les taux sont basés sur le lieu de résidence et non le lieu du décès.
b) Les différences de taux doivent être interprétées avec prudence à cause du faible nombre de cas.

La **Figure 1** montre la répartition des méthodes employées pour se suicider en 2003, selon le sexe.

- En 2003, le moyen le plus emprunté par les hommes en vue de se suicider était la pendaison, la strangulation ou la suffocation (43%), suivi de l'utilisation d'une arme à feu (30%). Ces résultats sont comparables à ceux de l'année précédente, où la pendaison, la strangulation ou la suffocation, et l'utilisation d'une arme à feu étaient les méthodes les plus courantes (chacune 41%), suivie de l'auto-intoxication (10%).
- En 2003, le moyen le plus emprunté par les femmes en vue de se suicider était la pendaison, la strangulation ou la suffocation (44%), suivi de l'auto-intoxication (31%). Ces résultats sont comparables à ceux de l'année précédente, où la méthode la plus courante était la pendaison, la strangulation ou la suffocation (50%), suivie de l'auto-intoxication (29%).

Figure 1. Méthodes de suicide selon le sexe, Nouveau-Brunswick, 2003



Références :

1. Ministère de la Santé et du Bien-être du Nouveau-Brunswick (2005). Statistiques de l'état civil.
2. Ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick (2006). Service provincial d'épidémiologie. Données sur le suicide 2002.