

Données sur le suicide – 2004

Introduction

Le présent rapport fournit une description des décès par suicide au Nouveau-Brunswick pour l'année civile 2004.

Résultats

- En 2004, on a enregistré 88 cas de décès par suicide au Nouveau-Brunswick, dont 70 hommes et 18 femmes, soit environ quatre fois plus d'hommes que de femmes.

Le **Tableau 1** montre le nombre de décès par suicide et le taux de décès selon l'âge et le sexe pour les années 2003 et 2004.

- Le taux de suicide chez les hommes était moins élevé en 2004 qu'en 2003. Chez les femmes, le taux de suicide a augmenté au cours de la même période. Quoique pour ces deux groupes, la différence n'était pas statistiquement significative.
- Le taux de suicide continue d'être beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes.
- Chez les hommes, le taux de suicide était le plus élevé dans la catégorie des 80+ ans (30,5 suicides pour 100 000 habitants). Chez les femmes, le taux de suicide était le plus élevé pour le groupe des 25 à 34 ans (10,1 suicides pour 100 000 habitants).

Tableau 1. Décès par suicide et taux de décès* pour 100 000 habitants, selon le groupe d'âge et le sexe, Nouveau-Brunswick, 2003 et 2004

Groupe d'âge	Année	Homme		Femme		Deux sexes	
		Nombre	Taux	Nombre	Taux	Nombre	Taux
0 à 9 ans	2004	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2003	0	0.0	0	0.0	0	0.0
10 à 14 ans	2004	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	2003	0	0.0	0	0.0	0	0.0
15 à 19 ans	2004	3	11.8	0	0.0	3	6.1
	2003	1	3.9	3	12.4	4	8.0
20 à 24 ans	2004	5	19.1	0	0.0	5	9.9
	2003	5	19.2	1	4.1	6	11.9
25 à 34 ans	2004	13	26.4	5	10.1	18	18.2
	2003	8	16.1	0	0.0	8	8.0
35 à 49 ans	2004	23	25.3	8	8.8	31	17.1
	2003	29	31.5	6	6.6	35	19.1
50 à 64 ans	2004	16	22.5	5	6.9	21	14.6
	2003	19	27.6	5	7.1	24	17.3
65 à 79 ans	2004	7	20.5	0	0.0	7	9.4
	2003	11	32.6	1	2.5	12	16.2
80+ ans	2004	3	30.5	0	0.0	3	10.5
	2003	1	10.4	0	0.0	1	3.6
Tous	2004	70	18.9	18	4.7	88	11.7
	2003	74	20.0	16	4.2	90	12.0

* Taux basés sur les estimés de la population, Statistique Canada, le 30 novembre 2004

Remarque : Les décès par suicide excluent les non résidents et les gens du Nouveau-Brunswick qui se sont suicidés à l'extérieur de la province.

Tableau 2. Taux de décès par suicide* pour 100 000 habitants, selon le Centre de santé mentale communautaire et le sexe, Nouveau-Brunswick, 2003 et 2004

CSMC	Homme		Femme		Deux sexes	
	Taux		Taux		Taux	
	2004	2003	2004	2003	2004	2003
Moncton	13.9	17.9	7.3	4.9	10.5	11.3
Richibucto	12.3	18.4	12.8	12.8	12.6	15.6
Saint John	9.9	13.3	4.7	0.0	7.2	6.4
St. Stephen	14.6	14.6	7.0	7.0	10.8	10.7
Sussex	17.2	25.8	0.0	0.0	8.7	13.0
Fredericton	15.9	14.4	0.0	1.6	7.9	7.9
Woodstock	22.9	9.2	0.0	4.6	11.5	6.9
Edmundston	39.7	78.5	6.3	6.2	22.5	41.4
Grand-Sault	26.8	13.4	13.3	0.0	20.0	6.6
Campbellton	42.0	23.8	11.6	5.8	26.6	14.6
Bathurst	15.7	30.9	5.1	15.0	10.3	22.8
Caraquet	22.2	21.8	0.0	4.4	11.1	13.1
Miramichi	37.7	20.7	4.2	4.2	20.9	12.5
N.-B.	18.9	20.0	4.7	4.2	11.7	12.0


* Taux basés sur les estimés de la population, Statistique Canada, le 30 novembre 2004

Remarques : a) Les taux sont basés sur le lieu de résidence et non le lieu du décès.
b) Les différences de taux doivent être interprétées avec prudence à cause du faible nombre de cas.

La **Figure 1** montre la répartition des méthodes employées pour se suicider en 2004, selon le sexe.

- En 2004, le moyen le plus emprunté par les hommes en vue de se suicider était la pendaison, la strangulation ou la suffocation (36%), suivi de l'utilisation d'une arme à feu (31%). Ces résultats sont comparables à ceux de l'année précédente, où la pendaison, la strangulation ou la suffocation était la méthode la plus courante (43%), suivie de l'utilisation d'une arme à feu (30%).
- En 2004, le moyen le plus emprunté par les femmes en vue de se suicider était l'auto-intoxication (44%), suivi de la pendaison, la strangulation ou la suffocation (33%). Ces résultats diffèrent de ceux de l'année précédente, où la méthode la plus courante était la pendaison, la strangulation ou la suffocation (44%), suivie de l'auto-intoxication (31%).

Figure 1. Méthodes de suicide selon le sexe, Nouveau-Brunswick, 2004



Références :

- Ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick (2006). Statistiques de l'état civil.
- Ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick (2006). Service provincial d'épidémiologie. Données sur le suicide 2003.