

ESPÈCES EN PÉRIL au Nouveau-Brunswick



C. Neveu

Lynx du Canada

Nom scientifique: *Lynx canadensis*
Situation au N.-B.: régionales menacés

Lynx du Canada

Description & biologie

Le lynx du Canada est un félin de taille moyenne dont la fourrure est de couleur fauve. Ses longues pattes postérieures lui confère une attitude repliée. Le lynx du Canada se distingue du lynx roux par ses oreilles à touffes de poils longues et pointues, une queue courte foncée, tandis que le pelage des pattes et du ventre est de couleur plus unie. Ce félin a des pattes relativement larges, ce qui dénote l'adaptation de l'espèce qui peut ainsi se déplacer facilement sur la neige profonde pour chasser sa proie de prédilection, le lièvre d'Amérique.

Le temps fort de la saison de reproduction se situe entre la mi-mars et le début du mois d'avril et la gestation dure 9 semaines. La femelle met bas en règle générale de 2 à 3 petits et parfois jusqu'à 5 chatons. Les petits demeurent avec leur mère pendant le premier hiver seulement, puis deviennent par la suite solitaires et indépendants.

Habitat & survie

Le lynx du Canada fréquente la plupart du temps la forêt boréale profonde. L'animal

privilégie les endroits où prospère le lièvre d'Amérique, soit habituellement une forêt où abondent la végétation et les zones arbustives denses.


De nombreuses études ont établi que la population de lynx dépend de la densité des populations de lièvres. Selon que les populations de lièvres deviennent plus nombreuses ou diminuent, il en va de même des populations de lynx. Ce phénomène se produit parce que la quantité de nourriture dont dispose le lynx influence son taux de reproduction et la survie des chatons et des adultes.

Aire de répartition

La taille et l'évolution de la population de lynx au Nouveau-Brunswick sont peu connues, car les données régionales sur l'espèce font défaut. Les données dont nous disposons indiquent que le lynx peut être observé partout dans la province, mais qu'il est plus commun dans le nord du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick se trouve près de la limite méridionale de son aire de répartition.

Le lynx du Canada est observé dans la plupart des zones forestières du nord du Canada, de Terre-Neuve à la Colombie-Britannique, y compris dans la partie

occidentale des Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et en Alaska. La zone sud de son aire de répartition comprend une petite partie des États-Unis, y compris certaines régions des Rocheuses, du Midwest et de la Nouvelle-Angleterre.



Aire de répartition
au N-B du Lynx du