

Exposition à la fumée secondaire, selon le groupe d'âge et le sexe, non fumeurs de 12 ans et plus, Canada, 2000-2001

Exposition à la fumée secondaire	Total, exposition à la fumée secondaire	Exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Pas d'exposition à la fumée secondaire au cours du dernier mois		Exposition à la fumée secondaire, non déclarée	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
2000-2001							
Total, 12 ans et plus	19 119 413	5 285 040	27,6	13 780 777	72,1	53 596	0,3
Hommes	9 140 249	2 762 793	30,2	6 343 998	69,4	33 457	0,4
Femmes	9 979 164	2 522 247	25,3	7 436 779	74,5	20 139	0,2
12 à 19 ans	2 636 889	1 037 029	39,3	1 590 314	60,3	9 547E	0,4E
Hommes	1 369 944	524 497	38,3	839 961	61,3	5 485E	0,4E
Femmes	1 266 945	512 532	40,5	750 352	59,2	4 061E	0,3E
12 à 14 ans	1 085 443	361 760	33,3	720 337	66,4	3 345E	0,3E
Hommes	571 312	182 843	32,0	386 944	67,7	F	F
Femmes	514 131	178 918	34,8	333 394	64,8	1 820E	0,4E
15 à 19 ans	1 551 446	675 269	43,5	869 976	56,1	6 201E	0,4E
Hommes	798 632	341 654	42,8	453 018	56,7	F	F
Femmes	752 814	333 614	44,3	416 959	55,4	F	F
20 à 34 ans	4 223 459	1 399 983	33,1	2 806 422	66,4	17 053E	0,4E
Hommes	2 032 350	747 475	36,8	1 275 115	62,7	9 760E	0,5E
Femmes	2 191 109	652 509	29,8	1 531 307	69,9	7 293E	0,3E
20 à 24 ans	1 384 748	560 728	40,5	814 619	58,8	9 400E	0,7E
Hommes	677 755	295 932	43,7	375 822	55,5	F	F
Femmes	706 992	264 796	37,5	438 797	62,1	F	F
25 à 34 ans	2 838 711	839 255	29,6	1 991 803	70,2	7 653E	0,3E
Hommes	1 354 594	451 543	33,3	899 294	66,4	F	F
Femmes	1 484 117	387 712	26,1	1 092 509	73,6	3 895E	0,3E
35 à 44 ans	3 640 148	983 564	27,0	2 647 462	72,7	9 123E	0,3E
Hommes	1 752 026	516 350	29,5	1 229 250	70,2	6 426E	0,4E
Femmes	1 888 122	467 214	24,7	1 418 211	75,1	F	F
45 à 64 ans	5 412 246	1 396 355	25,8	4 004 719	74,0	11 172E	0,2E
Hommes	2 602 033	750 269	28,8	1 844 253	70,9	7 511E	0,3E
Femmes	2 810 214	646 086	23,0	2 160 466	76,9	F	F
45 à 54 ans	3 187 989	847 504	26,6	2 333 487	73,2	6 998E	0,2E
Hommes	1 513 913	445 270	29,4	1 063 226	70,2	5 418E	0,4E
Femmes	1 674 075	402 234	24,0	1 270 261	75,9	F	F
55 à 64 ans	2 224 258	548 852	24,7	1 671 232	75,1	4 174E	0,2E
Hommes	1 088 119	304 999	28,0	781 028	71,8	F	F
Femmes	1 136 139	243 853	21,5	890 205	78,4	F	F
65 ans et plus	3 206 671	468 109	14,6	2 731 861	85,2	6 701E	0,2E
Hommes	1 383 896	224 203	16,2	1 155 418	83,5	F	F
Femmes	1 822 774	243 906	13,4	1 576 443	86,5	F	F
65 à 74 ans	1 841 534	311 110	16,9	1 527 670	83,0	F	F
Hommes	853 117	158 229	18,5	693 708	81,3	F	F
Femmes	988 417	152 881	15,5	833 962	84,4	F	F
75 ans et plus	1 365 137	156 999	11,5	1 204 191	88,2	3 947E	0,3E
Hommes	530 779	65 974	12,4	461 710	87,0	F	F
Femmes	834 358	91 025	10,9	742 480	89,0	F	F

Exposition à la fumée secondaire, selon le groupe d'âge et le sexe, non fumeurs de 12 ans et plus, Canada, 2000-2001

1. Source des données : Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001*
2. Non fumeurs de 12 ans et plus qui ont été exposés à la fumée secondaire presque chaque jour au cours du mois qui a précédé l'enquête.
3. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
4. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.
5. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.
6. Les régions socio-sanitaires sont définies par les gouvernements provinciaux comme étant les secteurs de responsabilité des conseils régionaux de santé (établis aux termes de la loi), ou encore comme des régions intéressant les autorités sanitaires.
7. Un « groupe de régions homologues » est un groupe de régions socio-sanitaires qui comportent des caractéristiques sociales et économiques similaires.
8. À Terre-Neuve-et-Labrador, les régions socio-sanitaires sont généralement appelées des régions « Health and Community Services (HCS) ».
9. À l'Île-du-Prince-Édouard, les deux régions socio-sanitaires divisent la province selon une entité « rurale » et une entité « urbaine ».
10. L'Île-du-Prince-Édouard a délimité des régions socio-sanitaires pour les seuls besoins statistiques; lesquelles ne correspondent en rien aux cinq régions socio-sanitaires créées à des fins de gestion.
11. En Nouvelle-Écosse, les régions sont appelées des « zones » et correspondent aux limites administratives des régions socio-sanitaires de la province.
12. En Ontario, les « Public Health Units (PHU) » gèrent les programmes de promotion de la santé et de prévention de la maladie, tandis que les « District Health Councils (DHC) » sont des organismes consultatifs de planification en matière de santé.
13. Compte tenu de la faible population de Churchill au Manitoba (1 110 habitants en 1996), l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes recueille seulement des données pour l'agrégat de Burntwood et Churchill (régions 4680, 4690).
14. En Saskatchewan, des « service areas (SA) » ont été créées en regroupant les 33 districts de santé.
15. En Alberta, les régions socio-sanitaires sont appelées « Health Authorities (HA) » ou « Regional Health Authorities (RHA) ».
16. Les signes suivants sont employés dans les publications de Statistique Canada : (..) nombres non disponibles et (...) nombres n'ayant pas lieu de figurer.
17. Tableau CANSIM numéro 01050053.



Statistique
Canada

Statistics
Canada



Institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2002

© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.