

La gonorrhée est une maladie transmissible sexuellement

La gonorrhée :

Qu'est-ce que c'est?

La gonorrhée est une maladie transmissible sexuellement (MTS) qui peut être contractée autant par les hommes que par les femmes. L'infection se propage habituellement lors d'un contact vaginal, oral ou anal sans condom avec une personne infectée. L'infection peut aussi atteindre les yeux des bébés qui naissent d'une mère infectée.

Comment sait-on si on l'a?

Nombre de femmes et d'hommes ne manifesteront AUCUN signe ou symptôme de l'infection, mais il se peut que...

les femmes...

- remarquent un écoulement vaginal anormal;
- perçoivent une sensation de brûlure en urinant;
- développent un mal de gorge;
- éprouvent de la douleur pendant les rapports sexuels;
- décèlent un saignement inhabituel du vagin;
- ressentent des douleurs au bas de l'abdomen.

les hommes...

- remarquent un écoulement du pénis;
- perçoivent une sensation de brûlure en urinant;
- développent un mal de gorge;
- ressentent de la douleur aux testicules.

Quelles sont les conséquences de l'infection?

Non traitée, la gonorrhée peut entraîner chez la femme...

- une pelvipéritonite résultant en des douleurs au bas de l'abdomen, de la fièvre et une douleur continue, et pouvant résulter en...
- une grossesse tubaire ou une incapacité d'enfanter.

Ces conséquences peuvent être assez sévères pour nécessiter l'hospitalisation.

Non traitée, la gonorrhée peut entraîner chez l'homme...

- de la douleur ou une enflure des testicules,
- des difficultés à procréer.

Est-ce curable? OUI!

Toutes les personnes qui ont contracté la gonorrhée ou qui ont eu des rapports sexuels avec une personne infectée peuvent être traitées avec UNE dose UNIQUE d'antibiotiques. Ce traitement devrait GUÉRIR l'infection, surtout si LES DEUX partenaires le suivent en même temps. Le traitement peut aussi nécessiter la prise d'un médicament contre la chlamydie, une maladie transmissible sexuellement qui peut être contractée en même temps que la gonorrhée.

Les deux partenaires peuvent être traités gratuitement. Vous devriez éviter les rapports sexuels pendant les cinq à neuf jours qui suivent le traitement. Si vous avez quand même des rapports sexuels, ASSUREZ-VOUS D'UTILISER UN CONDOM.

Peut-on la contracter plus d'une fois? OUI!

Vous devez consulter un médecin ou un professionnel de la santé CHAQUE FOIS que vous avez des contacts sexuels avec une personne infectée.

N'OUBLIEZ PAS...

L'utilisation d'un condom lors de CHAQUE rapport sexuel peut vous protéger de la gonorrhée et d'autres MTS, y compris le SIDA.

Pour obtenir des renseignements sur le dépistage et les mesures de prévention ou encore des conseils, appelez :

LIGNE-INFO MTS/VIH
ORS de Winnipeg 940-2200

AIDS/STI Information
À Winnipeg 945-2437
À l'extérieur de Winnipeg 1 (800) 782-2437

Ligne téléphonique FACTS of LIFE
À Winnipeg 947-9222
À l'extérieur de Winnipeg 1 (800) 452-1957

Vous pouvez aussi communiquer avec l'infirmière de la santé publique de votre localité.

Nous tenons à remercier les infirmières de la santé publique de la Ville de Winnipeg pour la conception originale de ce dépliant.

