

# La chlamydiose est une maladie transmissible sexuellement



## La chlamydiose :

### Qu'est-ce que c'est?

La chlamydiose est une maladie transmissible sexuellement (MTS) qui peut être contractée autant par les hommes que par les femmes. L'infection se propage habituellement lors d'un contact vaginal, oral ou anal sans condom avec une personne infectée. L'infection peut aussi atteindre les yeux et les poumons des bébés qui naissent d'une mère infectée.

### Comment sait-on si on l'a?

La plupart des femmes et nombre d'hommes ne manifesteront AUCUN signe ou symptôme de l'infection, mais il se peut que...

### les femmes...

- remarquent un écoulement vaginal anormal;
- perçoivent une sensation de brûlure en urinant;
- éprouvent des démangeaisons ou de la douleur dans la région du vagin;
- ressentent de la douleur pendant les rapports sexuels;
- décèlent un saignement inhabituel du vagin;
- ressentent des douleurs au bas de l'abdomen.

### les hommes...

- remarquent un écoulement du pénis;
- perçoivent une sensation de brûlure en urinant;
- éprouvent de la douleur ou des démangeaisons au pénis;
- ressentent de la douleur aux testicules.

### Quelles sont les conséquences de l'infection?

#### Non traitée, la chlamydiose peut entraîner chez la femme...

- une pelvipéritonite résultant en des douleurs au bas de l'abdomen, de la fièvre et une douleur continue, et peut résulter en...
- une grossesse tubaire ou une incapacité d'enfanter.

Ces conséquences peuvent être assez sévères pour nécessiter l'hospitalisation.

#### Non traitée, la chlamydiose peut entraîner chez l'homme...

- de la douleur ou une enflure aux testicules,
- des difficultés à procréer.

## Est-ce curable? OUI!

Toutes les personnes qui ont contracté une infection à chlamydia (ou chlamydiose) ou qui ont eu des rapports sexuels avec une personne infectée peuvent être traitées par UNE dose UNIQUE d'antibiotiques. Ce traitement devrait GUÉRIR l'infection, surtout si LES DEUX partenaires le suivent en même temps. Le traitement peut aussi nécessiter la prise d'un médicament contre la gonorrhée, une maladie transmissible sexuellement qui peut être contractée en même temps que la chlamydiose.

Les deux partenaires peuvent être traités gratuitement. Vous devriez éviter les rapports sexuels pendant les cinq à neuf jours qui suivent le traitement. Si vous avez quand même des rapports sexuels, ASSUREZ-VOUS D'UTILISER UN CONDOM.

## Peut-on la contracter plus d'une fois? OUI!

Vous devez consulter un médecin ou un professionnel de la santé CHAQUE FOIS que vous avez des contacts sexuels avec une personne infectée.

### N'OUBLIEZ PAS...

L'utilisation d'un condom lors de CHAQUE rapport sexuel peut vous protéger de la chlamydiose et d'autres MTS, y compris le SIDA.

### Pour obtenir des renseignements sur le dépistage et les mesures de prévention ou encore des conseils, appelez :

**LIGNE-INFO MTS/VIH**  
ORS de Winnipeg **940-2200**

**AIDS/STI Information**  
À Winnipeg **945-2437**  
À l'extérieur de Winnipeg **1 (800) 782-2437**

**Ligne téléphonique FACTS of LIFE**  
À Winnipeg **947-9222**  
À l'extérieur de Winnipeg **1 (800) 452-1957**

Vous pouvez aussi communiquer avec l'infirmière de la santé publique de votre localité.

Nous tenons à remercier les infirmières de la santé publique de la Ville de Winnipeg pour la conception originale de ce dépliant.

