

# Renseignements importants au sujet du **tétanos, de la diphtérie et de la coqueluche** et du vaccin Adacel (dCaT)

## À LIRE ATTENTIVEMENT

### Qu'est-ce que le TÉTANOS?

- Il s'agit d'une maladie qui se contracte lorsqu'une coupure ou une blessure est infectée par la bactérie du tétanos.
- Cette bactérie, que l'on retrouve souvent dans la terre, sécrète un poison qui entraîne des spasmes musculaires.
- Si le poison atteint les muscles du système respiratoire, la personne peut mourir rapidement.
- La maladie peut être prévenue par un vaccin.

### Qu'est-ce que la DIPHTHÉRIE?

- La diphtérie est une maladie très grave.
- Elle peut causer une infection des voies nasales et de la gorge, pouvant ainsi affecter la respiration.
- Elle peut causer une infection de la peau.
- Elle peut causer une insuffisance cardiaque ou la paralysie.
- Environ une personne atteinte de la diphtérie sur 10 en meurt.
- La maladie peut être prévenue par un vaccin.

### Qu'est-ce que la COQUELUCHE?

- La coqueluche est causée par une bactérie.
- Elle peut provoquer de graves crises de toux qui peuvent affecter la respiration et durer des semaines ou des mois. La maladie dure en général de 6 à 12 semaines.
- Elle peut entraîner une pneumonie.
- Elle peut entraîner des convulsions ou même la mort dans certains cas.
- La maladie peut être prévenue par un vaccin.

### Qu'est-ce que le vaccin contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche?

- Adacel est le nom d'un vaccin qui sert à prévenir le tétanos, la diphtérie et la coqueluche. Ce vaccin se nomme également dCaT.
- Adacel est une combinaison de trois vaccins.
- Le vaccin Adacel est la meilleure façon de prévenir la diphtérie, le tétanos et la coqueluche chez les adolescents.
- Le vaccin est administré par injection.

### Qui devrait recevoir le vaccin Adacel contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche?

- Le calendrier de vaccination de la Nouvelle-Écosse recommande que ce vaccin soit administré aux :
- adolescents âgés de 14 à 16 ans (programme d'immunisation scolaire).

## ATTENTION

Certaines personnes doivent consulter un médecin avant de recevoir ce vaccin :

- les personnes qui sont allergiques à l'une des composantes du vaccin;
- les personnes malades ou qui ont une fièvre (température de 39,5 °C/103 °F ou plus);
- les personnes qui prennent des doses élevées de stéroïdes systémiques;
- les personnes qui reçoivent un traitement pour le cancer;
- les personnes qui ont des problèmes avec leur système immunitaire, qui diminuent la résistance de leur corps aux infections.

### Qui ne devrait pas recevoir le vaccin Adacel?

- les personnes qui ont déjà eu une réaction anaphylactique à une dose précédente d'Adacel ou aux composantes du vaccin.

*Veillez lire le verso.*

# À quoi peut-on s'attendre après l'administration du vaccin Adacel (dCaT)?

## RENSEIGNEMENTS POUR LES PARENTS

Votre enfant a reçu le vaccin Adacel (dCaT). Ce vaccin est important pour protéger votre enfant contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche.

*Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après l'administration d'un vaccin pour permettre de surveiller pour la possibilité d'une réaction au vaccin. Comme dans le cas de tout autre vaccin, il existe une faible possibilité qu'une réaction plus grave se produise.*

### Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin?

- Les effets secondaires les plus communs du vaccin Adacel sont une douleur, une rougeur et une enflure au site d'injection.
- D'autres effets secondaires moins communs incluent un léger mal de tête, une fièvre, la diarrhée, des nausées, des frissons, des douleurs généralisées, des pertes d'énergie et des jointures endolories ou enflées.

*Puisqu'il est possible qu'une fièvre se produise, assurez-vous d'avoir de l'acétaminophène à la maison. Suivez les directives indiquées sur la bouteille.*

### Communiquez avec votre médecin si :

- la fièvre dure plus de 24 heures;
- votre enfant a une température de 39,5 °C (103 °F) ou plus;
- la fièvre ne s'améliore pas après l'administration de l'acétaminophène.

### Questions?

Si vous avez des questions concernant le tétanos, la diphtérie, la coqueluche ou le vaccin Adacel, veuillez communiquer avec votre bureau local des Services de la santé publique ou avec votre médecin de famille.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'immunisation, veuillez consulter les sites Web :

- de la Coalition canadienne pour la sensibilisation et la promotion de la vaccination à l'adresse <http://www.immunize.cpha.ca>
- de l'Agence de santé publique à l'adresse <http://www.phac-aspc.gc.ca>