



## Liste de vérification des mesures de biosécurité

Mesures contribuant à éviter l'introduction et la propagation de  
l'influenza aviaire dans votre exploitation agricole

<b>VISITEURS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> Tenir un registre des visiteurs. (Indiquer la date, le nom, l'entreprise, les coordonnées, les visites à l'exploitation agricole effectuées dans les 24 dernières heures et la prochaine visite prévue.)</li><li><input type="radio"/> Assurer la sécurité des installations au moyen d'une clôture verrouillée au point d'entrée.</li><li><input type="radio"/> S'assurer que le terrain de stationnement se trouve à au moins 30 mètres des poulaillers.</li><li><input type="radio"/> Fournir des vêtements et des chaussures propres à tous les visiteurs (y compris un couvre-chef).</li><li><input type="radio"/> Demander à tous les visiteurs de se laver les mains avant d'entrer dans les poulaillers.</li><li><input type="radio"/> Verrouiller les portes des poulaillers quand les employés ne travaillent pas.</li></ul>
<b>VOLAILLE ET SAUVAGINE DOMESTIQUE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> Mettre en place un programme pour surveiller régulièrement la santé du troupeau.</li><li><input type="radio"/> Suivre la même routine dans les soins du troupeau (l'Agence canadienne d'inspection des aliments recommande de commencer par les oiseaux plus jeunes et de finir avec les plus âgés).</li><li><input type="radio"/> Isoler les nouveaux oiseaux des troupeaux existants.</li><li><input type="radio"/> Sceller les combles des poulaillers et couvrir les ouvertures de ventilation avec des moustiquaires.</li><li><input type="radio"/> Éviter que les oiseaux, leur nourriture et leur eau n'entrent en contact avec les oiseaux sauvages et les autres animaux qui vivent à l'extérieur.</li><li><input type="radio"/> Prévenir le contact entre les oiseaux élevés en plein air (sauvagine domestique, volaille en liberté) et les oiseaux sauvages au moyen de clôtures et de grillages.</li><li><input type="radio"/> Enlever ou limiter la végétation à proximité des poulaillers.</li><li><input type="radio"/> Drainer les étangs et les plans d'eau stagnante à proximité des poulaillers.</li><li><input type="radio"/> Acheter tous les oiseaux et leur nourriture de fournisseurs dignes de confiance qui appliquent des mesures rigoureuses de biosécurité en tout temps.</li></ul>
<b>HYGIÈNE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> Laver sous pression tous les véhicules et l'équipement avec du détergent et les désinfecter sur une surface dure et propre, comme des panneaux de béton, avant l'entrée sur les lieux.</li><li><input type="radio"/> Nettoyer régulièrement et à fond les chaussures avec du détergent et les désinfecter avant et après une visite dans chacun des poulaillers.</li><li><input type="radio"/> Changer la solution dans les pédivules au moins une fois par jour, et plus souvent dans les zones de grande circulation.</li><li><input type="radio"/> Nettoyer et désinfecter à fond toutes les cages servant au transport des volailles.</li></ul>