

ABEILLE

GENERAL

Origin & Breeding: bred from the cross (Saginaw Gold x TATA 9192-15) and released by the Les Buissons Research Center, MAPAQ, in Pointe-aux-Outardes, Quebec. Released in 2002.

Year licensed in Canada: 2002

Licence No.: I-295

Maturity: late season

BOTANICAL FEATURES

Plants: medium; semi-erect; rather large stems, slightly pigmented; wings single, straight and prominent; nodes moderately swollen, not pigmented.

Leaves: dark green; open.

Terminal leaflets: broadly ovate; tip acuminate; base cordate and symmetrical; leaf margin moderately waved.

Primary leaflets: four pairs; large; medium ovate; acuminate tip; base cordate and rather symmetrical.

Flowers: few; small white corolla; flower buds strongly pigmented; bright yellow anthers.

Tubers: round; flaky yellow skin; shallow eyes, moderately numerous, evenly distributed; eyebrows slightly prominent; yellow flesh.

Sprouts: spherical; blue-violet; base lightly pigmented and moderately pubescent; apex moderately pigmented, not pubescent.

AGRICULTURAL FEATURES

High yielding variety; moderately resistant to hollow heart, brown heart, vascular net necrosis; high dry matter content; long dormancy period (9 months).

Utilization: excellent for boiling and baking, very tasty variety; low after boiling sloughing.

Chief Market: fresh market.

REACTION TO DISEASES

Moderately susceptible: common scab.

Susceptible: rhizoctonia, potato wart.

ABEILLE

GÉNÉRALITÉS

Origine génétique: issue du croisement (Saginaw Gold x TATA 9192-15) réalisé et sélectionné par le Centre de recherches Les Buissons, MAPAQ, à Pointe-aux-Outardes, Québec. Mise sur le marché en 2002.

Année d'homologation au Canada: 2002

No. d'homologation: I-295

Maturité: tardive

CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES

Plants: moyens, semi-dressés; tiges assez épaisses, peu pigmentées; ailes simples, droites et proéminentes; noeuds moyennement enflés, non pigmentés.

Feuilles: vert foncé; ouvertes.

Folioles terminales: largement ovées; bout acuminé; base cordée et asymétrique; marge moyennement ondulée.

Folioles primaires: quatre paires, grandes; moyennement ovées; bout acuminé; base cordée et plutôt symétrique.

Fleurs: peu nombreuses; petite corolle blanche; boutons floraux très pigmentés; anthères jaune clair.

Tubercules: ronds; peau jaune et squameuse; yeux superficiels, moyennement nombreux, distribués uniformément; arcades peu proéminentes; chair jaune.

Germes: sphériques; bleu-violet; base légèrement pigmentée et moyennement pubescente; apex moyennement pigmenté, non pubescent.

CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES

Variété à rendement élevé; moyennement résistante au cœur creux, cœur brun et à la nécrose vasculaire; contenu en matière sèche élevé; long repos végétatif (9 mois).

Utilisation: excellente pour la cuisson à l'eau et au four, variété très savoureuse; faible délitescence après cuisson à l'eau.

Marché principal: marché frais.

RÉACTION AUX MALADIES

Modérément sensible: gale commune

Sensible: rhizoctonie, gale verruqueuse.