

## **PINK PEARL**

### **GENERAL**

**Origin & Breeding:** bred by Agriculture Canada from the cross (Ultimus x Katahdin) and selected at the St. John's West Research Station, Newfoundland, in 1962.

**Year licensed in Canada:** 1969

**Licence No.:** 1196

**Maturity:** mid-season to late

### **BOTANICAL FEATURES**

**Plants:** medium large, upright; nodes slightly swollen; wings slightly prominent.

**Leaves:** open, smooth, dark green; young leaves slightly yellowish; midribs reddish purple, slightly pubescent.

Terminal leaflets: elliptical to ovate.

Primary leaflets: elliptical, mainly three pairs.

Secondary leaflets: numerous.

Tertiary leaflets: few, small.

**Flowers:** numerous, large, red-purple with white tips; green buds having purple bronze pigmentation.

**Tubers:** oval, smooth, medium size; pink skin; shallow eyes, predominantly apical; white flesh.

**Sprouts:** red purple.

### **AGRICULTURAL FEATURES**

High yielding variety; high tuber set; good storability; medium specific gravity. Wide spacing (up to 46 cm) has increased marketable yields; tubers separate readily from stolons.

**Utilization:** good for boiling and baking.

**Chief Market:** fresh market in Newfoundland.

### **REACTION TO DISEASES**

**Resistant:** potato wart (races 1,2,6,8)

**Moderately resistant:** black leg, leaf roll, PVA, PVS, PVX, PVY, late blight.

**Susceptible:** common scab.

## **PINK PEARL**

### **GÉNÉRALITÉS**

**Origine génétique:** issue du croisement (Ultimus x Katahdin) réalisé par Agriculture Canada et sélectionné à la Station de recherches de St-Jean ouest, Terre-Neuve, en 1962.

**Année d'homologation au Canada:** 1969

**No. d'homologation:** 1196

**Maturité:** mi-saison à tardive

### **CARACTÉRISTIQUES BOTANIQUES**

**Plants:** moyennement gros; port dressé; noeuds légèrement enflés; ailes légèrement proéminentes.

**Feuilles:** ouvertes, lisses, vert foncé; jeunes feuilles légèrement jaunâtre; nervures médianes pourpre rougeâtre, légèrement pubescentes.

Folioles terminales: elliptiques à ovées.

Folioles primaires: elliptiques, surtout trois paires.

Folioles secondaires: nombreuses.

Folioles tertiaires: peu nombreuses, petites.

**Fleurs:** nombreuses, grandes, rouge pourpre avec pointes blanches; bourgeons verts ayant une pigmentation bronze pourpre.

**Tubercules:** ovales, lisses, grosseur moyenne; peau rose; yeux superficiels, surtout apicaux; chair blanche.

**Germes:** rouge pourpre.

### **CARACTÉRISTIQUES AGRONOMIQUES**

Variété à rendement élevé; nombreux tubercules par plant; bonne conservation; densité moyenne. Un espacement large (jusqu'à 46 cm) augmente le rendement commercialisable; les tubercules se séparent facilement des stolons.

**Utilisation:** bonne bouillie et cuite au four.

**Marché principal:** marché frais à Terre-Neuve.

### **RÉACTION AUX MALADIES**

**Résistante:** gale verruqueuse (races 1,2,6,8)

**Modérément résistante:** jambe noire, enroulement, virus A, S, X, Y, mildiou.

**Sensible:** gale commune.