



ENCEINTE ?

Lorsqu'une femme enceinte prend de l'alcool, son bébé en prend aussi.

Boire de l'alcool durant la grossesse peut causer le syndrome d'alcoolisme fœtal chez le bébé à naître ou entraîner d'autres complications¹.

Si vous avez des questions au sujet de la consommation d'alcool durant la grossesse ou si vous désirez obtenir de l'information au sujet de l'alcoolisme, vous pouvez consulter :

- un conseiller, une conseillère, un infirmier, une infirmière, une sage-femme ou un médecin*

Pour de plus amples renseignements au sujet du syndrome et des effets de l'alcoolisme fœtal :

- composez le 1 800 O-Canada (1 800 622-6232)
TTY/TDD : 1 800 465-7735*
- consultez le site
www.santecanada.ca/saf*

¹ Référence aux termes utilisés pour décrire la gamme entière des malformations congénitales liées à l'alcool, telles que les troubles neurologiques liés à l'alcool, le syndrome partiel d'alcoolisme fœtal ou le syndrome atypique d'alcoolisme fœtal.



PAS D'ALCOOL.

Souvent, l'enfant atteint du SAF:

- *est plus petit à la naissance et le restera pour la vie*
- *éprouve des problèmes de réflexion, d'expression, d'ouïe ou de vision*
- *a l'air différent des autres enfants*
- *a de la difficulté à apprendre comme les autres enfants*
- *manifeste des troubles du comportement*

Les difficultés que pose le SAF sont permanentes; elles ne s'estompent pas quand l'enfant grandit.

La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de protéger les enfants en évitant l'alcool durant la grossesse. La famille et l'entourage peuvent aider la future maman et la soutenir dans son choix de ne pas consommer d'alcool durant sa grossesse.

Présenté par votre gouvernement provincial, fédéral et les Territoires.

Notre mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à maintenir et à améliorer leur état de santé. Santé Canada.

© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2001.

Cat: H39-571/2001F ISBN: 0-662-85642-2

Canada 

Canada 