



**Figure 1-1 Proportion d'adultes de 15 ans et plus qui fument quotidiennement, Canada, 1996-1997**




Sources : Statistique Canada, n° de cat. 91-002, vol. 7, n° 3; 91-512; 91-213. Les Canadiens et le tabagisme : une mise à jour. Santé et Bien-être social Canada, 1991. Enquête sociale générale, Statistique Canada, 1991. Enquête sur le tabagisme au Canada, cycle 3, 1994. Enquête nationale sur la santé de la population, Statistique Canada, 1996-1997.

**Figure 1-2 Proportion d'adultes qui fument quotidiennement, par groupe d'âge et sexe, Canada, 1996-1997**




Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1996-1997

**Figure 1-3 Proportion d'adultes de 15 ans et plus qui fument quotidiennement ou occasionnellement, par sexe et province, Canada, 1996-1997**



Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, cycle 2, 1996-1997

**Figure 1-4 Proportion d'adultes de 15 ans et plus qui sont ou ont été fumeurs, selon le niveau de revenu adéquat\*, Canada, 1996-1997**




**Niveau de revenu adéquat\***

\*Niveau de revenu adéquat - déterminé en fonction de la taille (nombre de personnes) et du revenu total du ménage.


Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1996-1997

**Figure 1-5 Proportion de fumeurs quotidiens de 15 ans et plus qui ont déclaré des restrictions quant à l'usage du tabac à leur lieu de travail, par sexe, Canada, 1996-1997**




Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, cycle 2, 1996-1997

**Figure 1-6 Proportion d'adultes qui sont physiquement inactifs, par groupe d'âge et sexe, Canada, 1996-1997**




Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1996-1997

**Figure 1-7 Proportion d'adultes qui sont physiquement inactifs, par province, Canada, 1996-1997**



Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, cycle 2 1996-1997


**Figure 1-8 Proportion d'adultes qui déclarent un problème d'hypertension artérielle, par groupe d'âge et sexe, Canada, 1996-1997**



Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1996-1997




**Figure 1-9 Proportion d'adultes parmi les Premières nations et les Inuits qui déclarent un problème d'hypertension artérielle, par groupe d'âge et sexe, Canada, 1997**




Source : Assemblée des Premières nations, Comité directeur national, Enquête régionale sur la santé des Premières nations et des Inuits de 1997

**Figure 1-10 Proportion d'adultes qui souffrent d'hypertension artérielle, par province, Canada, 1996-1997**




Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, cycle 2, 1996-1997

**Figure 1-11 Proportion d'adultes qui ont fait mesurer leur tension artérielle, par groupe d'âge et sexe, Canada, 1996-1997**




Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1996-1997

**Figure 1-12 Proportion d'adultes qui sont traités pour l'hypertension artérielle, par groupe d'âge et sexe, Canada, 1996-1997**




Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1996-1997

**Figure 1-13 Proportion de femmes ayant un problème de surpoids, par groupe d'âge, Canada, 1996-1997**




Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1996-1997

**Figure 1-14 Proportion d'hommes ayant un problème de surpoids, par groupe d'âge, Canada, 1996-1997**




Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1996-1997

**Figure 1-15 Proportion d'adultes ayant un problème de surpoids, par province, Canada, 1996-1997**



Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, cycle 2, 1996-1997


**Figure 1-16 Proportion d'adultes atteints du diabète, par groupe d'âge et sexe, Canada, 1996-1997**



Source : Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1996-1997




**Figure 1-17 Proportion d'adultes parmi les Premières nations et les Inuits qui se déclarent atteints du diabète, par groupe d'âge et sexe, Canada, 1996-1997**



Source : Assemblée des Premières nations, Comité directeur national, Enquête régionale sur la santé des Premières nations et des Inuits de 1997

**Figure 1-18 Proportion d'adultes qui font une consommation excessive\* d'alcool par semaine, par groupe d'âge et sexe, Canada, 1996**



\* Femmes : plus de 9 consommations par semaine; hommes : plus de 14 consommations par semaine.  
Statistique Canada, Enquête nationale sur la santé de la population, 1996-1997