




## FICHE D'INFORMATION sur la tuberculose Division de la lutte antituberculeuse

# Le traitement de l'infection tuberculeuse

### Que dois-je faire si j'ai une infection tuberculeuse?

Votre médecin pourrait vous recommander un ou plusieurs médicaments qui réduiront le risque que votre *infection progresse vers la tuberculose*. La prise d'un antibiotique, l'Isoniazide (INH), pendant 9 à 12 mois a plus de 90 % de chances de prévenir l'apparition de la *tuberculose*. Votre médecin peut également vous parler d'autres antibiotiques pouvant être utilisés pour le traitement de l'*infection par le bacille tuberculeux*. Il est important que vous preniez tous vos médicaments comme votre médecin vous les a prescrits.



### Le traitement est-il sans danger?

Le traitement n'entraîne aucun problème pour la plupart des gens, mais les médicaments peuvent endommager le foie. Cessez votre traitement et consultez votre médecin immédiatement si vous éprouvez l'un des symptômes suivants :

- perte d'appétit
- nausées
- éruption cutanée
- démangeaisons
- urine brune ou foncée
- peau ou yeux jaunâtres
- douleur à l'estomac ou embarras gastrique
- fièvre

Le foie des personnes qui consomment beaucoup d'alcool ou souffrent d'hépatite peut déjà être mal en point. Votre médecin peut demander des analyses pour vérifier si votre foie est touché. En cas de troubles au foie, l'arrêt des médicaments permettra au foie de guérir de lui-même. Il est toujours préférable de ne pas consommer d'alcool lorsque vous *prenez des médicaments contre la tuberculose*.