



Les douleurs chroniques chez les aînés

n^o 34

Une forte proportion d'aînés déclarent souffrir de douleurs ou de malaises chroniques. En 1999, 27 % des aînés vivant chez eux ont dit éprouver des douleurs ou des malaises chroniques, alors que c'était le cas d'à peine plus de 21 % des personnes de 55 à 64 ans et de seulement 13 % de celles de 25 à 54 ans.

Les aînés d'âge plus avancé sont plus susceptibles que leurs homologues plus jeunes d'éprouver des douleurs ou des malaises chroniques. En 1999, 38 % des personnes de 85 ans ou plus vivant chez elles souffraient de douleurs chroniques, comparativement à 29 % de celles de 75 à 84 ans et à 24 % de celles de 65 à 74 ans.

En outre, parmi les aînés, les femmes sont quelque peu plus susceptibles que les hommes, soit 28 % contre 25 %, de souffrir de douleurs chroniques.

Les douleurs chroniques empêchent un grand nombre d'aînés de prendre part à certaines activités. En 1999, 22 % des personnes âgées ont déclaré que des douleurs ou des malaises chroniques les empêchaient de s'adonner à la quasi-totalité des activités, tandis qu'un autre quart se disaient incapables de participer à tout le moins à un certain nombre d'activités.

Pourcentage des aînés qui éprouvent des douleurs ou malaises chroniques, 1999

