

Portrait quotidien

de la consommation médicamenteuse
des personnes âgées non hébergées

Régime d'assurance médicaments
administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec

Les 9 juin 1996, 7 juin 1998 et 11 juin 2000

Recherche et conception

Louise Barnard
Sonia Lantin
Louise Roberge

Traitement informatique

Jean-Marie Parent
François Bédard
Renelle Grenier
Nathalie Côté
Katty Gagné

Révision

Danielle Doyon
Carole Chamberland

Traitement de texte

Louise Barnard
Line Bertrand

Révision linguistique

Diane Grégoire

Conception graphique

Caractéra

Conception et réalisation de la page couverture

Yolande Chatillon

Impression

La Renaissance

Rapport produit par la Régie de l'assurance maladie du Québec

Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec, 2001
ISBN 2-550-37341-3

Dans le présent rapport, le masculin désigne aussi bien les femmes que les hommes lorsque le contexte s'y prête.

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES	5
INTRODUCTION	7
1 - MÉTHODOLOGIE	9
1.1 Source des données	9
1.2 Population étudiée	9
1.3 Médicaments examinés	9
1.4 Ordonnances actives	10
1.5 Définitions des variables	10
1.6 Traitement des données	10
2 - RÉSULTATS	11
2.1 Population assurée	11
2.2 Population participante	11
2.3 Nombre d'ordonnances actives	12
2.4 Personnes participantes par type de médicament	14
2.4.1 Médicaments du système cardiovasculaire	14
2.4.2 Médicaments du système nerveux central (SNC)	16
2.4.3 Hormones et substituts	19
2.4.4 Médicaments du système gastro-intestinal	20
2.4.5 Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	20
2.5 Variations régionales	20
2.6 Prescription et approvisionnement	20
CONCLUSION	21
ANNEXE 1	23
Tableaux relatifs à la consommation médicamenteuse des personnes âgées non hébergées inscrites au régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000	
ANNEXE 2	45
Tableaux relatifs à la consommation médicamenteuse des personnes âgées non hébergées inscrites au régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998	
ANNEXE 3	67
Tableaux relatifs à la consommation médicamenteuse des personnes âgées non hébergées inscrites au régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996	

LISTE DES TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES

Tableau 1

Comparaison de certaines caractéristiques de la consommation médicamenteuse des personnes âgées pour un dimanche de juin, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 1996, 1998 et 2000

Graphique 1

Pourcentage de personnes âgées assurées ayant au moins une ordonnance active selon l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

Graphique 2

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

Graphique 3

Répartition des ordonnances selon les principales classes de médicaments, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, les 9 juin 1996, 7 juin 1998 et 11 juin 2000

Graphique 4

Pourcentage de personnes âgées assurées ayant au moins une ordonnance active de certaines sous-classes de médicaments cardiovasculaires, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

Graphique 5

Pourcentage de personnes âgées assurées ayant au moins une ordonnance active de certaines sous-classes de médicaments cardiovasculaires selon le groupe d'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

Graphique 6

Pourcentage de personnes âgées assurées ayant au moins une ordonnance active selon les sous-classes de médicaments cardiovasculaires, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, les 9 juin 1996, 7 juin 1998 et 11 juin 2000

Graphique 7

Pourcentage de personnes âgées assurées ayant au moins une ordonnance active de certaines sous-classes de médicaments du système nerveux central (SNC), régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

Graphique 8

Pourcentage de personnes âgées assurées ayant au moins une ordonnance active de certaines sous-classes de la classe hormones et substituts, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

INTRODUCTION

Les analyses de données sur la consommation médicamenteuse quotidienne facilitent la surveillance et le suivi de celle-ci et permettent de décrire les associations de médicaments. Ainsi, contrairement aux données colligées sur une base annuelle, celles qui le sont sur une base quotidienne rendent possible le repérage d'associations de médicaments de la même classe thérapeutique ainsi que de ceux présentant des interactions potentiellement dangereuses. Elles contribuent en outre à nous documenter sur les cas d'ingestion de plusieurs produits différents au cours d'une même journée, ce qui risque d'induire des maladies iatrogènes. De plus, les données sur la consommation médicamenteuse quotidienne se prêtent aux comparaisons à l'échelle tant nationale qu'internationale. Enfin, elles permettent d'éviter les écueils liés à la prise en compte des durées de traitement des ordonnances.

La Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) a rendu public en 1992 un rapport sur la consommation médicamenteuse des personnes âgées au cours de la journée du 7 avril 1991. Le grand intérêt manifesté à l'endroit de cette publication a incité la Régie à produire de nouveau des portraits quotidiens relativement à chacune des clientèles inscrites au régime d'assurance médicaments qu'elle administre : les prestataires d'assistance emploi, les adhérents et les personnes âgées de 65 ans ou plus. Le présent rapport, qui concerne la troisième clientèle¹, étant largement inspiré du rapport publié en 1992, nous tenons à souligner l'apport des auteurs de ce dernier.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux avait d'ailleurs inclus, dans sa stratégie d'action relative à l'utilisation rationnelle des médicaments chez les personnes âgées, la recommandation suivante : « S'assurer que la Régie de l'assurance maladie du Québec répète annuellement l'analyse du portrait quotidien de la consommation de médicaments chez les personnes âgées² ».

Les portraits quotidiens seront dorénavant effectués au cours du mois de juin de façon à ne pas sous-estimer la consommation médicamenteuse d'un certain nombre de Québécois et de Québécoises qui s'absentent de la province en hiver pour y revenir au printemps. Le jour de la semaine ne présentant aucune particularité, le choix d'un dimanche de juin est aléatoire.

La consommation de médicaments pour une journée donnée, dit jour d'observation, est examinée pour les 9 juin 1996, 7 juin 1998 et 11 juin 2000. Pour y arriver, il suffit de comptabiliser toutes les ordonnances de médicaments qui devraient, selon la date de leur dispensation et la durée de traitement, être consommés le jour d'observation retenu pour une année précise. La consommation médicamenteuse est analysée selon le sexe, le groupe d'âge et la région sociosanitaire de la clientèle, la classe de médicaments, le nombre de prescripteurs et le nombre de pharmaciens par consommateur.

Ce rapport comprend deux chapitres. Dans le premier chapitre est décrite la méthodologie retenue, c'est-à-dire la source des données, la population étudiée, les médicaments examinés, les ordonnances actives et la définition des variables. Pour sa part, le second chapitre présente les résultats quant au nombre d'ordonnances actives en fonction de la population assurée et de la population participante selon diverses variables. Il fait principalement état des résultats obtenus le 11 juin 2000 et qui constituent l'Annexe 1. Quant aux résultats relatifs aux années 1998 et 1996, ils sont respectivement présentés dans les Annexes 2 et 3. Nous y ferons référence au besoin pour souligner les tendances.

À la différence du rapport de 1992 qui réunissait les données descriptives sur la consommation médicamenteuse des personnes âgées ainsi que l'analyse des ordonnances potentiellement non appropriées, le présent rapport reprend la première partie alors que la deuxième partie fera l'objet d'un rapport distinct.

¹ Il s'agit d'environ 96 % des personnes âgées de 65 ans ou plus non hébergées, les autres s'étant retirées du régime public parce qu'elles ont accès à un régime privé.

² MSSS, *L'utilisation rationnelle des médicaments chez les personnes âgées. Stratégie d'action, Québec, 1994*, p. 34.

1 - MÉTHODOLOGIE

1.1 Source des données

Depuis le 1^{er} janvier 1997, les données relatives aux médicaments proviennent du fichier informatisé de la Régie constitué des demandes de paiement des pharmaciens. Par l'intermédiaire d'un réseau de communication interactive, tout médicament assuré et dispensé à une personne inscrite au fichier de la Régie est automatiquement enregistré dans celui-ci par le pharmacien³. Les renseignements ainsi saisis incluent, entre autres, le numéro d'assurance maladie et le nom de la personne assurée, le code du médicament, la quantité dispensée, la durée de traitement, le montant demandé par le pharmacien pour le médicament et le service ainsi que le numéro du prescripteur. Cette banque de données ne contient aucun renseignement sur le diagnostic des maladies, à l'exception de la tuberculose et de certaines maladies transmises sexuellement.

³ Avant cette date, les données étaient transmises à la Régie par les pharmaciens à l'aide de divers supports informatiques; l'enregistrement ne se faisait pas alors en temps réel.

⁴ Grâce à ce programme, des médicaments non inscrits sur la Liste de médicaments peuvent être autorisés pour traiter une personne assurée, lorsque la nature et la gravité de la maladie de même que le coût de la thérapie médicamenteuse lui imposent un fardeau financier difficilement acceptable.

1.2 Population étudiée

La population étudiée est constituée des personnes âgées de 65 ans ou plus inscrites au régime d'assurance médicaments administré par la Régie d'une façon continue au cours de la période d'observation. Ainsi, un groupe de personnes âgées est formé pour chacune des périodes étudiées, soit entre le 9 mars et le 9 juin 1996 inclusivement, entre le 7 mars et le 7 juin 1998 inclusivement et entre le 11 mars et le 11 juin 2000 inclusivement. Les personnes âgées qui demeurent dans un centre d'hébergement de soins de longue durée du réseau public sont exclues de l'étude, car elles ne sont pas inscrites au régime d'assurance médicaments administré par la Régie.

1.3 Médicaments examinés

Il s'agit des médicaments qui font partie de la *Liste de médicaments* publiée par la Régie dont les médicaments d'exception, les médicaments compris dans le programme de gratuité pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement ainsi que dans le programme de gratuité pour le traitement de la tuberculose. Soulignons que les données sur les médicaments contenues dans ce rapport se rapportent à la dispensation et non à la consommation de ceux-ci. Il est donc impossible de savoir s'ils ont été réellement consommés ni à quel moment, le cas échéant.

Ne sont pas considérés comme des médicaments les fournitures, les médicaments administrés dans le cadre du programme «patients d'exception»⁴ et les produits pharmaceutiques obtenus en vente libre, à moins qu'ils aient été prescrits et soient compris dans les médicaments assurés.

Les médicaments les plus fréquemment dispensés sont présentés par classe, parfois par sous-classe et sous-sous-classe. Ils constituent près de 96 % des médicaments à l'étude, les 4 % qui restent étant regroupés sous une même rubrique. Les groupes de médicaments cités correspondent à la classification pharmacothérapeutique de l'American Hospital Formulary Service (A.H.F.S.). Les médicaments sont réunis d'abord dans des classes et, ensuite, dans des sous-classes et des sous-sous-classes.

1.4 Ordonnances actives

Les ordonnances actives ne concernent que celles qui ont trait aux médicaments à l'étude. Comme la grande majorité des ordonnances ont une durée de traitement inférieure à 90 jours, les ordonnances rédigées au cours des 90 jours précédant le jour d'observation sont repérées dans le fichier des médicaments et examinées. À titre d'exemple, une ordonnance est considérée comme active le 11 juin 2000 si la date de service se situe entre le 11 mars et le 11 juin 2000 inclusivement et si la durée de traitement s'étend jusqu'au 11 juin 2000.

Sont toutefois exclus de l'étude, bien que les ordonnances soient actives le jour d'observation, les renouvellements accordés durant les journées qui précèdent immédiatement la fin de la durée de traitement de l'ordonnance précédente. Ainsi, toute ordonnance ayant pour objet le renouvellement d'une ordonnance d'une même dénomination commune, d'une même forme et d'une même teneur encore active le jour d'observation est éliminée.

1.5 Définition des variables

Personne âgée assurée

Personne âgée de 65 ans ou plus détenant une carte d'assurance maladie valide et inscrite au régime d'assurance médicaments administré par la Régie au cours des trois mois qui précèdent le jour d'observation y compris celui-ci.

Personne âgée participante

Personne âgée assurée qui a au moins une ordonnance active le jour d'observation.

Ordonnance active

Ordonnance dont la durée de traitement s'étend au jour d'observation.

Durée de traitement

Période correspondant au nombre de jours inscrits sur la demande de paiement remplie par le pharmacien et transmise à la Régie et qui s'applique à compter de la date de service de l'ordonnance.

Prescripteur

Professionnel de la santé, médecin ou dentiste, qui rédige l'ordonnance.

1.6 Traitement des données

Ce sont les analystes et techniciens en informatique du Service du développement et de l'entretien des systèmes de la Direction des systèmes d'information de la RAMQ qui ont traité les données. Le test du khi carré a été appliqué, l'erreur alpha acceptée est de 0,01.

2 - RÉSULTATS

Le portrait quotidien porte sur les caractéristiques des personnes assurées et des personnes participantes, sur le nombre d'ordonnances actives par personne ainsi que sur les types de médicaments dispensés. Les tableaux qui illustrent les résultats présentés dans cette section se trouvent dans les Annexes 1, 2 et 3.

L'analyse des résultats relatifs aux données régionales exclut les régions de Nunavik et Terres-cries-de-la-Baie-James et du Nord-du-Québec parce qu'elles diffèrent beaucoup des autres régions et que très peu de personnes y ont au moins une ordonnance active le jour d'observation.

2.1 Population assurée

Des 845 385 personnes âgées à l'étude le 11 juin 2000, 41,2 % sont des hommes, 58,8 % sont des femmes, 59,3 % ont de 65 à 74 ans, 32,5 %, de 75 à 84 ans, et 8,2 %, 85 ans ou plus (Tableau 1, Annexe 1). En 1996, les pourcentages étaient, dans le même ordre, respectivement de 41,1 %, de 58,9 %, de 62,4 %, de 30,3 % et de 7,3 % (Tableau 1, Annexe 3). Il y a donc eu vieillissement de la population âgée non hébergée au Québec entre 1996 et 2000.

Tableau 1

Comparaison de certaines caractéristiques de la consommation médicamenteuse des personnes âgées pour un dimanche de juin, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 1996, 1998 et 2000

	9 juin 1996	7 juin 1998	11 juin 2000
Nombre de personnes assurées	815 931	821 138	845 385
Nombre de personnes participantes	572 187	576 698	624 660
Pourcentage de personnes participantes	70,1	70,2	73,9
Nombre d'ordonnances actives	1 863 350	1 943 747	2 327 909
Nombre moyen d'ordonnances actives			
Par personne assurée	2,3	2,4	2,8
Par personne participante	3,3	3,4	3,7
Pourcentage de personnes participantes selon le nombre d'ordonnances actives ayant			
De 1 à 4 ordonnances	76,5	74,8	69,4
Au moins 5 ordonnances	23,5	25,2	30,6
Au moins 10 ordonnances	1,6	2,0	3,2

2.2 Population participante

Des 845 385 personnes âgées assurées, 624 660 (73,9 %) sont participantes, c'est-à-dire qu'elles ont au moins une ordonnance active le 11 juin 2000. Le pourcentage varie selon le sexe, l'âge et la région sociosanitaire. Il est de 67,8 % chez les hommes contre 78,2 % chez les femmes et il augmente avec l'âge : 67,8 % chez les 65-74 ans, 79,4 % chez les 75-84 ans et 81,9 % chez les 85 ans ou plus (Tableau 2, Annexe 1). En 1996, le pourcentage de personnes âgées participantes était de 70,1 %, soit près de 4 points de pourcentage de moins qu'en 2000 (Tableau 2, Annexe 3 ; Graphique 1).


Le pourcentage de personnes participantes fluctue : il passe de 71,0 % dans la région de Montréal-Centre à 79,4 % au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La différence observée selon le sexe se vérifie dans toutes les régions du Québec ; le pourcentage de femmes y est toujours supérieur à celui des hommes (Tableau 4, Annexe 1).

Les écarts entre les régions peuvent provenir de différentes répartitions selon l'âge, d'un état de santé dissemblable ou encore de divers comportements associés à des particularités culturelles. D'une façon générale toutefois, lorsque le taux régional global est élevé, les taux régionaux par groupe d'âge le sont également (Tableau 4, Annexe 1).

Graphique 1

Pourcentage de personnes âgées assurées ayant au moins une ordonnance active selon l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

F
H
Total



2.3 Nombre d'ordonnances actives


Il y a 2 327 909 ordonnances actives le 11 juin 2000 (Tableau 3, Annexe 1). À la même date, le nombre moyen d'ordonnances actives s'élève à 2,8 par personne âgée assurée et à 3,7 par personne âgée participante comparativement à 2,3 par personne assurée et à 3,3 par personne participante en 1996 (Tableau 3, Annexe 3). Nous notons donc une augmentation des deux moyennes entre 1996 et 2000. Il appert enfin que, même si plus de femmes que d'hommes prennent des médicaments, le nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante diffère peu selon le sexe : 3,6 chez les personnes de sexe masculin et 3,8 chez les personnes de sexe féminin. Par ailleurs, le nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante augmente avec l'âge ; il passe effectivement de 3,5 chez les 64-75 ans à 4,0 chez les 75-84 ans et à 4,2 chez les 85 ans ou plus (Tableau 3, Annexe 1).

Environ huit personnes participantes sur dix (80,7%) disposent d'au moins deux ordonnances actives en 2000 contre 76,4% en 1996. Ce taux est plus élevé chez les femmes que chez les hommes (82,2% contre 78,4%) et il s'accroît avec l'âge. Étant de 78,3% chez les 65-74 ans, il atteint 85,3% chez les 85 ans ou plus. Le pourcentage de personnes participantes ayant consommé au moins cinq médicaments le jour d'observation passe de 23,5% en 1996 à 30,6% en 2000, tandis que le pourcentage de celles qui en ont consommé au moins dix double entre 1996 et 2000, soit de 1,6% à 3,2% (Tableau 5, Annexe 1; Tableau 5, Annexe 3; Graphique 2).

Graphique 2

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

65-74 ans
75-84 ans
85 ans ou plus
Total




Près de la moitié (47,4%) des personnes ayant au moins cinq ordonnances actives le 11 juin 2000 les ont obtenues d'un seul prescripteur comparativement à 30,2% des personnes qui en ont au moins dix (Tableau 11, Annexe 1).

Deux classes de médicaments regroupent 55,4% des ordonnances actives le 11 juin 2000, soit 32,4% liées au traitement de maladies du système cardiovasculaire et 23,0% à celui de troubles du système nerveux central (SNC). Se retrouve au troisième rang la classe hormones et substituts avec 14,6% des ordonnances actives; les autres de

médicaments sont de moindre importance (Tableau 8, Annexe 1). En 1996, les deux classes de médicaments ayant les plus forts pourcentages d'ordonnances actives sont les mêmes qu'en 2000 et elles se présentent dans le même ordre: 31,4% et 26,1% (Tableau 8, Annexe 3; Graphique 3).

Graphique 3

Répartition des ordonnances actives selon les principales classes de médicaments, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, les 9 juin 1996, 7 juin 1998 et 11 juin 2000



Les ordonnances actives touchant ces trois classes de médicaments ne se répartissent pas d'une manière égale entre les hommes et les femmes. Dans chaque cas, celles-ci ont en effet le plus grand nombre d'ordonnances : 58,5 % pour ce qui est du système cardiovasculaire ; 65,2 % en ce qui a trait au système nerveux central ; 73,8 % en ce qui concerne les hormones et substituts.

2.4 Personnes participantes par type de médicament

Cette section porte sur les pourcentages de personnes âgées ayant au moins une ordonnance active de certaines classes, sous-classes et sous-sous-classes de médicaments. Le choix des données présentées est basé sur la prévalence d'utilisation et l'intérêt thérapeutique.


2.4.1 Médicaments du système cardiovasculaire

Cette classe de médicaments en inclut une grande variété qui possèdent des propriétés thérapeutiques fort différentes, comme nous le verrons plus loin. Le 11 juin 2000, 49,0 % des personnes âgées, soit 50,3 % des femmes et 47,0 % des hommes, en prennent au moins un, ce qui en fait la classe la plus fréquemment utilisée (graphique 4). Il en va de même pour 1998 (44,5 %) et pour 1996 (42,6 %). L'utilisation des médicaments du système cardiovasculaire croît avec l'âge. Les proportions sont effectivement de 45,4 % chez les 65-74 ans, de 54,1 % chez les 75-84 ans et de 54,5 % chez les 85 ans ou plus (Graphique 5).

Graphique 4

Pourcentage de personnes âgées assurées ayant au moins une ordonnance active de certaines sous-classes de médicaments cardiovasculaires selon le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

H
F



Cardiotropes

La sous-classe des cardiotropes regroupe certains β -bloquants, certains bloqueurs des canaux calciques, les antiarythmiques et les cardiotoniques. Ces médicaments sont utilisés entre autres dans le traitement de l'angine, de l'hypertension artérielle, de l'insuffisance cardiaque et de certains troubles du rythme cardiaque. Ils sont prescrits à 27,6 % des personnes âgées, soit à 26,5 % des hommes et à 28,3 % des femmes.

Antihypertenseurs et diurétiques

Les antihypertenseurs et les diurétiques servent à contrôler l'hypertension artérielle. C'est pourquoi ces deux sous-classes de médicaments sont présentées successivement, même si la seconde appartient à la classe des électrolytes-diurétiques.

La sous-classe des antihypertenseurs regroupe notamment certains β -bloquants et bloqueurs des canaux calciques (BCC) indiqués dans le traitement de l'hypertension artérielle et de l'angine, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IECA), associés ou non aux diurétiques,

utilisés dans des cas d'hypertension artérielle et d'insuffisance cardiaque et, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II, associés ou non aux diurétiques, indiqués aussi pour contrôler l'hypertension artérielle.

Quant aux médicaments compris dans la sous-classe des antihypertenseurs, 27,2 % des personnes âgées en utilisent au moins un le 11 juin 2000. L'augmentation s'avère constante depuis quatre ans, les proportions étant de 21,5 % en 1998 et de 19,2 % en 1996 (Graphique 6).

La mise en marché des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II, l'arrivée de nouvelles molécules dans le groupe des IECA ainsi que la mise à jour en 1999 des recommandations canadiennes relatives au diagnostic et au traitement de l'hypertension⁵ peuvent avoir contribué à l'augmentation de la prise d'antihypertenseurs.

Le 11 juin 2000, 19,9 % des personnes âgées, soit 23,3 % des femmes et 15,1 % des hommes, prennent des diurétiques. La proportion d'utilisateurs augmente avec l'âge.

⁵ Association médicale canadienne, «Recommandations de 1999 pour le traitement de l'hypertension artérielle au Canada», CMAJ, 1999; «Cardiovascular Disease in Seniors: The Canadian Heart Health Surveys», CMAJ, 1999.

Hypolipémiants

Les médicaments de la sous-classe des hypolipémiants servent à traiter l'hypercholestérolémie et les autres dyslipidémies. Leur utilisation a augmenté au fil des années. En réalité, 9,0 % des personnes âgées en avaient pris le 9 juin 1996, 12,4 %, le 7 juin 1998, et 17,2 %, le 11 juin 2000, soit 16,5 % des femmes et 18,4 % des hommes (Graphique 6).

Bien que, d'une manière générale, la consommation des médicaments du système cardiovasculaire augmente avec l'âge, les hypolipémiants font

exception. Ils sont en effet utilisés dans une plus grande proportion par les 65-74 ans (20,0 %) que par les 75-84 ans (15,4 %) et les 85 ans ou plus (4,3 %) (Graphique 5).


La publication de nouvelles indications dans le traitement par hypolipémiants ainsi que la fixation de nouvelles limites de niveaux de lipides recommandés par rapport aux facteurs de risque seraient responsables de l'augmentation de la prescription de ces médicaments.⁶

⁶ ASSOCIATION MÉDICALE CANADIENNE, «Recommendations for the Management and Treatment of Dyslipidemia: Report of Working Group on Hypercholesterolemia and other Dislipidémias», CMAJ, vol. 162, No 10, 2000; CMAJ, «Lipid Screening to Prevent Coronary Artery Disease: a Quantitative Evaluation of Evolving Guidelines», CMAJ, vol. 163, no 10, 2000.

Graphique 5

Pourcentage de personnes âgées ayant au moins une ordonnance active de certaines sous-classes de médicaments cardiovasculaires selon le groupe d'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

- 65-74 ans
- 75-84 ans
- 85 ans ou plus
- Total



Vasodilatateurs


Les vasodilatateurs sont prescrits pour traiter l'angine. Seulement 6,7 % des personnes âgées en prennent, ce qui en fait la sous-classe la moins utilisée des médicaments du système cardiovasculaire. En 1996, 7,4 % des personnes âgées en consommaient. La mise en évidence de l'efficacité d'autres types de médicaments dans le traitement de l'angine peut expliquer la diminution de la prise de vasodilatateurs traditionnels.

2.4.2 Médicaments du système nerveux central (SNC)

Les médicaments du SNC représentent la deuxième classe de médicaments la plus fréquemment utilisée (40,5 %) chez les personnes âgées le 11 juin 2000. Il en allait de même pour 1998 (37,2 %) et pour 1996 (39,6 %). La proportion d'utilisateurs est plus élevée chez les femmes (43,4 %) que chez les hommes (36,3 %). La consommation de ces médicaments augmente avec l'âge (Graphique 7).

Graphique 6

Pourcentage de personnes âgées assurées ayant au moins une ordonnance active selon les sous-classes de médicaments cardiovasculaires, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, les 9 juin 1996, 7 juin 1998 et 11 juin 2000



Analgésiques et antipyrétiques

La sous-classe des analgésiques et des antipyrétiques inclut principalement les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), l'acétaminophène, l'acide acétylsalicylique (ASA) et les dérivés de la morphine. Ces substances sont employées, entre autres choses, pour traiter la douleur aiguë ou chronique ainsi qu'en soins palliatifs. Pour leur part, les AINS sont utilisés particulièrement dans le traitement des douleurs causées par diverses pathologies articulaires, telles l'arthrose et l'arthrite.

La sous-classe des analgésiques et des antipyrétiques présente la plus grande prévalence d'utilisation le 11 juin 2000, soit 25,6%. À la même date, la sous-sous-classe des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) concerne 23,4% des personnes âgées, proportion qui dépasse celle de 1998 (18,9%) et de 1996 (20,8%). L'arrivée en 1999 des AINS sélectifs occasionnant moins d'effets gastro-intestinaux indésirables que les AINS non sélectifs a pu contribuer à l'augmentation de la proportion des utilisatrices et utilisateurs en 2000.

Anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques


L'importance de la sous-classe des anxiolytiques, des sédatifs et des hypnotiques est attribuable à la sous-sous-classe des benzodiazépines utilisés à court, à moyen et à long terme dans le traitement de diverses pathologies liées à l'anxiété et à l'insomnie.

La sous-classe des anxiolytiques, des sédatifs et des hypnotiques est la seconde en importance au sein de la classe du SNC avec une prévalence d'utilisation de 19,8%. La proportion des personnes âgées consommant des benzodiazépines atteint, à elle seule, 19,4%, soit près d'une personne âgée sur cinq. La proportion est de 23,0% chez les femmes, soit près de 2 fois plus élevée que celle des hommes (14,3%). Elle croît avec l'âge: 16,2% chez les 65-74 ans et 27,6% chez les 85 ans ou plus. Le pourcentage de personnes qui consomment des benzodiazépines, qui était de 21,3% en 1996, a diminué graduellement jusqu'en 2000.

Graphique 7

Pourcentage de personnes âgées assurées ayant au moins une ordonnance active de certaines sous-classes de médicaments du système nerveux central (SNC), selon le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

H
F



Ces médicaments ont longtemps constitué le principal traitement des troubles anxieux. Les nouveaux types d'antidépresseurs ont depuis acquis un rôle important dans la thérapie médicamenteuse des troubles liés à l'anxiété et permettent de modifier la consommation chronique de benzodiazépines.

Psychotropes

Les médicaments de la sous-classe des psychotropes incluent les antidépresseurs et les tranquillisants. La proportion de femmes (9,3%) utilisant des psychotropes est plus élevée que celle des hommes (4,8%). Au total, 7,5% des personnes âgées en prenaient le 11 juin 2000.

Antidépresseurs

Les antidépresseurs servent à traiter la dépression, certains cas de névrose et des troubles liés à l'anxiété. Le 11 juin 2000, 6,3% des personnes

âgées avaient au moins une ordonnance active d'antidépresseurs; la proportion est deux fois plus élevée chez les femmes (8,0%) que chez les hommes (3,9%). La consommation croît graduellement avec l'âge; elle est de 5,8% chez les 65-74 ans et de 7,5% chez les 85 ans ou plus.


Tranquillisants

Les tranquillisants majeurs sont prescrits dans certains cas de confusion et de décompensation psychotique; 1,6% des personnes âgées en consomment le 11 juin 2000. La proportion est plus élevée chez les femmes que chez les hommes (1,9% contre 1,1%) et elle augmente avec l'âge: 1,2% chez les 65-74 ans et 3,5% chez les 85 ans ou plus.

Graphique 8

Pourcentage de personnes âgées assurées ayant au moins une ordonnance active de certaines sous-classes de la classe hormones et substituts selon le groupe d'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

65-74 ans
75-84 ans
85 ans ou plus
Total



2.4.3 Hormones et substituts

Les hormones et substituts constituent la troisième classe de médicaments à laquelle ont recours le plus souvent les personnes âgées, avec 29,0%. Notons que la proportion a augmenté graduellement jusqu'en 2000 puisqu'elle s'établissait à 22,9% en 1996 (Graphique 8).

Médicaments thyroïdiens

Les médicaments thyroïdiens sont utilisés dans diverses affections de la thyroïde, dont l'hypothyroïdie principalement. Le 11 juin 2000, la proportion de femmes ayant au moins une ordonnance de ce type est près de 3 fois plus élevée que celle des hommes (17,3% contre 5,7%)⁷ pour une prévalence globale d'utilisation de 12,5%; elle était de 8,9% en 1996. La consommation augmente avec l'âge; elle passe de 11,2% chez les 65-74 ans à 15,5% chez les 85 ans ou plus.

Hypoglycémiantes

Le 11 juin 2000, 9,4% des personnes âgées consomment des hypoglycémiantes⁸ utilisés dans le traitement du diabète⁹. La proportion d'hommes qui en utilisent est plus élevée que celle des femmes (10,2% contre 8,8%). La proportion est aussi plus forte chez les 75-84 ans (10,1%) que chez les 65-74 ans (9,2%) et les 85 ans ou plus (7,3%).

Autres sous-classes regroupées

Ce regroupement comprend les sous-classes incluant les estrogènes et les progestatifs, principalement utilisés pour prévenir l'ostéoporose, ainsi que les androgènes, les antiestrogènes, les parathyroïdiens et les hormones hypophysaires prescrits pour traiter certains types de cancers ou des pathologies endocriniennes rares.

Ces médicaments sont employés presque exclusivement par des femmes (13,3% contre 0,2%). Leur utilisation décroît avec l'âge; elle passe de 10,7% chez les 65-74 ans à 4,4% chez les 75 - 84 ans, puis à 1,6% chez les 85 ans ou plus.

⁷ Dans le chapitre 13 du document *Enquête sociale et de santé 1998*, il est rapporté d'ailleurs que les troubles de la thyroïde touchent presque quatre fois plus de femmes que d'hommes de 65 ans ou plus (Institut de la statistique du Québec, 1998, p. 274-295).

⁸ Il s'agit d'hypoglycémiantes oraux et d'insuline.

⁹ Cette donnée s'approche de celle qui a été publiée dans *Enquête sociale et de santé 1998*. Il y est rapporté une prévalence du diabète de 11,0% chez les 65 ans ou plus (Institut de la statistique du Québec, 1998, p. 274-295).

2.4.4 Médicaments du système gastro-intestinal

Cette classe regroupe un ensemble de médicaments, dont les anti-ulcéreux. Ces derniers incluent les anti-H2 et les inhibiteurs de la pompe à protons principalement prescrits dans des cas d'ulcère peptique et de reflux gastro-œsophagien. Alors que 11,8 % des personnes âgées utilisent des médicaments appartenant à cette classe, 10,7 % prennent des médicaments de la sous-sous-classe des anti-ulcéreux.

2.4.5 Médicaments du système nerveux autonome (SNA)

Les médicaments du SNA ont de nombreux usages: les sympathomimétiques (asthme et affections pulmonaires); les parasympathomimétiques (problèmes urinaires et autres affections rares); les antiparkinsonniens (maladie de Parkinson et autres affections extra-pyramidales); les antispasmodiques (maladies pulmonaires obstructives chroniques tels l'emphysème et la bronchite chronique); les sympatholytiques (migraine); les relaxants musculaires (certaines affections du système locomoteur et maladies dégénératives).

Le 11 juin 2000, 5,5 % des personnes âgées utilisent des médicaments de cette classe. La proportion d'hommes utilisateurs (6,5 %) est plus élevée que celle des femmes utilisatrices (4,8 %). La sous-classe des sympathomimétiques concerne 3,2 % des personnes âgées, ce qui représente une baisse de près d'un point de pourcentage par rapport à 1996. Elle provient sans doute du fait que les affections pulmonaires sont traitées avec d'autres types de médicaments.

2.5 Variations régionales

En examinant le nombre d'ordonnances actives pour 1 000 personnes âgées assurées selon la région sociosanitaire, nous notons de bonnes différences entre certaines régions pour une même classe de médicaments, et cela se vérifie pour chacune des trois années.

C'est dans la région de Montréal-Centre qu'il y a généralement le plus faible taux d'ordonnances actives pour 1 000 personnes assurées. Il en est de même pour la région de Laval, bien qu'elle ait des taux moins bas. À l'opposé, se retrouvent les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Ces quatre régions occupaient des positions semblables en 1996 (Tableau 10, Annexe 1; Tableau 10, Annexe 3).

À titre d'exemples, le 11 juin 2000, le nombre d'ordonnances actives en ce qui a trait à la classe des médicaments du système cardiovasculaire pour 1 000 personnes assurées est, dans la région de Montréal-Centre, de 811 contre 1 024 dans celle du Bas-Saint-Laurent; quant au nombre d'ordonnances actives de médicaments du système nerveux central pour 1 000 personnes assurées, il s'élève à 555 dans la région de Laval comparativement à 783 dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (Tableau 10, Annexe 1; Tableau 10, Annexe 3).

2.6 Prescription et approvisionnement

Le nombre de prescripteurs augmente avec le nombre d'ordonnances actives. Ainsi, le 11 juin 2000, 79,7 % des personnes âgées ayant deux ordonnances actives les ont reçues d'un seul prescripteur, alors que la proportion est de 30,2 % chez celles qui en ont dix ou plus. Au total, 92,7 % des personnes âgées ayant au moins une ordonnance active le 11 juin 2000 ont eu un ou deux prescripteurs; les pourcentages étaient respectivement de 93,3 % en 1998 et de 94,0 % en 1996 (Tableau 11, Annexe 1; Tableau 11, Annexe 2; Tableau 11, Annexe 3).

Le 11 juin 2000, 99,9 % des personnes âgées ayant au moins une ordonnance active se sont approvisionnées auprès d'un ou de deux pharmaciens propriétaires, bien que le nombre de pharmaciens propriétaires dispensateurs augmente avec le nombre d'ordonnances actives. Les pourcentages étaient respectivement de 99,8 % en 1998 et de 99,7 % en 1996 (Tableau 12, Annexe 1; Tableau 12, Annexe 2; Tableau 12, Annexe 3).

CONCLUSION

Les personnes âgées non hébergées étant inscrites, dans une proportion de 96,0 %, au régime d'assurance médicaments qu'administre la RAMQ, l'examen de leur consommation médicamenteuse pour un dimanche de juin, sur une base bisannuelle, constitue une excellente façon de suivre les changements en ce domaine. Le fait que l'augmentation de la consommation médicamenteuse des personnes âgées soit plutôt survenue entre 1998 et 2000 qu'entre 1996 et 1998 pourrait en partie être la conséquence des changements apportés au programme d'assurance médicaments en août 1996. Ces changements, ayant augmenté la participation financière des consommateurs lors de leur approvisionnement en médicaments, ont pu entraîner une baisse temporaire de consommation.

Le 11 juin 2000, la proportion globale des personnes âgées ayant au moins une ordonnance active le jour d'observation est plus élevée chez les femmes (78,2 %) que chez les hommes (67,8 %). Cet état de fait se vérifie pour la plupart des classes et des sous-classes de médicaments, dont les psychotropes, les benzodiazépines et les thyroïdiens. Par ailleurs, il y a une plus forte proportion d'hommes que de femmes qui ont au moins une ordonnance active de médicaments du système nerveux autonome, d'hypolipémiants et d'hypoglycémiant. La proportion de personnes âgées ayant au moins une ordonnance active augmente avec l'âge pour tous les médicaments, à l'exception des hypolipémiants, des hypoglycémiant, des corticostéroïdes et des hormones prévenant l'ostéoporose.

Depuis 1996, l'augmentation de la consommation médicamenteuse pour un dimanche de juin se vérifie tant chez les deux sexes que chez les trois groupes d'âge de personnes âgées. Dans certains cas, comme celui des hypolipémiants et des antihypertenseurs par exemple, l'augmentation est probablement liée à un meilleur dépistage, doublé d'un traitement plus hâtif qu'avant. Par ailleurs, la consommation de benzodiazépines est en baisse; leur utilisation est généralement contre-indiquée à long terme chez les personnes âgées.

L'augmentation de la consommation médicamenteuse n'est expliquée qu'en partie par un pourcentage relativement plus grand de personnes âgées de 75 ans ou plus en 2000 qu'en 1996. En effet, le pourcentage de personnes âgées participantes est en hausse dans les trois groupes d'âge, de même que de personnes qui ont au moins trois, cinq ou dix ordonnances actives.

Le pourcentage de personnes âgées non hébergées au Québec ayant consommé au moins un médicament est de 70,2 % le 7 juin 1998 et de 73,9 % le 11 juin 2000 selon les fichiers informatisés de la Régie. Le pourcentage noté pour le 7 juin 1998 diffère de celui de 74,0 % qui est rapporté à la suite d'une enquête faite en 1998, dont la collecte de données s'est déroulée de janvier à décembre¹⁰. Cette dernière a été effectuée à l'aide d'un questionnaire rempli par l'intervieweur: elle portait sur la consommation médicamenteuse au cours des deux jours ayant précédé l'entrevue. Les écarts entre les deux sources de données collectées en 1998 proviennent probablement du caractère saisonnier de certains problèmes de santé, de certains comportements liés aux habitudes de vie ainsi que de l'inclusion, dans ladite enquête, de médicaments non prescrits au sein des médicaments prescrits lorsqu'ils avaient été consommés sur l'avis du médecin.

¹⁰ Institut de la statistique du Québec, « Consommation de médicaments » Enquête sociale et de santé 1998, chap. 22, Québec, 2000, p. 445-460.

Tableaux relatifs à la consommation médicamenteuse des personnes âgées non hébergées inscrites au régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000.

Tableau 1

Répartition des personnes âgées assurées selon le sexe, l'âge et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

Tableau 2

Répartition des personnes âgées assurées selon le nombre d'ordonnances actives, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

Tableau 3

Répartition des ordonnances actives chez les personnes âgées, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

Tableau 4

Principales caractéristiques de la consommation médicamenteuse des personnes âgées assurées selon le sexe, l'âge et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

Tableau 5

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives, l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

Tableau 6

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

Tableau 7

Personnes âgées assurées ayant au moins une ordonnance active de certains types de médicaments selon l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

Tableau 8

Répartition des ordonnances actives chez les personnes âgées assurées selon le type de médicaments, l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

Tableau 9

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 personnes âgées assurées selon le type de médicaments, l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

Tableau 10

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 personnes âgées assurées selon la région sociosanitaire et le type de médicaments, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

Tableau 11

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de prescripteurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

Tableau 12

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de pharmaciens propriétaires dispensateurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

Tableau 1

Répartition des personnes âgées assurées selon le sexe, l'âge et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

	LES DEUX SEXES					Total
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	
Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine	6 177	7 630	7 959	4 557	1 291	13 807 1,6%
Bas-St-Laurent	11 800	16 200	15 776	9 802	2 422	28 000 3,3%
Saguenay-Lac-St-Jean	13 303	18 067	19 884	9 569	1 917	31 370 3,7%
Québec	30 269	47 642	45 616	25 609	6 686	77 911 9,2%
Chaudière-Appalaches	18 599	25 474	25 664	14 664	3 745	44 073 5,2%
Mauricie-Bois-Francis	26 592	38 426	37 914	21 560	5 544	65 018 7,7%
Estrie	14 858	21 416	20 519	12 375	3 380	36 274 4,3%
Montréal-Centre	95 637	149 808	138 695	83 794	22 956	245 445 29,0%
Laval	16 917	22 641	25 347	11 536	2 675	39 558 4,7%
Laurentides	19 807	24 565	28 322	13 160	2 890	44 372 5,3%
Lanaudière	16 375	20 070	23 732	10 529	2 184	36 445 4,3%
Montréal	54 920	75 578	78 667	41 669	10 162	130 498 15,4%
Outaouais	10 914	14 471	15 825	7 794	1 766	25 385 3,0%
Abitibi-Témiscamingue	6 734	8 454	9 452	4 742	994	15 188 1,8%
Côte-Nord	3 983	4 438	5 719	2 246	456	8 421 1,0%
Nord-du-Québec	381	372	575	163	15	753 0,1%
Nunavik et Terres-cries-de-la-Baie-James	381	384	487	233	45	765 0,1%
Région indéterminée	880	1 222	1 265	646	191	2 102 0,3%
Ensemble du Québec	348 527 41,2%	496 858 58,8%	501 418 59,3%	274 648 32,5%	69 319 8,2%	845 385 100%

Tableau 2

Répartition des personnes âgées assurées selon le nombre d'ordonnances actives, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

	HOMMES				FEMMES				LES DEUX SEXES			
	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou plus	Total	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou plus	Total	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou plus	Total
Aucune ordonnance active	82 597 36,6%	25 190 24,4%	4 483 22,9%	112 270 32,2%	68 967 25,0%	31 450 18,4%	8 038 16,1%	108 455 21,8%	151 564 30,2%	56 640 20,6%	12 521 18,1%	220 725 26,1%
Au moins une ordonnance active	143 002 63,4%	78 131 75,6%	15 124 77,1%	236 257 67,8%	206 852 75,0%	139 877 81,6%	41 674 83,8%	388 403 78,2%	349 854 67,8%	218 008 79,4%	56 798 81,9%	624 660 73,9%
Au moins cinq ordonnances actives	36 362 16,1%	25 569 24,8%	5 167 26,4%	67 098 19,3%	57 442 20,8%	49 992 29,2%	16 715 33,6%	124 149 25,0%	93 804 18,7%	75 561 27,5%	21 882 31,6%	191 247 22,6%
Total	225 599 64,7%	103 321 29,7%	19 607 5,6%	348 527 100,0%	275 819 55,5%	171 327 34,5%	49 712 10,0%	496 858 100,0%	501 418 59,3%	274 648 32,5%	69 319 8,2%	845 385 100,0%

Tableau 3

**Répartition des ordonnances actives chez les personnes âgées,
régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ,
le 11 juin 2000**

HOMMES				
	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Total	485 501	300 587	58 992	845 080 36,3%
Moyenne par personne assurée	2,2	2,9	3,0	2,4
Moyenne par personne participante	3,4	3,9	3,9	3,6
FEMMES				
	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Total	738 770	566 078	177 981	1 482 829 63,7%
Moyenne par personne assurée	2,7	3,3	3,6	3,0
Moyenne par personne participante	3,6	4,1	4,3	3,8
TOTAL				
	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Total	1 224 271 52,6%	866 665 37,2%	236 973 10,2%	2 327 909 100,0%
Moyenne par personne assurée	2,4	3,2	3,4	2,8
Moyenne par personne participante	3,5	4,0	4,2	3,7

Tableau 4

Principales caractéristiques de la consommation médicamenteuse des personnes âgées assurées selon le sexe, l'âge et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

	LES DEUX SEXES					
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	4 350	6 273	5 806	3 749	1 068	10 623
% de l'ensemble	70,4%	82,2%	73,0%	82,3%	82,7%	76,9%
cinq ordonnances actives	1 396	2 258	1 739	1 462	453	3 654
% de l'ensemble	22,6%	29,6%	21,9%	32,1%	35,1%	26,5%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,7	3,4	2,8	3,5	3,6	3,1
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,9	4,1	3,8	4,3	4,4	4,0
Bas-St-Laurent						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	8 399	13 481	11 665	8 144	2 071	21 880
% de l'ensemble	71,2%	83,2%	73,9%	83,1%	85,5%	78,1%
cinq ordonnances actives	2 708	4 880	3 560	3 123	905	7 588
% de l'ensemble	23,0%	30,1%	22,6%	31,9%	37,4%	27,1%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,7	3,4	2,8	3,5	3,9	3,1
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,9	4,1	3,8	4,3	4,5	4,0
Saguenay-Lac-St-Jean						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	9 598	15 304	15 246	8 012	1 644	24 902
% de l'ensemble	72,2%	84,7%	76,7%	83,7%	85,8%	79,4%
cinq ordonnances actives	2 804	5 787	4 776	3 109	706	8 591
% de l'ensemble	21,1%	32,0%	24,0%	32,5%	36,8%	27,4%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,6	3,6	2,9	3,5	3,8	3,2
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,6	4,2	3,8	4,2	4,5	4,0
Québec						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	21 596	38 811	33 433	21 210	5 764	60 407
% de l'ensemble	71,4%	81,5%	73,3%	82,8%	86,2%	77,5%
cinq ordonnances actives	6 378	13 013	9 453	7 591	2 347	19 391
% de l'ensemble	21,1%	27,3%	20,7%	29,6%	35,1%	24,9%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,6	3,2	2,6	3,4	3,7	3,0
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,7	3,9	3,6	4,0	4,3	3,8

Tableau 4 (suite)

	LES DEUX SEXES					
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Chaudière-Appalaches						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	13 417	21 058	18 942	12 251	3 282	34 475
% de l'ensemble	72,1 %	82,7 %	73,8 %	83,5 %	87,6 %	78,2 %
cinq ordonnances actives	4 132	7 349	5 404	4 689	1 388	11 481
% de l'ensemble	22,2 %	28,9 %	21,1 %	32,0 %	37,1 %	26,1 %
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,7	3,3	2,7	3,5	3,9	3,0
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,7	4,0	3,6	4,2	4,4	3,9
Mauricie-Bois-Francs						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	18 580	30 859	27 126	17 616	4 697	49 439
% de l'ensemble	69,9 %	80,3 %	71,6 %	81,7 %	84,7 %	76,0 %
cinq ordonnances actives	5 194	9 785	7 145	5 987	1 847	14 979
% de l'ensemble	19,5 %	25,5 %	18,9 %	27,8 %	33,3 %	23,0 %
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,5	3,0	2,5	3,2	3,5	2,8
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,5	3,8	3,5	3,9	4,2	3,7
Estrie						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	10 185	17 061	14 447	10 004	2 795	27 246
% de l'ensemble	68,6 %	79,7 %	70,4 %	80,8 %	82,7 %	75,1 %
cinq ordonnances actives	2 866	5 550	3 754	3 576	1 086	8 416
% de l'ensemble	19,3 %	25,9 %	18,3 %	28,9 %	32,1 %	23,2 %
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,4	3,1	2,4	3,3	3,5	2,8
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,6	3,8	3,5	4,0	4,2	3,7
Montréal-Centre						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	62 015	112 333	92 630	63 737	17 981	174 348
% de l'ensemble	64,8 %	75,0 %	66,8 %	76,1 %	78,3 %	71,0 %
cinq ordonnances actives	16 834	32 990	23 199	20 295	6 330	49 824
% de l'ensemble	17,6 %	22,0 %	16,7 %	24,2 %	27,6 %	20,3 %
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,3	2,7	2,3	2,9	3,1	2,6
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,5	3,7	3,4	3,8	4,0	3,6

Tableau 4 (suite)

	LES DEUX SEXES					
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Laval						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	11 302	17 381	17 424	9 093	2 166	28 683
% de l'ensemble	66,8%	76,8%	68,7%	78,8%	81,0%	72,5%
cinq ordonnances actives	3 058	5 092	4 283	3 058	809	8 150
% de l'ensemble	18,1%	22,5%	16,9%	26,5%	30,2%	20,6%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,3	2,8	2,3	3,1	3,3	2,6
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,5	3,7	3,4	3,9	4,1	3,6
Laurentides						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	13 193	19 065	19 493	10 430	2 335	32 258
% de l'ensemble	66,6%	77,6%	68,8%	79,3%	80,8%	72,7%
cinq ordonnances actives	3 674	6 083	5 163	3 672	922	9 757
% de l'ensemble	18,6%	24,8%	18,2%	27,9%	31,9%	22,0%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,4	3,0	2,4	3,2	3,4	2,7
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,5	3,8	3,5	4,0	4,2	3,7
Lanaudière						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	11 150	16 054	16 873	8 481	1 850	27 204
% de l'ensemble	68,1%	80,0%	71,1%	80,6%	84,7%	74,6%
cinq ordonnances actives	3 353	5 480	4 900	3 169	764	8 833
% de l'ensemble	20,5%	27,3%	20,7%	30,1%	35,0%	24,2%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,5	3,2	2,6	3,4	3,7	2,9
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,7	4,0	3,7	4,2	4,3	3,9
Montérégie						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	37 213	58 504	54 221	33 028	8 468	95 717
% de l'ensemble	67,8%	77,4%	68,9%	79,3%	83,3%	73,4%
cinq ordonnances actives	10 136	18 167	13 809	11 257	3 237	28 303
% de l'ensemble	18,5%	24,0%	17,6%	27,0%	31,9%	21,7%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,4	2,9	2,4	3,1	3,5	2,7
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,5	3,8	3,4	4,0	4,2	3,7

Tableau 4 (suite)

	LES DEUX SEXES					
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Outaouais						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	7 100	10 953	10 558	6 108	1 387	18 053
% de l'ensemble	65,0%	75,7%	66,7%	78,4%	78,5%	71,1%
cinq ordonnances actives	2 088	3 630	3 035	2 142	541	5 718
% de l'ensemble	19,1%	25,1%	19,2%	27,5%	30,6%	22,5%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,4	2,9	2,4	3,1	3,2	2,7
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,6	3,9	3,6	4,0	4,1	3,8
Abitibi-Témiscamingue						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	4 621	6 650	6 712	3 765	794	11 271
% de l'ensemble	68,6%	78,7%	71,0%	79,4%	79,9%	74,2%
cinq ordonnances actives	1 372	2 415	1 968	1 486	333	3 787
% de l'ensemble	20,4%	28,6%	20,8%	31,3%	33,5%	24,9%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,5	3,2	2,6	3,4	3,4	2,9
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,7	4,1	3,7	4,2	4,3	3,9
Côte-Nord						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	2 743	3 468	4 085	1 768	358	6 211
% de l'ensemble	68,9%	78,1%	71,4%	78,7%	78,5%	73,8%
cinq ordonnances actives	857	1 232	1 244	697	148	2 089
% de l'ensemble	21,5%	27,8%	21,8%	31,0%	32,5%	24,8%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,6	3,2	2,7	3,4	3,4	2,9
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,7	4,1	3,7	4,3	4,3	3,9
Nord-du-Québec						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	253	292	401	131	13	545
% de l'ensemble	66,4%	78,5%	69,7%	80,4%	86,7%	72,4%
cinq ordonnances actives	78	126	148	53	3	204
% de l'ensemble	20,5%	33,9%	25,7%	32,5%	20,0%	27,1%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,5	3,4	2,8	3,6	3,3	2,9
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,7	4,4	4,0	4,4	3,8	4,1

Tableau 4 (suite)

LES DEUX SEXES						
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Nunavik et Terres-cries-de-la-Baie-James						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	13	27	22	16	2	40
% de l'ensemble	3,4%	7,0%	4,5%	6,9%	4,4%	5,2%
cinq ordonnances actives	6	3	7	2	0	9
% de l'ensemble	1,6%	0,1%	1,4%	1,0%	—	1,2%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	4,3	2,8	3,7	2,9	1,5	3,3
Région indéterminée						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	529	829	770	465	123	1 358
% de l'ensemble	60,1 %	67,8%	60,9%	72,0%	64,4%	64,6%
cinq ordonnances actives	164	309	217	193	63	473
% de l'ensemble	18,6%	25,3%	17,2%	29,9%	33,0%	22,5%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,2	2,7	2,2	3,0	3,1	2,5
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,7	4,0	3,6	4,2	4,8	3,9

Tableau 5

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives, l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

LES DEUX SEXES												
Nombre d'ordonnances actives	Hommes		Femmes		65 à 74 ans		75 à 84 ans		85 ans ou plus		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	51 096	21,6	69 263	17,8	75 878	21,7	36 113	16,6	8 368	14,7	120 359	19,3
2	46 745	19,8	73 818	19,0	72 515	20,7	38 934	17,9	9 114	16,1	120 563	19,3
3	40 045	17,0	67 087	17,3	61 229	17,5	36 746	16,9	9 157	16,1	107 132	17,2
4	31 273	13,2	54 086	13,9	46 428	13,3	30 654	14,1	8 277	14,6	85 359	13,7
5	22 656	9,6	40 660	10,5	32 626	9,3	23 930	11,0	6 760	11,9	63 316	10,1
6	15 828	6,7	28 728	7,4	22 063	6,3	17 440	8,0	5 053	8,9	44 556	7,1
7 à 9	21 671	9,2	41 437	10,7	29 531	8,4	25 755	11,8	7 822	13,8	63 108	10,1
10 ou plus	6 943	2,9	13 324	3,4	9 584	2,7	8 436	3,9	2 247	4,0	20 267	3,2
Sous-total (1 à 4)	169 159	71,6	264 254	68,0	256 050	73,2	142 447	65,3	34 916	61,5	433 413	69,4
Sous-total (5 ou plus)	67 098	28,4	124 149	32,0	93 804	26,8	75 561	34,7	21 882	38,5	191 247	30,6
Total	236 257	100,0 (37,8)	388 403	100,0 (62,6)	49 854	56,0	218 008	34,9	56 798	9,1	624 660	100,0

Tableau 6

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

Nombre d'ordonnances actives	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Bas-St-Laurent	Saguenay-Lac-St-Jean	Québec
1	17,1 %	16,4 %	16,2 %	18,2 %
2	17,5 %	17,3 %	17,9 %	18,8 %
3	16,7 %	17,0 %	16,9 %	17,1 %
4	14,3 %	14,6 %	14,5 %	13,9 %
5 ou plus	34,4 %	34,7 %	34,5 %	32,1 %
Taux d'ord. pour 1 000 personnes participantes	3 997	4 012	3 963	3 809

	Chaudière-Appalaches	Mauricie-Bois-Francs	Estrie	Montréal-Centre
1	17,7 %	19,1 %	19,4 %	20,6 %
2	17,9 %	19,6 %	19,4 %	20,1 %
3	17,3 %	17,1 %	16,9 %	17,3 %
4	13,8 %	13,9 %	13,5 %	13,4 %
5 ou plus	33,3 %	30,3 %	30,9 %	28,6 %
Taux d'ord. pour 1 000 personnes participantes	3 893	3 689	3 735	3 598

	Laval	Laurentides	Lanaudière	Montérégie
1	21,1 %	19,9 %	18,0 %	19,8 %
2	20,1 %	19,4 %	18,9 %	19,6 %
3	17,5 %	17,1 %	16,6 %	17,4 %
4	12,8 %	13,4 %	14,0 %	13,6 %
5 ou plus	28,4 %	30,3 %	32,5 %	29,6 %
Taux d'ord. pour 1 000 personnes participantes	3 578	3 686	3 871	3 678

Tableau 6 (suite)

Nombre d'ordonnances actives	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec
1	19,2 %	17,8 %	17,1 %	15,6 %
2	19,1 %	18,5 %	18,0 %	16,5 %
3	16,5 %	16,2 %	17,2 %	18,4 %
4	13,6 %	13,9 %	14,2 %	12,1 %
5 ou plus	31,7 %	33,6 %	33,6 %	37,4 %
Taux d'ord. pour 1 000 personnes participantes	3 782	3 905	3 928	4 066

	Nunavik et Terres-cries-de-la-Baie-James	Indéterminée
1	30,0 %	18,9 %
2	7,5 %	17,8 %
3	17,5 %	16,2 %
4	22,5 %	12,3 %
5 ou plus	22,5 %	34,8 %
Taux d'ord. pour 1 000 personnes participantes	3 300	3 898

Tableau 7

Personnes âgées assurées ayant au moins une ordonnance active de certains types de médicaments selon l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

	LES DEUX SEXES					Total
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	
1. Anti-infectieux	2,6%	3,2%	2,6%	3,4%	3,6%	3,0%
2. Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	6,5%	4,8%	5,0%	6,4%	5,8%	5,5%
sympathomimétiques	3,9%	2,7%	3,0%	3,7%	3,3%	3,2%
autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	3,9%	2,7%	2,8%	2,9%	3,5%	3,2%
3. Cardiovasculaires	47,0%	50,3%	45,4%	54,1%	54,5%	49,0%
cardiotropes	26,5%	28,3%	23,9%	32,4%	34,4%	27,6%
hypolipémiants	18,4%	16,5%	20,0%	15,4%	4,3%	17,2%
antihypertenseurs	27,0%	27,4%	24,6%	31,0%	31,2%	27,2%
vasodilatateurs	7,0%	6,5%	4,2%	9,2%	14,6%	6,7%
4. Médicaments du système nerveux central (SNC)	36,3%	43,4%	34,9%	47,3%	54,2%	40,5%
analgésiques et antipyrétiques	25,3%	25,9%	21,4%	30,7%	36,4%	25,6%
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	23,7%	23,2%	20,0%	27,8%	30,9%	23,4%
• autres analgésiques et antipyrétiques	2,9%	5,0%	2,6%	5,4%	9,6%	4,1%
anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	1,6%	1,5%	1,4%	1,7%	1,8%	1,5%
psychotropes	4,8%	9,3%	6,7%	8,3%	10,3%	7,5%
• antidépresseurs	3,9%	8,0%	5,8%	7,0%	7,5%	6,3%
• tranquillisants	1,1%	1,9%	1,2%	1,7%	3,5%	1,6%
anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	14,6%	23,4%	16,5%	23,7%	28,2%	19,8%
• benzodiazépines	14,3%	23,0%	16,2%	23,3%	27,6%	19,4%
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	0,6%	0,8%	0,7%	0,8%	0,9%	0,7%
autres psychotropes	0,3%	0,4%	0,4%	0,3%	0,1%	0,3%
5. Électrolytes-diurétiques	16,1%	27,5%	18,0%	27,8%	37,2%	22,8%
diurétiques	15,1%	23,3%	15,4%	24,6%	33,6%	19,9%
autres électrolytes-diurétiques	3,3%	8,5%	4,7%	7,9%	12,2%	6,4%
6. Oto-rhino-laryngologie	4,0%	4,7%	3,4%	5,7%	7,0%	4,4%

Tableau 7 (suite)

	LES DEUX SEXES					Total
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	
7. Gastro-intestinaux	10,4%	12,7%	9,8%	14,1%	16,9%	11,8%
divers gastro-intestinaux	10,2%	12,4%	9,6%	13,8%	16,5%	11,5%
• anti-ulcéreux	9,6%	11,6%	9,0%	12,8%	15,2%	10,7%
• agents de motilité ou prokinétiques	1,1%	1,8%	1,2%	1,9%	2,6%	1,5%
autres gastro-intestinaux	0,3%	0,4%	0,3%	0,4%	0,5%	0,3%
8. Hormones et substituts	19,0%	36,1%	29,4%	29,2%	25,9%	29,0%
corticostéroïdes	4,6%	3,8%	3,6%	5,0%	4,6%	4,1%
hypoglycémiantes	10,2%	8,8%	9,2%	10,1%	7,3%	9,4%
thyroïdiens	5,7%	17,3%	11,2%	14,2%	15,5%	12,5%
autres sous-classes regroupées	0,2%	13,3%	10,7%	4,4%	1,6%	7,9%
9. Peau et muqueuses	2,0%	1,9%	1,7%	2,3%	2,6%	1,9%
anti-inflammatoires	1,4%	1,4%	1,2%	1,6%	1,8%	1,4%
autres médicaments pour la peau et les muqueuses	0,7%	0,7%	0,6%	0,8%	1,1%	0,7%
10. Spasmodiques	2,0%	1,7%	1,4%	2,3%	2,8%	1,8%
respiratoires	1,4%	0,7%	0,8%	1,2%	1,0%	1,0%
11. Médicaments non classés	10,1%	9,7%	8,7%	11,6%	11,0%	9,8%
12. Sous-total de 1 à 11	67,3%	77,7%	69,3%	78,9%	81,3%	73,4%
13. Médicaments non compris en 12	10,1%	12,2%	9,4%	13,7%	15,8%	11,3%
14. Ensemble des médicaments	67,8%	78,2%	69,8%	79,4%	81,9%	73,9%

Tableau 8

Répartition des ordonnances actives chez les personnes âgées assurées selon le type de médicaments, l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

	LES DEUX SEXES					Total
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	
1. Anti-infectieux	1,2%	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%
2. Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	3,5%	1,9%	2,6%	2,6%	2,1%	2,5%
sympathomimétiques	1,8%	1,0%	1,4%	1,3%	1,0%	1,3%
autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	1,7%	0,9%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%
3. Cardiovasculaires	37,0%	29,7%	33,3%	32,0%	28,8%	32,4%
cardiotropes	12,9%	11,1%	11,4%	12,3%	12,2%	11,8%
hypolipémiants	7,7%	5,6%	8,4%	5,0%	1,3%	6,4%
antihypertenseurs	13,2%	10,6%	11,7%	11,5%	10,6%	11,5%
vasodilatateurs	3,8%	2,4%	1,9%	3,2%	4,7%	2,7%
4. Médicaments du système nerveux central (SNC)	22,0%	23,5%	21,9%	23,7%	26,1%	23,0%
analgésiques et antipyrétiques	11,8%	10,2%	10,0%	11,4%	12,7%	10,8%
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	10,5%	8,4%	8,8%	9,6%	9,8%	9,2%
• autres analgésiques et antipyrétiques	1,3%	1,8%	1,2%	1,8%	3,0%	1,6%
anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	0,8%	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,7%
psychotropes	2,3%	3,6%	3,2%	3,0%	3,4%	3,2%
• antidépresseurs	1,8%	2,9%	2,6%	2,4%	2,3%	2,5%
• tranquillisants	0,5%	0,7%	0,6%	0,6%	1,1%	0,7%
anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	6,7%	8,7%	7,6%	8,3%	9,0%	8,0%
• benzodiazépines	6,4%	8,4%	7,3%	8,0%	8,7%	7,7%
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
autres psychotropes	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%	—	0,1%
5. Électrolytes-diurétiques	8,0%	11,1%	8,5%	10,8%	14,2%	9,9%
diurétiques	6,6%	8,1%	6,6%	8,2%	10,4%	7,5%
autres électrolytes-diurétiques	1,4%	3,0%	2,0%	2,6%	3,8%	2,4%
6. Oto-rhino-laryngologie	2,2%	2,1%	1,8%	2,4%	2,7%	2,1%

Tableau 8 (suite)

	LES DEUX SEXES					Total
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	
7. Gastro-intestinaux	4,7%	4,8%	4,4%	4,9%	5,5%	4,7%
divers gastro-intestinaux	4,6%	4,6%	4,3%	4,8%	5,3%	4,6%
• anti-ulcéreux	4,0%	3,9%	3,7%	4,1%	4,5%	4,0%
• agents de motilité ou prokinétiques	0,5%	0,6%	0,5%	0,6%	0,8%	0,6%
autres gastro-intestinaux	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
8. Hormones et substituts	10,5%	17,0%	17,2%	12,4%	9,3%	14,6%
corticostéroïdes	2,0%	1,4%	1,6%	1,7%	1,4%	1,6%
hypoglycémiantes	6,0%	4,2%	5,5%	4,5%	2,8%	4,9%
thyroïdiens	2,4%	5,9%	4,7%	4,6%	4,6%	4,7%
autres sous-classes regroupées	0,1%	5,5%	5,5%	1,6%	0,5%	3,5%
9. Peau et muqueuses	0,9%	0,7%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%
anti-inflammatoires	0,6%	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%
autres médicaments pour la peau et les muqueuses	0,3%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
10. Spasmodiques	0,8%	0,6%	0,6%	0,8%	0,8%	0,7%
respiratoires	0,6%	0,2%	0,4%	0,4%	0,3%	0,4%
11. Médicaments non classés	4,8%	3,4%	3,9%	4,0%	3,5%	3,9%
12. Sous-total de 1 à 11	95,6%	95,8%	96,1%	95,3%	95,0%	95,7%
13. Médicaments non compris en 12	4,4%	4,2%	4,9%	4,7%	5,0%	4,3%
Nombre d'ordonnances actives	845 080	1 482 829	1 224 271	866 665	236 973	2 327 909

Tableau 9

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 personnes âgées assurées selon le type de médicaments, l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

	LES DEUX SEXES					Total
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	
1. Anti-infectieux	28	34	28	36	37	31
2. Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	85	58	62	81	71	69
sympathomimétiques	44	30	33	41	35	36
autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	41	28	29	40	36	33
3. Cardiovasculaires	897	886	814	1 009	983	891
cardiotropes	314	332	277	387	417	325
hypolipémiants	188	167	204	156	44	176
antihypertenseurs	319	316	286	364	363	317
vasodilatateurs	77	71	46	101	159	73
4. Médicaments du système nerveux central (SNC)	534	702	534	747	890	633
analgésiques et antipyrétiques	285	305	243	359	435	297
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	254	252	215	302	334	253
• autres analgésiques et antipyrétiques	31	53	29	57	101	44
anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	19	18	17	19	21	18
psychotropes	56	109	78	95	117	87
• antidépresseurs	43	87	64	76	80	69
• tranquillisants	13	21	14	19	37	18
anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	162	260	185	261	307	220
• benzodiazépines	155	252	178	253	297	212
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	6	8	7	8	10	8
autres psychotropes	3	4	4	3	1	4
5. Électrolytes-diurétiques	194	330	209	339	485	274
diurétiques	160	241	160	257	356	208
autres électrolytes-diurétiques	34	89	48	82	128	66
6. Oto-rhino-laryngologie	52	61	43	75	94	57

Tableau 9 (suite)

	LES DEUX SEXES					Total
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	
7. Gastro-intestinaux	114	142	108	156	189	130
divers gastro-intestinaux	111	137	105	151	182	126
• anti-ulcéreux	97	117	91	130	154	109
• agents de motilité ou prokinétiques	11	18	12	19	27	15
autres gastro-intestinaux	3	4	3	4	5	3
8. Hormones et substituts	255	506	421	390	319	403
corticostéroïdes	49	40	38	53	48	44
hypoglycémiants	146	125	134	142	96	133
thyroïdiens	58	177	115	145	158	128
autres sous-classes regroupées	2	163	133	50	17	97
9. Peau et muqueuses	22	22	19	25	30	22
anti-inflammatoires	15	15	13	17	19	15
autres médicaments pour la peau et les muqueuses	7	7	6	8	11	7
10. Spasmolytiques	20	17	14	24	29	18
respiratoires	14	7	9	12	10	10
11. Médicaments non classés	116	100	94	126	119	107
12. Médicaments non inclus ci-haut	122	146	112	166	191	136
13. Ensemble des médicaments	2 425	2 984	2 442	3 156	3 419	2 754

Tableau 10

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 personnes âgées assurées selon la région sociosanitaire et le type de médicaments, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

Classe de médicaments	RÉGIONS SOCIOSANITAIRES																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	99
1. Anti-infectieux	33	34	34	28	31	32	30	34	26	36	30	33	31	30	30	30	4	33
2. Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	100	92	70	68	59	59	82	88	83	129	104	70	56	81	74	67	12	87
sympathomimétiques	55	54	38	31	29	29	44	40	51	64	57	38	30	40	42	35	8	49
autres médicaments système nerveux autonome (SNA)	45	38	32	37	29	30	37	48	32	65	47	33	27	41	32	33	4	38
3. Cardiovasculaires	1 024	1 009	975	899	907	811	870	928	1 063	969	982	966	854	966	870	881	61	784
cardiotropes	345	369	351	319	319	302	319	328	383	327	338	337	310	348	315	335	21	285
hypolipémiants	230	200	219	170	187	153	150	169	240	226	189	212	167	203	167	160	12	157
antihypertenseurs	356	364	318	326	321	293	329	335	343	348	373	337	306	344	315	318	26	278
vasodilatateurs	93	75	86	84	81	62	72	95	97	69	92	79	71	71	73	69	3	63
4. Médicaments du système nerveux central (SNC)	780	783	702	699	667	562	611	673	642	563	713	709	555	633	604	616	25	631
analgésiques et antipyrétiques	350	370	306	315	332	270	274	351	327	288	335	309	271	303	296	290	21	269
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	288	322	250	274	290	225	239	306	294	260	277	260	233	264	264	251	18	214
• autres analgésiques et antipyrétiques	63	48	56	41	43	44	35	46	34	28	58	49	37	39	32	39	3	55
anticonvulsivants (sauf benzodiazépines)	20	19	23	18	17	19	19	14	14	19	19	21	16	16	15	17	–	22
psychotropes	97	112	96	92	89	83	104	77	65	70	81	86	73	83	79	85	–	72
• antidépresseurs	78	98	75	72	73	64	89	65	57	65	70	67	59	64	65	67	–	58
• tranquillisants	19	14	21	20	16	19	15	12	9	5	11	19	14	19	14	18	–	15
anxiolytiques, sédatifs, hypnotiques	302	270	265	263	218	179	204	220	228	175	268	278	184	220	205	212	4	255
• benzodiazépines	291	260	254	253	210	173	196	215	222	171	261	269	180	214	199	205	4	249
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	11	10	11	10	7	7	8	5	6	4	8	10	5	6	6	7	–	6
autres psychotropes	4	5	5	3	3	3	4	4	2	7	4	7	3	4	3	4	–	3
5. Électrolytes-diurétiques	276	256	268	278	254	280	267	253	203	240	264	294	281	294	277	269	2	219
diurétiques	221	197	216	203	182	209	206	180	162	155	202	245	207	216	208	205	16	159
autres électrolytes-diurétiques	55	59	52	75	72	71	61	72	41	84	62	49	74	78	69	63	8	59

Tableau 10 (suite)

Classe de médicaments	RÉGIONS SOCIO SANITAIRES																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	99
6. Oto-rhino-laryngologie	43	54	67	56	49	59	55	52	53	54	56	59	54	59	58	57	4	54
7. Gastro-intestinaux	159	160	138	122	155	117	147	157	157	133	192	137	115	131	123	126	9	119
divers gastro-intestinaux	156	154	133	119	151	112	145	153	152	130	187	132	111	127	119	122	9	111
• antiulcéreux	132	129	115	102	128	100	124	132	131	109	151	108	97	107	104	107	8	101
• agents de motilité ou procinétiques	22	24	17	16	22	10	19	20	20	20	32	23	13	17	14	13	1	9
autres gastro-intestinaux	3	4	3	2	3	4	2	2	3	-	3	3	3	3	3	3	-	6
8. Hormones et substituts	443	525	428	395	389	365	388	449	439	542	430	486	386	448	396	387	20	351
corticostéroïdes	53	54	45	46	39	37	39	48	49	74	58	52	40	54	47	46	3	45
hypoglycémiant	113	112	126	134	125	138	145	130	134	127	160	122	134	149	134	137	8	108
thyroïdiens	155	145	144	123	133	113	128	157	135	166	104	184	126	138	119	121	3	111
autres sous-classes regroupées	122	215	113	93	92	77	76	114	122	174	108	128	86	106	96	84	7	86
9. Peau et muqueuses	22	21	24	17	19	27	21	18	17	25	23	17	23	16	19	19	1	25
anti-inflammatoires	15	15	17	13	13	18	14	13	13	19	18	11	15	11	13	13	1	17
autres médicaments peau et muqueuses	6	6	7	5	6	9	6	4	4	7	6	6	7	5	6	6	-	8
10. Spasmodiques	24	21	20	22	16	16	18	23	12	31	24	22	15	17	21	18	1	18
respiratoires	12	9	10	13	9	8	11	14	7	27	14	11	8	11	12	9	-	9
11. Médicaments non classifiés	94	90	108	88	118	113	88	100	79	88	101	117	109	105	106	111	1	92
12. Médicaments non inclus ci-haut	167	134	141	148	159	126	123	143	143	158	175	160	131	128	117	133	12	127

Légende des régions sociosanitaires

- | | |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Bas-St-Laurent | 10. Nord-du-Québec |
| 2. Saguenay-Lac-St-Jean | 11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine |
| 3. Québec | 12. Chaudière-Appalaches |
| 4. Mauricie-Bois-Francs | 13. Laval |
| 5. Estrie | 14. Lanaudière |
| 6. Montréal-Centre | 15. Laurentides |
| 7. Outaouais | 16. Montérégie |
| 8. Abitibi | 20. Nunavik et Terres-cries-de-la-Baie-James |
| 9. Côte-Nord | 99. Indéterminée |

Tableau 11

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de prescripteurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

Nombre d'ordonnances actives	NOMBRE DE PRESCRIPTEURS									
	1		2		3		4 ou plus		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	120 359	100,0	–	–	–	–	–	–	120 359	100,0
2	96 052	79,7	24 511	20,3	–	–	–	–	120 563	100,0
3	74 722	69,8	28 400	26,5	4 010	3,7	–	–	107 132	100,0
4	53 295	62,4	25 568	30,0	5 934	7,0	562	0,7	85 359	100,0
5	35 401	55,9	20 551	32,5	6 196	9,8	1 168	1,8	63 316	100,0
6	22 257	50,0	15 380	34,5	5 413	12,2	1 506	3,4	44 556	100,0
7 à 9	26 883	42,6	22 179	35,1	9 896	15,7	4 150	6,6	63 108	100,0
10 ou plus	6 120	30,2	6 798	33,5	4 232	20,9	3 117	15,4	20 267	100,0
Sous-total 1 à 4	344 428	79,5	78 479	18,1	9 944	2,3	562	0,1	433 413	100,0
Sous-total 5 ou plus	90 661	47,4	64 908	33,9	25 737	13,5	9 941	5,2	191 247	100,0
Total	435 089	69,7	143 387	23,0	35 681	5,7	10 503	1,7	624 660	100,0

Tableau 12

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de pharmaciens propriétaires dispensateurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 11 juin 2000

Nombre d'ordonnances actives	NOMBRE DE PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES									
	1		2		3		4 ou plus		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	120 359	100,0	–	–	–	–	–	–	120 359	100,0
2	116 886	97,0	3 677	3,0	–	–	–	–	120 563	100,0
3	102 266	95,8	4 377	4,1	89	0,1	–	–	107 132	100,0
4	81 381	95,3	3 850	4,5	125	0,2	3	–	85 359	100,0
5	60 035	94,8	3 149	5,0	124	0,2	8	–	63 316	100,0
6	42 048	94,4	2 385	5,4	116	0,3	7	–	44,556	100,0
7 à 9	59 238	93,9	3 716	5,9	141	0,2	13	–	63 108	100,0
10 ou plus	18 808	92,8	1 356	6,7	93	0,5	10	0,1	20 267	100,0
Sous-total 1 à 4	421 292	97,2	11 904	2,7	214	0,1	3	–	433 413	100,0
Sous-total 5 ou plus	161 321	94,4	9 250	5,4	381	0,2	28	–	191 247	100,0
Total	601 421	96,3	22 510	3,6	688	0,1	41	–	624 660	100,0

Tableaux relatifs à la consommation médicamenteuse des personnes âgées non hébergées inscrites au régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998

Tableau 1

Répartition des personnes âgées assurées selon le sexe, l'âge et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998

Tableau 2

Répartition des personnes âgées assurées selon le nombre d'ordonnances actives, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998

Tableau 3

Répartition des ordonnances actives chez les personnes âgées, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998

Tableau 4

Principales caractéristiques de la consommation médicamenteuse des personnes âgées assurées selon le sexe, l'âge et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998

Tableau 5

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives, l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998

Tableau 6

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998

Tableau 7

Personnes âgées assurées ayant au moins une ordonnance active de certains types de médicaments selon l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998

Tableau 8

Répartition des ordonnances actives chez les personnes âgées assurées selon le type de médicaments, l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998

Tableau 9

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 personnes âgées assurées selon le type de médicaments, l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998

Tableau 10

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 personnes âgées assurées selon la région sociosanitaire et le type de médicaments, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998

Tableau 11

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de prescripteurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998

Tableau 12

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de pharmaciens propriétaires dispensateurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998

Tableau 1

Répartition des personnes âgées assurées selon le sexe, l'âge et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998

	LES DEUX SEXES					Total
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	
Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine	5 533	6 976	7 347	4 083	1 079	12 509 1,5%
Bas-St-Laurent	10 904	14 831	15 023	8 687	2 025	25 735 3,1%
Saguenay-Lac-St-Jean	11 920	16 005	18 198	8 152	1 575	27 925 3,4%
Québec	27 414	43 995	42 555	23 138	5 716	71 409 8,7%
Chaudière-Appalaches	16 914	23 226	23 823	13 277	3 040	40 140 4,9%
Mauricie-Bois-Francis	24 287	35 250	35 526	19 379	4 632	59 537 7,3%
Estrie	13 454	19 514	19 062	11 074	2 832	32 968 4,0%
Montréal-Centre	89 769	141 929	134 463	77 155	20 080	231 698 28,2%
Laval	14 895	20 184	22 931	9 876	2 272	35 079 4,3%
Laurentides	17 505	22 140	25 701	11 492	2 452	39 645 4,8%
Lanaudière	14 442	17 866	21 315	9 114	1 879	32 308 3,9%
Montréal	49 427	68 783	72 507	37 146	8 557	118 210 14,4%
Outaouais	9 960	13 216	14 665	7 010	1 501	23 176 2,8%
Abitibi-Témiscamingue	6 064	7 520	8 693	4 135	756	13 584 1,7%
Côte-Nord	3 473	3 823	4 989	1 947	360	7 296 0,9%
Nord-du-Québec	323	288	467	124	20	611 0,1%
Nunavik et Terres-cries-de-la-Baie-James	292	327	383	193	43	619 0,1%
Région indéterminée	21 281	27 408	31 194	12 885	4 610	48 689 5,9%
Ensemble du Québec	337 857 41,1%	483 281 58,9%	498 842 60,8%	258 867 31,5%	63 429 7,7%	821 138 100,0%

Tableau 2

Répartition des personnes âgées assurées selon le nombre d'ordonnances actives, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998

	HOMMES				FEMMES				LES DEUX SEXES			
	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou plus	Total	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou plus	Total	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou plus	Total
Aucune ordonnance active	89 571 40,1%	26 527 27,5%	4 552 25,3%	120 650 35,7%	80 692 29,3%	34 684 21,4%	8 414 18,5%	123 790 25,6%	170 263 34,1%	61 211 23,7%	12 966 20,4%	244 440 29,8%
Au moins une ordonnance active	133 711 59,9%	70 053 72,5%	13 443 74,7%	217 207 64,3%	194 868 70,7%	127 603 78,6%	37 020 81,5%	359 491 74,4%	328 579 65,9%	197 656 76,4%	50 463 79,6%	576 698 70,2%
Au moins cinq ordonnances actives	28 741 12,9%	19 811 20,5%	3 981 22,1%	52 533 15,6%	42 894 15,6%	37 099 22,9%	12 486 27,5%	92 479 19,1%	71 635 14,4%	56 910 22,0%	16 467 26,0%	145 012 17,7%
Total	223 282 66,1%	96 580 28,6%	17 995 5,3%	337 857 100,0%	275 560 57,0%	162 287 33,6%	45 434 9,4%	483 281 100,0%	498 842 60,8%	258 867 31,5%	63 429 7,7%	821 138 100,0%

Tableau 3

**Répartition des ordonnances actives chez les personnes âgées,
régime d'assurance médicaments administré
par la RAMQ, le 7 juin 1998**

HOMMES				
	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Total	420 186	248 573	48 429	717 188 36,9%
Moyenne par personne assurée	1,9	2,6	2,7	2,1
Moyenne par personne participante	3,1	3,6	3,6	3,3
FEMMES				
	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Total	622 898	461 036	142 625	1 226 559 63,1%
Moyenne par personne assurée	2,3	2,8	3,1	2,5
Moyenne par personne participante	3,2	3,6	3,9	3,4
TOTAL				
	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Total	1 043 53,7%	709 609 36,5%	191 054 9,8%	1 943 747 100,0%
Moyenne par personne assurée	2,1	2,7	3,0	2,4
Moyenne par personne participante	3,2	3,6	3,8	3,4

Tableau 4

**Principales caractéristiques de la consommation médicamenteuse
des personnes âgées assurées selon le sexe, l'âge et la région sociosanitaire,
régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998**

	LES DEUX SEXES					
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	3 736	5 481	5 113	3 228	876	9 217
% de l'ensemble	67,5%	78,6%	69,6%	79,1%	81,2%	73,7%
cinq ordonnances actives	1 053	1 594	1 267	1 077	303	2 647
% de l'ensemble	19,0%	22,8%	17,2%	26,4%	28,1%	21,2%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,4	2,8	2,3	3,0	3,2	2,6
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,6	3,6	3,4	3,8	3,9	3,6
Bas-St-Laurent						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	7 352	11 883	10 637	6 937	1 661	19 235
% de l'ensemble	67,4%	80,1%	70,8%	79,9%	82,0%	74,7%
cinq ordonnances actives	1 998	3 431	2 618	2 220	591	5 429
% de l'ensemble	18,3%	23,1%	17,4%	25,6%	29,2%	21,1%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,3	2,9	2,4	3,0	3,2	2,7
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,5	3,6	3,4	3,8	3,9	3,6
Saguenay-Lac-St-Jean						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	8 224	13 180	13 407	6 671	1 326	21 404
% de l'ensemble	69,0%	82,4%	73,7%	81,8%	84,2%	76,7%
cinq ordonnances actives	1 899	3 895	3 271	2 059	464	5 794
% de l'ensemble	15,9%	24,3%	18,0%	25,3%	29,5%	20,7%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,2	3,0	2,5	3,1	3,3	2,7
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,2	3,7	3,3	3,8	4,0	3,5
Québec						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	18 746	34 329	299 793	18 518	4 764	53 075
% de l'ensemble	68,4%	78,0%	70,0%	80,0%	83,3%	74,3%
cinq ordonnances actives	4 635	9 009	6 599	5 493	1 552	13 644
% de l'ensemble	16,9%	20,5%	15,5%	23,7%	27,2%	19,1%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,3	2,7	2,2	2,9	3,2	2,5
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,3	3,4	3,2	3,6	3,8	3,4

Tableau 4 (suite)

	LES DEUX SEXES					
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Chaudière-Appalaches						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	11 704	18 431	16 857	10 688	2 590	30 135
% de l'ensemble	69,2%	74,4%	70,8%	80,5%	85,2%	75,1%
cinq ordonnances actives	3 058	5 087	3 862	3 377	906	8 145
% de l'ensemble	18,1%	21,9%	16,2%	25,4%	29,8%	20,3%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,4	2,8	2,3	3,0	3,33	2,6
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,4	3,5	3,2	3,8	3,9	3,5
Mauricie-Bois-Francs						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	16 182	26 975	24 052	15 288	3 817	43 157
% de l'ensemble	66,6%	76,5%	67,7%	78,9%	82,4%	72,5%
cinq ordonnances actives	3 711	6 584	4 987	4 112	1 196	10 295
% de l'ensemble	15,3%	18,7%	14,0%	21,2%	25,8%	17,3%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,2	2,5	2,1	2,7	3,1	2,4
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,2	3,3	3,1	3,5	3,7	3,3
Estrie						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	8 834	14 781	12 778	8 552	2 285	23 615
% de l'ensemble	65,7%	75,8%	67,0%	77,2%	80,7%	71,6%
cinq ordonnances actives	2 103	3 838	2 723	2 481	737	5 941
% de l'ensemble	15,6%	19,7%	14,3%	22,4%	26,0%	18,0%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,2	2,6	2,1	2,8	3,0	2,4
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,3	3,4	3,1	3,6	3,8	3,4
Montréal-Centre						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	55 128	100 499	84 229	56 138	15 260	155 627
% de l'ensemble	61,4%	70,8%	36,4%	24,2%	6,6%	67,2%
cinq ordonnances actives	12 625	23 852	17 166	14 731	4 580	36 477
% de l'ensemble	14,1%	16,8%	12,8%	19,1%	22,8%	15,7%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,0	2,3	1,9	2,5	2,8	2,2
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,2	3,3	3,1	3,4	3,6	3,3

Tableau 4 (suite)

	LES DEUX SEXES					
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Laval						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	9 373	14 586	14 729	7 444	1 786	23 959
% de l'ensemble	62,9%	72,3%	64,2%	75,4%	78,6%	68,3%
cinq ordonnances actives	2 098	3 423	2 884	2 037	600	5 521
% de l'ensemble	14,1%	17,0%	12,6%	20,6%	26,4%	15,7%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,0	2,4	2,0	2,7	3,0	2,2
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,2	3,3	3,1	3,5	3,8	3,3
Laurentides						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	11 077	16 266	16 649	8 750	1 944	27 343
% de l'ensemble	63,3%	73,5%	64,8%	76,1%	79,3%	69,0%
cinq ordonnances actives	2 631	4 147	3 560	2 574	644	6 778
% de l'ensemble	15,0%	18,7%	13,9%	22,4%	26,3%	17,1%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,1	2,5	2,0	2,8	3,0	2,3
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,3	3,4	3,2	3,6	3,8	3,4
Lanaudière						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	9 311	13 537	14 230	7 077	1 541	22 848
% de l'ensemble	64,5%	75,8%	66,8%	77,7%	82,0%	70,7%
cinq ordonnances actives	2 322	3 718	3 292	2 190	558	6 040
% de l'ensemble	16,1%	20,8%	15,4%	24,0%	29,7%	18,7%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,2	2,7	2,2	2,9	3,3	2,5
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,4	3,5	3,3	3,7	4,0	3,5
Montérégie						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	50 736	31 648	47 100	28 375	6 909	82 384
% de l'ensemble	73,8%	64,0%	65,0%	76,4%	80,7%	69,7%
cinq ordonnances actives	7 570	12 881	10 099	8 004	2 348	20 451
% de l'ensemble	15,3%	18,7%	13,9%	21,5%	27,4%	17,3%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,1	2,5	2,0	2,7	3,1	2,3
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,3	3,4	3,1	3,6	3,9	3,4

Tableau 4 (suite)

	LES DEUX SEXES					
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Outaouais						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	6 198	9 763	9 499	5 319	1 143	15 961
% de l'ensemble	62,2%	73,9%	64,8%	75,9%	76,2%	68,9%
cinq ordonnances actives	1 528	2 717	2 250	1 611	384	4 245
% de l'ensemble	15,3%	20,6%	15,3%	23,0%	25,6%	18,3%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,1	2,6	2,1	2,8	2,9	2,4
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,3	3,5	3,3	3,6	3,8	3,5
Abitibi-Témiscamingue						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	3 911	5 717	5 894	3 155	579	9 628
% de l'ensemble	64,5%	76,0%	67,8%	76,3%	76,6%	70,9%
cinq ordonnances actives	998	1 579	1 415	988	174	2 577
% de l'ensemble	16,5%	21,0%	16,3%	23,9%	23,0%	19,0%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,2	2,7	2,3	2,9	2,8	2,5
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,4	3,5	3,3	3,7	3,7	3,5
Côte-Nord						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	2 218	2 853	3 320	1 472	279	5 071
% de l'ensemble	63,9%	74,6%	66,6%	75,6%	77,5%	69,5%
cinq ordonnances actives	589	817	811	487	108	1 406
% de l'ensemble	17,0%	21,4%	16,3%	25,0%	30,0%	19,3%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,2	2,7	2,2	3,0	3,2	2,5
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,4	3,7	3,4	3,9	4,2	3,6
Nord-du-Québec						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	183	217	287	96	17	400
% de l'ensemble	56,7%	75,4%	61,5%	77,4%	85,0%	65,5%
cinq ordonnances actives	44	72	82	26	8	116
% de l'ensemble	13,6%	25,0%	17,6%	21,0%	40,0%	19,0%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	1,9	2,8	2,2	2,8	3,9	2,4
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,4	3,8	3,6	3,6	4,5	3,6

Tableau 4 (suite)

LES DEUX SEXES						
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Nunavik et Terres-cries-de-la-Baie-James						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	4	8	6	6	0	12
% de l'ensemble	1,4%	2,5%	1,6%	3,1%	—	1,9%
cinq ordonnances actives	1	2	1	2	0	3
% de l'ensemble	—	0,1%	—	1,5%	—	—
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,0	3,8	2,7	4,3	0,0	3,5
Région indéterminée						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	13 378	20 249	19 999	9 942	3 686	33 627
% de l'ensemble	62,9%	73,9%	64,1%	77,2%	80,0%	69,1%
cinq ordonnances actives	5 833	3 670	4 748	3 441	1 314	9 503
% de l'ensemble	27,4%	13,4%	15,2%	26,7%	28,5%	19,5%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,2	2,7	2,1	3,1	3,2	2,5
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,5	3,6	3,3	4,0	4,0	3,6

Tableau 5

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives, l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998

LES DEUX SEXES												
Nombre d'ordonnances actives	Hommes		Femmes		65 à 74 ans		75 à 84 ans		85 ans ou plus		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	52 211	24,0	76 842	21,4	82 320	25,1	38 280	19,4	8 453	16,8	129 053	22,4
2	46 708	21,5	76 921	21,4	74 403	22,6	39 904	20,2	9 322	18,5	123 629	21,4
3	37 783	17,4	64 853	18,0	58 841	17,9	35 049	17,7	8 746	17,3	102 636	17,8
4	27 972	12,9	48 396	13,5	41 380	12,6	27 513	13,9	7 475	14,8	76 368	13,2
5	19 301	8,9	33 951	9,4	27 212	8,3	20 242	10,2	5 798	11,5	53 252	9,2
6	12 670	5,8	22 287	6,2	17 226	5,2	13 699	6,9	4 032	8,0	34 957	6,1
7 à 9	16 235	7,5	29 024	8,1	21 388	6,5	18 340	9,3	5 531	11,0	45 259	7,8
10 ou plus	4 327	2,0	7 217	2,0	5 809	1,8	4 629	2,3	1 106	2,2	11 544	2,0
Sous-total (1 à 4)	164 674	75,8	267 012	74,3	256 644	78,1	140 746	71,2	33 996	67,4	431 686	74,8
Sous-total (5 ou plus)	52 533	24,2	92 479	25,7	71 635	21,8	56 910	28,8	16 467	32,6	145 012	25,2
Total	217 207	100,0 (37,7)	359 491	100,0 (62,3)	328 579	100,0 (57,0)	197 656	100,0 (34,3)	50 463	100,0 (8,7)	576 698	100,0 (100,0)

Tableau 6

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998

Nombre d'ordonnances actives	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Bas-St-Laurent	Saguenay-Lac-St-Jean	Québec
1	20,1 %	19,7 %	19,6 %	21,5 %
2	20,4 %	20,1 %	20,6 %	21,3 %
3	17,3 %	17,9 %	18,6 %	18,0 %
4	13,5 %	14,1 %	14,2 %	13,5 %
5 ou plus	28,7 %	28,2 %	27,0 %	25,7 %
Taux d'ord. pour 1 000 personnes participantes	3 581	3 557	3 507	3 400

	Chaudière-Appalaches	Mauricie-Bois-Francs	Estrie	Montréal-Centre
1	21,3 %	23,0 %	22,7 %	23,6 %
2	20,2 %	21,9 %	21,3 %	22,1 %
3	18,1 %	17,8 %	17,7 %	17,9 %
4	13,4 %	13,4 %	13,1 %	13,0 %
5 ou plus	27,0 %	23,9 %	25,2 %	23,4 %
Taux d'ord. pour 1 000 personnes participantes	3 477	3 285	3 357	3 265

	Laval	Laurentides	Lanaudière	Montérégie
1	23,8 %	22,5 %	21,6 %	22,8 %
2	22,5 %	21,7 %	21,1 %	21,7 %
3	17,8 %	17,6 %	17,5 %	17,7 %
4	12,9 %	13,4 %	13,3 %	13,0 %
5 ou plus	23,0 %	24,8 %	26,5 %	24,8 %
Taux d'ord. pour 1 000 personnes participantes	3 250	3 353	3 470	3 350

Tableau 6 (suite)

Nombre d'ordonnances actives	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec
1	22,1 %	21,3 %	20,1 %	19,8 %
2	20,6 %	21,0 %	19,4 %	21,0 %
3	17,4 %	17,9 %	18,5 %	17,2 %
4	13,3 %	13,1 %	14,3 %	13,0 %
5 ou plus	26,6 %	26,7 %	27,7 %	29,0 %
Taux d'ord. pour 1 000 personnes participantes	3 450	3 472	3 559	3 630

	Nunavik et Terres-cries-de-la-Baie-James	Indéterminée
1	8,4 %	21,1 %
2	33,3 %	20,5 %
3	8,3 %	16,9 %
4	25,0 %	13,2 %
5 ou plus	25,0 %	28,3 %
Taux d'ord. pour 1 000 personnes participantes	3 500	3 567

Tableau 7

Personnes âgées assurées ayant au moins une ordonnance active de certains types de médicaments selon l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998

	LES DEUX SEXES					Total
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	
1. Anti-infectieux	2,6%	3,0%	2,5%	3,2%	3,5%	2,8%
2. Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	6,5%	4,4%	4,8%	6,0%	5,2%	5,2%
sympathomimétiques	4,4%	2,7%	3,1%	4,0%	3,4%	3,4%
autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	3,8%	2,3%	2,7%	3,5%	3,0%	3,0%
3. Cardiovasculaires	42,6%	45,8%	41,0%	49,5%	51,0%	44,5%
cardiotropes	25,6%	27,8%	23,4%	31,8%	34,2%	26,9%
hypolipémiants	12,7%	12,2%	15,1%	9,7%	2,1%	12,4%
antihypertenseurs	21,5%	21,5%	19,3%	24,8%	25,4%	21,5%
vasodilatateurs	7,4%	6,7%	4,6%	9,8%	14,4%	7,0%
4. Médicaments du système nerveux central (SNC)	33,5%	39,9%	31,8%	44,2%	51,5%	37,2%
analgésiques et antipyrétiques	22,2%	21,2%	17,6%	26,8%	32,5%	21,6%
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	20,4%	17,8%	15,7%	23,1%	26,0%	18,9%
• autres analgésiques et antipyrétiques	3,0%	5,0%	2,8%	5,6%	9,6%	4,2%
anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	1,4%	1,2%	1,2%	1,5%	1,5%	1,3%
psychotropes	4,0%	7,7%	5,5%	6,9%	8,5%	6,2%
• antidépresseurs	3,3%	6,5%	4,7%	5,8%	6,1%	5,2%
• tranquillisants	1,0%	1,6%	1,1%	1,4%	2,8%	1,4%
anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	14,9%	23,7%	16,9%	24,1%	28,2%	20,0%
• benzodiazépines	14,5%	23,3%	16,6%	23,6%	27,7%	19,7%
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	0,6%	0,9%	0,7%	0,8%	1,0%	0,8%
autres psychotropes	0,3%	0,4%	0,4%	0,3%	0,1%	0,3%
5. Électrolytes-diurétiques	14,7%	23,1%	15,1%	24,6%	34,3%	19,6%
diurétiques	14,3%	22,5%	14,8%	24,0%	33,4%	19,2%
autres électrolytes-diurétiques	2,8%	3,7%	2,0%	4,5%	8,8%	3,3%
6. Oto-rhino-laryngologie	4,0%	4,6%	3,3%	5,7%	7,1%	4,3%

Tableau 7 (suite)

	LES DEUX SEXES					Total
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	
7. Gastro-intestinaux	9,0%	10,6%	8,3%	12,0%	14,3%	9,9%
divers gastro-intestinaux	8,7%	10,2%	8,0%	11,6%	13,9%	9,6%
• anti-ulcéreux	8,0%	9,2%	7,3%	10,4%	12,5%	8,7%
• agents de motilité ou prokinétiques	1,4%	2,1%	1,4%	2,2%	2,9%	1,8%
autres gastro-intestinaux	0,4%	0,5%	0,4%	0,5%	0,5%	0,4%
8. Hormones et substituts	17,0%	31,6%	25,8%	25,9%	22,6%	25,6%
corticostéroïdes	4,5%	3,5%	3,4%	4,7%	4,2%	3,9%
hypoglycémisants	9,4%	8,2%	8,6%	9,4%	6,6%	8,7%
thyroïdiens	4,4%	15,1%	9,7%	12,0%	13,1%	10,7%
autres sous-classes regroupées	0,1%	10,2%	8,2%	3,1%	1,1%	6,0%
9. Peau et muqueuses	2,1%	2,1%	1,8%	2,4%	2,9%	2,1%
anti-inflammatoires	1,6%	1,5%	1,3%	1,8%	2,0%	1,5%
autres médicaments pour la peau et les muqueuses	0,7%	0,7%	0,6%	0,8%	1,1%	0,7%
10. Spasmolytiques	2,4%	1,7%	1,5%	2,5%	3,0%	2,0%
respiratoires	1,8%	0,8%	1,1%	1,5%	1,3%	1,3%
11. Médicaments non classés	6,9%	5,7%	5,2%	7,7%	7,2%	6,2%
12. Sous-total de 1 à 11	63,8%	73,8%	65,4%	75,8%	79,0%	69,7%
13. Médicaments non compris en 12	7,8%	8,6%	6,8%	10,2%	11,6%	8,3%
14. Ensemble des médicaments	64,3%	74,4%	65,9%	76,4%	79,6%	70,2%

Tableau 8

Répartition des ordonnances actives chez les personnes âgées assurées selon le type de médicaments, l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998

	LES DEUX SEXES					Total
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	
1. Anti-infectieux	1,3%	1,3%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%
2. Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	4,1%	2,1%	2,9%	2,9%	2,2%	2,8%
sympathomimétiques	2,2%	1,1%	1,6%	1,5%	1,2%	1,5%
autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	1,9%	1,0%	1,4%	1,3%	1,0%	1,3%
3. Cardiovasculaires	35,9%	30,1%	33,3%	31,6%	29,1%	32,3%
cardiotropes	14,4%	12,9%	13,1%	13,9%	13,7%	13,4%
hypolipémiants	6,1%	4,9%	7,4%	3,6%	0,7%	5,3%
antihypertenseurs	11,6%	9,5%	10,4%	10,3%	9,5%	10,3%
vasodilatateurs	3,9%	2,9%	2,4%	4,0%	5,3%	3,3%
4. Médicaments du système nerveux central (SNC)	22,4%	24,0%	22,4%	24,2%	26,2%	23,4%
analgésiques et antipyrétiques	11,5%	9,4%	9,3%	10,9%	12,2%	10,2%
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	10,5%	7,3%	7,8%	8,8%	8,9%	8,3%
• autres analgésiques et antipyrétiques	1,5%	2,1%	1,4%	2,1%	3,3%	1,9%
anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	0,8%	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,7%
psychotropes	2,2%	3,4%	3,0%	2,8%	3,1%	3,0%
• antidépresseurs	1,6%	2,7%	2,4%	2,2%	2,1%	2,3%
• tranquillisants	0,5%	0,7%	0,6%	0,6%	1,0%	0,6%
anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	7,8%	10,4%	9,1%	9,7%	10,2%	9,5%
• benzodiazépines	7,5%	10,1%	8,8%	9,4%	9,9%	9,1%
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	0,3%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%
autres psychotropes	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%
5. Électrolytes-diurétiques	8,4%	10,6%	8,3%	10,7%	14,6%	9,8%
diurétiques	7,0%	9,2%	7,3%	9,1%	11,6%	8,4%
autres électrolytes-diurétiques	1,3%	1,5%	0,1%	1,7%	2,9%	1,4%
6. Oto-rhino-laryngologie	2,4%	2,3%	2,0%	2,7%	3,1%	2,3%

Tableau 8 (suite)

	LES DEUX SEXES					Total
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	
7. Gastro-intestinaux	4,7%	4,7%	4,5%	4,9%	5,4%	4,7%
divers gastro-intestinaux	4,5%	4,5%	4,2%	4,7%	5,2%	4,5%
• anti-ulcéreux	3,8%	3,7%	3,6%	3,9%	4,2%	3,7%
• agents de motilité ou prokinétiques	0,6%	0,8%	0,7%	0,8%	1,0%	0,8%
autres gastro-intestinaux	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
8. Hormones et substituts	10,6%	16,9%	17,2%	12,3%	9,1%	14,6%
corticostéroïdes	2,3%	1,5%	1,8%	1,8%	1,5%	1,8%
hypoglycémiantes	6,2%	4,5%	5,8%	4,7%	2,9%	5,1%
thyroïdiens	2,1%	6,1%	4,8%	4,5%	4,4%	4,6%
autres sous-classes regroupées	0,1%	4,9%	4,8%	1,3%	0,4%	3,1%
9. Peau et muqueuses	1,2%	0,9%	1,0%	1,0%	1,1%	1,0%
anti-inflammatoires	0,8%	0,6%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%
autres médicaments pour la peau et les muqueuses	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%
10. Spasmodiques	1,1%	0,7%	0,7%	0,9%	1,0%	0,8%
respiratoires	0,9%	0,3%	0,5%	0,6%	0,4%	0,5%
11. Médicaments non classés	3,7%	2,4%	2,7%	3,1%	2,6%	2,8%
12. Sous-total de 1 à 11	95,7%	96,0%	96,2%	95,6%	95,5%	95,9%
13. Médicaments non compris en 12	4,3%	4,0%	3,8%	4,4%	4,5%	4,1%
Nombre d'ordonnances actives	717 188	1 226 559	1 043 084	709 609	191 054	1 943 747

Tableau 9

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 personnes âgées assurées selon le type de médicaments, l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998

	LES DEUX SEXES					Total
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	
1. Anti-infectieux	27	32	27	34	36	30
2. Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	86	53	61	79	66	67
sympathomimétiques	46	28	33	42	35	36
autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	40	25	28	37	31	31
3. Cardiovasculaires	763	765	696	867	876	764
cardiotropes	305	327	273	380	412	318
hypolipémiants	130	124	154	98	21	126
antihypertenseurs	246	241	218	281	285	243
vasodilatateurs	82	74	51	108	159	77
4. Médicaments du système nerveux central (SNC)	476	610	468	664	790	554
analgésiques et antipyrétiques	244	239	194	300	369	241
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	212	186	164	241	269	196
• autres analgésiques et antipyrétiques	32	53	30	59	99	44
anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	17	15	15	17	17	16
psychotropes	46	87	63	76	93	70
• antidépresseurs	35	69	51	61	64	55
• tranquillisants	11	18	13	16	30	15
anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	166	265	191	267	309	224
• benzodiazépines	159	256	184	258	298	216
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	7	9	7	9	10	8
autres psychotropes	3	4	5	3	2	4
5. Électrolytes-diurétiques	177	270	173	295	439	232
diurétiques	149	233	153	249	351	198
autres électrolytes-diurétiques	28	37	20	45	88	33
6. Oto-rhino-laryngologie	50	59	41	74	93	55

Tableau 9 (suite)

	LES DEUX SEXES					Total
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	
7. Gastro-intestinaux	100	120	93	135	162	112
divers gastro-intestinaux	95	114	89	129	156	106
• anti-ulcéreux	82	94	75	106	27	89
• agents de motilité ou prokinétiques	14	21	14	22	29	18
autres gastro-intestinaux	4	5	4	5	5	4
8. Hormones et substituts	226	429	359	337	275	346
corticostéroïdes	48	37	37	50	44	41
hypoglycémiants	131	115	122	129	86	121
thyroïdiens	45	154	99	122	133	109
autres sous-classes regroupées	1	124	101	35	12	73
9. Peau et muqueuses	25	24	21	27	33	24
anti-inflammatoires	17	16	15	19	21	16
autres médicaments pour la peau et les muqueuses	7	7	6	8	12	7
10. Spasmolytiques	24	17	16	26	30	20
respiratoires	19	8	11	15	13	13
11. Médicaments non classés	78	60	57	84	77	67
12. Médicaments non inclus ci-haut	91	100	79	120	136	97
13. Ensemble des médicaments	2 123	2 538	2 091	2 741	3 012	2 367

Tableau 10

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 personnes âgées assurées selon la région sociosanitaire et le type de médicaments, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998

Classe de médicaments	RÉGIONS SOCIOSANITAIRES																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	99
1. Anti-infectieux	30	33	33	26	28	31	31	30	30	23	33	33	28	27	29	28	3	32
2. Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	95	86	67	67	61	55	75	94	77	98	97	73	56	78	70	63	3	84
sympathomimétiques	52	46	37	33	36	29	43	49	47	49	55	41	31	41	41	32	3	44
autres médicaments système nerveux autonome (SNA)	43	41	31	34	26	26	31	45	31	49	42	32	25	37	28	31	–	40
3. Cardiovasculaires	862	873	838	770	778	696	750	796	904	802	820	838	731	812	743	762	10	768
cardiotropes	333	362	347	315	309	296	306	312	376	295	329	335	309	334	301	331	2	318
hypolipémiants	169	156	164	121	135	111	103	119	174	167	121	159	119	146	120	112	2	117
antihypertenseurs	265	274	239	248	254	224	258	266	256	268	276	261	229	258	244	248	6	245
vasodilatateurs	94	81	89	87	80	66	83	99	98	72	94	83	74	74	78	71	–	88
4. Médicaments du système nerveux central (SNC)	682	654	610	601	591	490	546	580	555	448	625	621	493	566	524	545	11	588
analgésiques et antipyrétiques	282	276	236	246	283	219	235	285	255	231	270	240	229	258	239	244	6	247
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	224	228	182	206	241	174	201	242	221	200	214	192	189	220	204	205	2	197
• autres analgésiques et antipyrétiques	59	49	54	40	42	45	34	43	35	31	56	49	40	38	36	40	5	50
anticonvulsivants (sauf benzodiazépines)	17	16	19	15	16	16	16	11	12	10	16	19	15	15	13	14	–	18
psychotropes	73	83	77	70	69	70	83	61	51	47	62	68	57	65	64	66	–	80
• antidépresseurs	57	72	58	53	55	54	70	51	44	44	53	54	45	48	52	52	–	60
• tranquillisants anxiolytiques, sédatifs, hypnotiques	16	11	18	17	14	15	13	10	7	3	9	15	12	16	12	14	–	20
autres psychotropes	305	274	273	268	220	181	209	219	234	157	272	287	188	224	205	216	5	239
• benzodiazépines	295	264	261	258	212	175	201	213	228	154	264	277	184	218	199	209	5	230
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	10	10	12	9	8	7	8	5	6	3	8	10	5	6	6	7	–	9
5. Électrolytes-diurétiques	228	213	217	223	207	236	248	205	173	170	243	244	243	250	240	233	3	246
diurétiques	210	194	206	195	176	195	201	173	154	144	208	233	199	210	197	294	2	207
autres électrolytes-diurétiques	18	19	11	28	31	41	47	30	19	26	35	12	44	40	42	38	2	39

Tableau 10 (suite)

Classe de médicaments	RÉGIONS SOCIO SANITAIRES																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	99
6. Oto-rhino-laryngologie	39	56	63	57	51	57	57	41	44	51	60	58	50	56	57	55	6	50
7. Gastro-intestinaux	138	135	118	103	138	100	133	128	137	123	163	116	98	107	103	107	5	117
divers gastro-intestinaux	135	129	112	98	135	95	128	124	133	115	156	111	93	102	99	103	5	112
• antiulcéreux	109	103	93	81	108	82	104	102	109	87	120	87	78	84	83	86	5	93
• agents de motilité ou procinétiques	25	26	19	18	27	13	24	23	24	28	36	24	15	18	16	17	–	19
autres gastro-intestinaux	31	5	5	4	3	5	4	3	3	5	6	4	4	4	4	4	–	5
8. Hormones et substituts	369	450	370	337	334	318	337	388	370	435	367	401	328	365	351	334	11	352
corticostéroïdes	51	53	44	44	36	34	36	47	50	62	55	48	36	47	42	43	3	49
hypoglycémiant	97	100	114	121	119	124	135	117	120	137	143	106	123	133	127	123	8	131
thyroïdiens	124	120	127	107	111	98	107	140	109	121	86	148	104	108	108	105	–	106
autres sous-classes regroupées	98	176	85	65	67	61	58	84	92	115	83	99	64	76	74	63	–	66
9. Peau et muqueuses	24	21	26	21	20	29	24	19	24	29	29	23	24	19	20	21	2	23
anti-inflammatoires	17	15	18	15	13	19	17	14	18	23	21	15	17	13	14	14	–	15
autres médicaments peau et muqueuses	6	6	8	5	6	9	7	5	6	7	7	8	7	6	6	7	2	8
10. Spasmodiques	25	22	21	23	18	17	21	23	14	38	25	23	16	19	23	18	5	24
respiratoires	17	12	13	15	13	10	14	17	9	31	17	15	10	14	15	11	3	16
11. Médicaments non classifiés	60	54	69	54	73	71	61	61	45	51	61	73	66	64	66	72	2	70
12. Médicaments non inclus ci-haut	106	91	94	101	102	93	94	98	101	108	118	108	88	91	87	97	6	109

Légende des régions sociosanitaires

- | | |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Bas-St-Laurent | 10. Nord-du-Québec |
| 2. Saguenay–Lac-St-Jean | 11. Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine |
| 3. Québec | 12. Chaudière-Appalaches |
| 4. Mauricie–Bois-Francs | 13. Laval |
| 5. Estrie | 14. Lanaudière |
| 6. Montréal-Centre | 15. Laurentides |
| 7. Outaouais | 16. Montérégie |
| 8. Abitibi | 20. Nunavik et Terres-cries-de-la-Baie-James |
| 9. Côte-Nord | 99. Indéterminée |

Tableau 11

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de prescripteurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998

Nombre d'ordonnances actives	NOMBRE DE PRESCRIPTEURS									
	1		2		3		4 ou plus		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	129 053	100,0	–	–	–	–	–	–	129 053	100,0
2	97 749	79,1	25 658	20,8	–	–	–	–	123 629	100,0
3	70 572	68,8	27 997	27,3	3 887	3,8	–	–	102 636	100,0
4	46 504	60,9	23 458	30,7	5 695	7,5	578	0,8	76 368	100,0
5	28 745	54,0	17 895	33,6	5 428	10,2	1 121	2,1	53 252	100,0
6	17 122	49,0	12 053	34,5	4 492	12,9	1 241	3,6	34 957	100,0
7 à 9	18 417	40,7	16 081	35,5	7 581	16,8	3 138	6,9	45 259	100,0
10 ou plus	3 414	29,6	3 799	32,9	2 503	21,7	1 817	15,7	11 544	100,0
Sous-total 1 à 4	343 502	79,6	77 113	17,9	9 582	2,2	578	0,1	431 686	100,0
Sous-total 5 ou plus	67 698	46,7	49 828	34,4	20 004	13,8	7 317	5,1	145 012	100,0
Total	411 200	71,3	126 941	22,0	29 586	5,1	7 895	1,4	576 698	100,0

Tableau 12

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de pharmaciens propriétaires dispensateurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 7 juin 1998

Nombre d'ordonnances actives	NOMBRE DE PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES									
	1		2		3		4 ou plus		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	129 053	100,0	–	–	–	–	–	–	129 053	100,0
2	119 668	96,8	3 961	3,2	–	–	–	–	123 629	100,0
3	98 006	95,5	4 510	4,4	120	0,1	–	–	102 636	100,0
4	72 307	94,7	3 915	5,1	140	0,2	6	–	76 368	100,0
5	50 120	94,1	2 978	5,6	150	0,3	4	–	53 252	100,0
6	32 723	93,6	2 133	6,1	95	0,3	6	–	34 957	100,0
7 à 9	42 008	92,8	3 084	6,8	153	0,3	14	–	45 259	100,0
10 ou plus	10 530	91,2	949	8,2	58	0,5	7	0,1	11 544	100,0
Sous-total 1 à 4	419 034	97,1	12 386	2,8	260	0,1	6	–	431 686	100,0
Sous-total 5 ou plus	135 381	93,4	9 144	6,3	456	0,3	31	–	145 012	100,0
Total	554 415	96,1	21 530	3,7	716	0,1	37	–	576 698	100,0

Tableaux relatifs à la consommation médicamenteuse des personnes âgées non hébergées inscrites au régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996

Tableau 1

Répartition des personnes âgées assurées selon le sexe, l'âge et la région socio-sanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996

Tableau 2

Répartition des personnes âgées assurées selon le nombre d'ordonnances actives, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996

Tableau 3

Répartition des ordonnances actives chez les personnes âgées, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996

Tableau 4

Principales caractéristiques de la consommation médicamenteuse des personnes âgées assurées selon le sexe, l'âge et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996

Tableau 5

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives, l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996

Tableau 6

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996

Tableau 7

Personnes âgées assurées ayant au moins une ordonnance active de certains types de médicaments selon l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996

Tableau 8

Répartition des ordonnances actives chez les personnes âgées assurées selon le type de médicaments, l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996

Tableau 9

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 personnes âgées assurées selon le type de médicaments, l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996

Tableau 10

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 personnes âgées assurées selon la région sociosanitaire et le type de médicaments, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996

Tableau 11

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de prescripteurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996

Tableau 12

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de pharmaciens propriétaires dispensateurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996

Tableau 1

Répartition des personnes âgées assurées selon le sexe, l'âge et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996

	LES DEUX SEXES					Total
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	
Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine	5 849	7 085	7 833	4 053	1 048	12 934 1,6%
Bas-St-Laurent	11 579	15 364	16 433	8 571	1 939	26 943 3,3%
Saguenay-Lac-St-Jean	12 128	16 130	19 034	7 783	1 441	28 258 3,5%
Québec	29 024	46 770	46 533	23 474	5 787	75 794 9,3%
Chaudière-Appalaches	17 889	23 807	25 742	13 086	2 868	41 696 5,1%
Mauricie-Bois-Francs	25 059	36 023	37 732	18 841	4 509	61 082 7,5%
Estrie	14 223	20 378	20 672	11 129	2 800	34 601 4,2%
Montréal-Centre	95 552	150 872	147 496	78 170	20 758	246 424 30,2%
Laval	15 280	20 786	24 151	9 663	2 234	36 048 4,4%
Laurentides	18 100	22 662	26 854	11 365	2 543	40 762 5,0%
Lanaudière	14 907	18 195	22 240	8 884	1 978	33 102 4,1%
Montérégie	51 881	71 848	78 050	37 136	8 543	123 729 15,2%
Outaouais	11 128	14 740	17 166	7 202	1 500	25 868 3,2%
Abitibi-Témiscamingue	6 325	7 578	9 331	3 856	716	13 903 1,7%
Côte-Nord	3 407	3 778	4 997	1 811	377	7 185 0,9%
Nord-du-Québec	295	273	438	111	19	568 0,1%
Nunavik et Terres-cries-de-la-Baie-James	37	353	437	218	45	700 0,1%
Région indéterminée	2 675	3 659	4 004	1 877	453	6 334 0,8%
Ensemble du Québec	335 648 41,1%	480 283 58,9%	509 143 62,4%	247 230 30,3%	59 558 7,3%	815 931 100,0%

Tableau 2

Répartition des personnes âgées assurées selon le nombre d'ordonnances actives, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996

	HOMMES				FEMMES				LES DEUX SEXES			
	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou plus	Total	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou plus	Total	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou plus	Total
Aucune ordonnance active	86 828 38,4%	25 616 27,8%	4 733 27,5%	117 177 34,9%	82 894 29,3%	34 477 22,2%	9 196 21,7%	126 567 26,4%	169 722 33,3%	60 093 24,3%	13 929 23,4%	243 744 29,9%
Au moins une ordonnance active	139 563 61,7%	66 441 72,2%	12 467 72,5%	218 471 65,1%	199 858 70,7%	120 696 77,8%	33 162 78,3%	353 716 73,7%	339 421 66,7%	187 137 75,7%	45 629 76,6%	572 187 70,1%
Au moins cinq ordonnances actives	28 650 12,7%	17 617 19,1%	3 478 20,2%	49 745 14,8%	41 175 14,6%	33 091 21,3%	10 348 24,4%	84 614 17,6%	69 825 13,7%	50 708 20,5%	13 826 23,2%	134 359 16,4%
Total	226 391 67,5%	92 057 27,4%	17 200 5,1%	335 648 100,0%	282 752 58,9%	155 173 32,3%	42 358 8,8%	480 283 100,0%	509 143 62,4%	247 230 30,3%	59 558 7,3%	815 931 100,0%

Tableau 3

**Répartition des ordonnances actives chez les personnes âgées,
régime d'assurance médicaments administré
par la RAMQ, le 9 juin 1996**

HOMMES				
	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Total	428 182	228 587	43 541	700 310 37,6%
Moyenne par personne assurée	1,9	2,5	2,5	2,1
Moyenne par personne participante	3,1	3,4	3,5	3,2
FEMMES				
	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Total	617 870	422 764	122 406	1 163 040 62,4%
Moyenne par personne assurée	2,2	2,7	2,9	2,4
Moyenne par personne participante	3,1	3,5	3,7	3,3
TOTAL				
	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Total	1 046 052 56,1%	651 351 35,0%	165 947 8,9%	1 863 350 100,0%
Moyenne par personne assurée	2,1	2,6	2,8	2,3
Moyenne par personne participante	3,1	3,5	3,6	3,3

Tableau 4

**Principales caractéristiques de la consommation médicamenteuse
des personnes âgées assurées selon le sexe, l'âge et la région sociosanitaire,
régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996**

	LES DEUX SEXES					
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	3 863	5 387	5 347	3 112	791	9 250
% de l'ensemble	66,1 %	76,0 %	68,3 %	76,8 %	75,5 %	71,5 %
cinq ordonnances actives	917	1 376	1 165	889	239	2 293
% de l'ensemble	15,7 %	19,4 %	14,8 %	21,9 %	22,8 %	17,7 %
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,2	2,6	2,2	2,7	2,7	2,4
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,3	3,4	3,2	3,6	3,6	3,3
Bas-St-Laurent						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	7 733	12 004	11 489	6 697	1 551	19 737
% de l'ensemble	66,8 %	78,1 %	69,9 %	78,1 %	80,0 %	73,3 %
cinq ordonnances actives	1 856	3 159	2 563	1 979	473	5 015
% de l'ensemble	16,0 %	20,6 %	15,6 %	23,1 %	24,4 %	18,6 %
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,2	2,7	2,2	2,8	2,9	2,5
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,3	3,4	3,2	3,6	3,7	3,4
Saguenay-Lac-St-Jean						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	8 419	13 248	14 145	6 360	1 162	21 667
% de l'ensemble	69,4 %	82,1 %	74,3 %	81,7 %	80,6 %	76,7 %
cinq ordonnances actives	1 887	3 601	3 294	1 814	380	5 488
% de l'ensemble	15,6 %	22,3 %	17,3 %	23,3 %	26,4 %	19,4 %
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,2	2,9	2,4	2,9	3,1	2,6
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,2	3,5	3,3	3,6	3,8	3,4
Québec						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	19 966	36 142	32 745	18 621	4 742	56 108
% de l'ensemble	68,8 %	77,3 %	70,4 %	79,3 %	81,9 %	74,0 %
cinq ordonnances actives	4 647	8 796	6 835	5 206	1 402	13 443
% de l'ensemble	16,1 %	18,8 %	14,7 %	22,2 %	24,2 %	17,7 %
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,2	2,6	2,2	2,8	2,9	2,4
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,2	3,3	3,1	3,5	3,6	3,3

Tableau 4 (suite)

	LES DEUX SEXES					
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Chaudière-Appalaches						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	12 243	18 498	18 078	10 364	2 299	30 741
% de l'ensemble	68,4%	77,7%	70,2%	79,2%	80,2%	73,7%
cinq ordonnances actives	2 881	4 636	3 847	2 961	709	7 517
% de l'ensemble	16,1 %	19,5 %	14,9 %	22,6 %	24,7 %	18,0 %
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,2	2,6	2,2	2,8	3,0	2,5
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,3	3,4	3,1	3,6	3,7	3,3
Mauricie-Bois-Francs						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	16 640	27 100	25 465	14 676	3 599	43 740
% de l'ensemble	66,4%	75,2%	67,5%	77,9%	79,8%	71,6%
cinq ordonnances actives	3 559	6 067	4 926	3 631	1 069	9 626
% de l'ensemble	14,2%	16,8%	13,1 %	19,3%	23,7%	15,8%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,1	2,4	2,0	2,6	2,9	2,3
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,1	3,2	3,0	3,3	3,6	3,2
Estrie						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	9 497	15 177	13 918	8 530	2 226	24 674
% de l'ensemble	66,8%	74,5%	67,3%	76,7%	79,5%	71,3%
cinq ordonnances actives	2 158	3 568	2 764	2 307	655	5 726
% de l'ensemble	15,2%	17,5%	13,4%	20,7%	23,4%	16,6%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,1	2,4	2,0	2,7	2,8	2,3
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,2	3,3	3,0	3,5	3,6	3,2
Montréal-Centre						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	59 906	106 009	94 181	56 655	15 079	165 915
% de l'ensemble	62,7%	70,3%	63,9%	72,5%	72,6%	67,3%
cinq ordonnances actives	13 516	24 303	18 789	14 615	4 415	37 819
% de l'ensemble	14,2%	16,1 %	12,7 %	18,7 %	21,3 %	15,4 %
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,0	2,3	1,9	2,5	2,6	2,2
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,2	3,2	3,0	3,4	3,6	3,2

Tableau 4 (suite)

	LES DEUX SEXES					
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Laval						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	9 907	15 071	15 939	7 325	1 714	24 978
% de l'ensemble	64,8%	72,6%	66,0%	75,8%	76,7%	69,3%
cinq ordonnances actives	2 158	3 286	3 008	1 935	501	5 444
% de l'ensemble	14,1%	15,8%	12,5%	20,0%	22,4%	15,1%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,0	2,3	2,0	2,6	2,8	2,2
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,1	3,2	3,0	3,5	3,6	3,2
Laurentides						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	11 625	16 658	17 680	8 656	1 947	28 283
% de l'ensemble	64,2%	73,5%	65,8%	76,2%	76,6%	69,4%
cinq ordonnances actives	2 611	4 185	3 678	2 513	605	6 796
% de l'ensemble	14,4%	18,5%	13,7%	22,1%	23,8%	16,7%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,0	2,5	2,0	2,7	2,8	2,3
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,2	3,3	3,1	3,6	3,7	3,3
Lanaudière						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	9 687	13 760	15 009	6 831	1 607	23 447
% de l'ensemble	65,0%	75,6%	67,5%	76,9%	81,2%	70,8%
cinq ordonnances actives	2 390	3 548	3 330	2 023	585	5 938
% de l'ensemble	16,0%	19,5%	15,0%	22,8%	29,6%	17,9%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,2	2,6	2,2	2,8	3,2	2,4
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,3	3,4	3,2	3,7	4,0	3,4
Montérégie						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	33 886	52 814	51 736	28 279	6 685	86 700
% de l'ensemble	65,3%	73,5%	66,3%	76,2%	78,3%	70,1%
cinq ordonnances actives	7 715	12 626	10 440	7 777	2 124	20 341
% de l'ensemble	14,9%	17,6%	13,4%	20,9%	24,9%	16,4%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,1	2,4	2,0	2,7	2,9	2,3
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,2	3,3	3,1	3,5	3,7	3,3

Tableau 4 (suite)

	LES DEUX SEXES					
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Outaouais						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	7 170	10 834	11 476	5 428	1 100	18 004
% de l'ensemble	64,4%	73,5%	66,9%	75,4%	73,3%	69,6%
cinq ordonnances actives	1 631	2 713	2 533	1 470	341	4 344
% de l'ensemble	14,7%	18,4%	14,8%	20,4%	22,7%	16,8%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,1	2,5	2,1	2,6	2,7	2,3
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,2	3,4	3,2	3,5	3,7	3,3
Abitibi-Témiscamingue						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	4 104	5 655	6 328	2 893	538	9 759
% de l'ensemble	64,9%	74,6%	67,8%	75,0%	75,1%	70,2%
cinq ordonnances actives	965	1 414	1 400	812	167	2 379
% de l'ensemble	15,3%	18,7%	15,0%	21,1%	23,3%	17,1%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,1	2,5	2,2	2,7	2,7	2,3
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,3	3,4	3,2	3,5	3,6	3,3
Côte-Nord						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	2 129	2 793	3 301	1 346	275	4 922
% de l'ensemble	62,5%	73,9%	66,1%	74,3%	72,9%	68,5%
cinq ordonnances actives	491	756	748	422	77	1 247
% de l'ensemble	14,4%	20,0%	15,0%	23,3%	20,4%	17,4%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	2,0	2,6	2,2	2,8	2,7	2,4
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,3	3,6	3,3	3,8	3,8	3,4
Nord-du-Québec						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	187	201	292	81	15	388
% de l'ensemble	63,4%	73,6%	66,7%	73,0%	79,0%	68,3%
cinq ordonnances actives	41	58	72	22	5	99
% de l'ensemble	13,9%	21,3%	16,4%	19,8%	26,3%	17,4%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	1,9	2,7	2,2	2,5	2,9	2,3
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,0	3,6	3,3	3,4	3,7	3,3

Tableau 4 (suite)

LES DEUX SEXES						
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	Total
Nunavik et Terres-cries-de-la-Baie-James						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	8	16	13	8	3	24
% de l'ensemble	2,3%	4,5%	3,0%	3,7%	6,7%	3,4%
cinq ordonnances actives	1	1	1	0	1	2
% de l'ensemble	0,3%	0,3%	0,2%	—	2,2%	0,3%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,0	2,3	2,5	2,3	3,3	2,5
Région indéterminée						
Ayant au moins :						
une ordonnance active	1 501	23 149	2 279	1 275	296	3 850
% de l'ensemble	56,1%	64,2%	56,9%	67,9%	65,3%	60,8%
cinq ordonnances actives	321	521	432	332	78	842
% de l'ensemble	12,0%	14,2%	10,8%	17,7%	17,2%	13,3%
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	1,7	2,0	1,7	2,3	2,2	1,9
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	3,1	3,2	3,0	3,4	3,4	3,1

Tableau 5

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives, l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996

LES DEUX SEXES												
Nombre d'ordonnances actives	Hommes		Femmes		65 à 74 ans		75 à 84 ans		85 ans ou plus		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	54 194	24,8	80 570	22,8	88 486	26,1	38 043	20,3	8 235	18,1	134 764	23,6
2	48 543	22,2	77 762	22,0	78 844	23,2	38 680	20,7	8 781	19,2	126 305	22,1
3	38 353	17,6	63 746	18,0	60 457	17,8	33 518	17,9	8 124	17,8	102 099	17,8
4	27 636	12,7	47 024	13,3	41 809	12,3	26 188	14,0	6 663	14,8	74 660	13,1
5	18 988	8,7	32 357	9,2	27 518	8,1	18 737	10,0	5 090	11,2	51 345	9,0
6	12 084	5,5	20 942	5,9	17 087	5,0	12 451	6,7	3 488	7,6	33 026	5,8
7 à 9	15 113	6,9	25 540	7,2	20 268	6,0	15 918	8,5	4 467	9,8	40 653	7,1
10 ou plus	3 560	1,6	5 775	1,6	4 952	1,5	3 602	1,9	781	1,7	9 335	1,6
Sous-total (1 à 4)	168 726	77,2	269 102	76,1	269 596	79,4	136 429	72,9	31 803	69,7	437 828	76,5
Sous-total (5 ou plus)	49 745	22,8	84 614	23,9	69 825	20,6	50 708	27,1	13 826	30,3	134 359	23,5
Total	218 471	100,0	353 716	100,0	339 421	100,0	187 137	100,0	45 629	100,0	572 187	100,0
		(38,2)		(61,8)		(59,3)		(32,7)		(8,0)		(100,0)

Tableau 6

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996

Nombre d'ordonnances actives	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Bas-St-Laurent	Saguenay-Lac-St-Jean	Québec
1	22,1 %	21,1 %	20,4 %	23,1 %
2	21,6 %	21,1 %	21,8 %	21,7 %
3	17,7 %	18,7 %	18,8 %	18,0 %
4	13,8 %	13,7 %	13,7 %	13,3 %
5 ou plus	24,8 %	25,4 %	25,3 %	23,9 %
Taux d'ord. pour 1 000 personnes participantes	3 331	3 390	3 390	3 284

	Chaudière-Appalaches	Mauricie-Bois-Francis	Estrie	Montréal-Centre
1	22,8 %	24,2 %	23,7 %	24,4 %
2	21,6 %	22,8 %	22,1 %	22,2 %
3	17,7 %	18,1 %	17,8 %	17,7 %
4	13,5 %	12,9 %	13,2 %	12,9 %
5 ou plus	24,4 %	22,0 %	23,2 %	22,8 %
Taux d'ord. pour 1 000 personnes participantes	3 318	3 155	3 229	3 216

	Laval	Laurentides	Lanaudière	Montérégie
1	24,8 %	23,5 %	22,1 %	24,0 %
2	22,8 %	22,2 %	21,9 %	21,9 %
3	17,9 %	17,3 %	17,6 %	17,8 %
4	12,7 %	13,0 %	13,1 %	12,8 %
5 ou plus	21,8 %	24,0 %	25,3 %	23,5 %
Taux d'ord. pour 1 000 personnes participantes	3 162	3 268	3 389	3 248

Tableau 6 (suite)

Nombre d'ordonnances actives	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec
1	23,0%	22,7%	21,4%	26,6%
2	22,1%	21,6%	21,0%	18,8%
3	17,4%	18,3%	18,5%	17,0%
4	13,4%	13,0%	13,8%	12,1%
5 ou plus	24,1%	24,4%	25,3%	25,5%
Taux d'ord. pour 1 000 personnes participantes	3 311	3 326	3 432	3 302

	Nunavik et Terres-cries-de-la-Baie-James	Indéterminée
1	29,2%	25,1%
2	29,2%	23,7%
3	20,8%	17,2%
4	12,5%	12,2%
5 ou plus	8,3%	21,8%
Taux d'ord. pour 1 000 personnes participantes	2 500	3 124

Tableau 7

Répartition des personnes âgées assurées ayant au moins une ordonnance active de certains types de médicaments selon l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996

	LES DEUX SEXES					Total
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	
1. Anti-infectieux	3,0%	3,0%	2,9%	3,6%	3,6%	3,2%
2. Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	6,8%	4,4%	5,0%	6,1%	5,0%	5,4%
sympathomimétiques	5,4%	3,1%	3,8%	4,7%	3,8%	4,1%
autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	3,2%	2,1%	2,4%	2,9%	2,3%	2,5%
3. Cardiovasculaires	40,2%	44,2%	39,8%	47,2%	47,3%	42,6%
cardiotropes	25,9%	27,8%	24,0%	31,7%	33,1%	27,0%
hypolipémiants	8,8%	9,2%	11,4%	6,0%	1,2%	9,0%
antihypertenseurs	18,2%	19,9%	17,7%	21,8%	21,3%	19,2%
vasodilatateurs	8,0%	7,0%	5,3%	10,3%	13,6%	7,4%
4. Médicaments du système nerveux central (SNC)	36,1%	42,1%	35,0%	46,5%	50,8%	39,6%
analgésiques et antipyrétiques	24,3%	23,5%	20,3%	29,1%	32,6%	23,8%
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	22,3%	19,8%	18,1%	25,1%	26,3%	20,8%
• autres analgésiques et antipyrétiques	3,4%	5,6%	3,4%	6,3%	9,6%	4,7%
anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	1,3%	1,1%	1,1%	1,4%	1,4%	1,2%
psychotropes	3,6%	6,8%	5,0%	6,0%	7,2%	5,5%
• antidépresseurs	2,9%	5,7%	4,3%	5,0%	5,1%	4,6%
• tranquillisants	0,8%	1,4%	1,0%	1,3%	2,4%	1,2%
anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	16,6%	25,3%	19,0%	25,7%	28,3%	21,7%
• benzodiazépines	16,2%	24,8%	18,6%	25,2%	27,7%	21,3%
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	0,7%	0,9%	0,8%	0,9%	1,1%	0,9%
autres psychotropes	0,3%	0,4%	0,4%	0,2%	0,1%	0,3%
5. Électrolytes-diurétiques	13,2%	20,3%	13,3%	22,5%	31,3%	17,4%
diurétiques	12,7%	19,5%	12,8%	21,6%	30,3%	16,7%
autres électrolytes-diurétiques	2,8%	3,8%	2,2%	4,8%	8,7%	3,4%
6. Oto-rhino-laryngologie	4,3%	4,8%	3,6%	6,0%	7,0%	4,6%

Tableau 7 (suite)

	LES DEUX SEXES					Total
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	
7. Gastro-intestinaux	9,7%	10,7%	9,1%	12,0%	13,4%	10,3%
divers gastro-intestinaux	9,4%	10,3%	8,8%	11,6%	13,0%	9,9%
• anti-ulcéreux	8,6%	9,2%	7,9%	10,4%	11,4%	8,9%
• agents de motilité ou prokinétiques	1,5%	2,2%	1,6%	2,3%	2,8%	1,9%
autres gastro-intestinaux	0,4%	0,5%	0,4%	0,6%	0,6%	0,5%
8. Hormones et substituts	15,9%	27,7%	23,4%	22,8%	19,0%	22,9%
corticostéroïdes	4,7%	3,5%	3,7%	4,7%	3,9%	4,0%
hypoglycémiantes	8,8%	7,7%	8,2%	8,7%	6,0%	8,2%
thyroïdiens	3,4%	12,8%	8,4%	9,9%	9,9%	8,9%
autres sous-classes regroupées	0,2%	7,7%	6,2%	2,2%	0,8%	4,6%
9. Peau et muqueuses	3,1%	3,0%	2,7%	3,4%	3,8%	3,0%
anti-inflammatoires	2,3%	2,2%	2,1%	2,5%	2,6%	2,2%
autres médicaments pour la peau et les muqueuses	1,0%	1,0%	0,9%	1,1%	1,5%	1,0%
10. Spasmolytiques	3,0%	1,9%	1,9%	3,1%	3,2%	2,4%
respiratoires	2,5%	1,1%	1,5%	2,1%	1,6%	1,7%
11. Médicaments non classés	6,1%	2,6%	3,6%	5,0%	4,7%	4,1%
12. Sous-total de 1 à 11	64,6%	73,1%	66,1%	75,2%	76,1%	69,6%
13. Médicaments non compris en 12	6,6%	7,5%	6,4%	8,3%	8,4%	7,2%
14. Ensemble des médicaments	65,1%	73,7%	66,7%	75,7%	76,6%	70,1%

Tableau 8

Répartition des ordonnances actives chez les personnes âgées assurées selon le type de médicaments, l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996

	LES DEUX SEXES					Total
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	
1. Anti-infectieux	1,5%	1,4%	1,5%	1,4%	1,4%	1,5%
2. Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	4,4%	2,2%	3,1%	3,0%	2,3%	3,0%
sympathomimétiques	2,8%	1,3%	1,9%	1,9%	1,4%	1,9%
autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	1,6%	0,9%	1,2%	1,2%	0,9%	1,2%
3. Cardiovasculaires	33,7%	30,1%	32,3%	30,8%	28,8%	31,4%
cardiotropes	15,1%	13,7%	13,9%	14,6%	14,4%	14,2%
hypolipémiants	4,3%	3,9%	5,7%	2,3%	0,4%	4,1%
antihypertenseurs	9,9%	9,3%	9,8%	9,3%	8,4%	9,5%
vasodilatateurs	4,4%	3,3%	2,9%	4,5%	5,6%	3,7%
4. Médicaments du système nerveux central (SNC)	24,9%	26,8%	25,3%	26,9%	28,2%	26,1%
analgésiques et antipyrétiques	13,0%	11,1%	11,1%	12,6%	13,5%	11,8%
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	11,3%	8,7%	9,4%	10,1%	10,0%	9,7%
• autres analgésiques et antipyrétiques	1,7%	2,4%	1,7%	2,5%	3,6%	2,2%
anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	0,8%	0,6%	0,7%	0,6%	0,6%	0,6%
psychotropes	1,9%	3,1%	2,8%	2,5%	2,8%	2,7%
• antidépresseurs	1,5%	2,5%	2,2%	2,0%	1,9%	2,1%
• tranquillisants	0,5%	0,7%	0,5%	0,5%	0,9%	0,6%
anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	9,0%	11,9%	10,6%	11,0%	11,2%	10,8%
• benzodiazépines	8,6%	11,5%	10,2%	10,6%	10,8%	10,4%
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%
autres psychotropes	0,2%	0,2%	0,2%	0,1%	—	0,2%
5. Électrolytes-diurétiques	7,8%	10,0%	7,5%	10,4%	14,6%	9,2%
diurétiques	6,4%	8,4%	6,5%	8,6%	11,5%	7,6%
autres électrolytes-diurétiques	1,4%	1,6%	1,1%	1,8%	3,2%	1,5%
6. Oto-rhino-laryngologie	2,7%	2,5%	2,2%	3,0%	3,3%	2,6%

Tableau 8 (suite)

	LES DEUX SEXES					Total
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	
7. Gastro-intestinaux	5,2%	5,0%	5,0%	5,2%	5,4%	5,1%
divers gastro-intestinaux	5,0%	4,8%	4,8%	4,9%	5,2%	4,9%
• anti-ulcéreux	4,2%	3,9%	4,0%	4,1%	4,2%	4,0%
• agents de motilité ou prokinétiques	0,7%	0,9%	0,8%	0,9%	1,0%	0,8%
autres gastro-intestinaux	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
8. Hormones et substituts	9,9%	15,0%	15,2%	11,0%	8,1%	13,1%
corticostéroïdes	2,4%	1,5%	1,9%	1,9%	1,5%	1,9%
hypoglycémiant	5,7%	4,4%	5,5%	4,4%	2,7%	4,9%
thyroïdiens	1,7%	5,4%	4,2%	3,8%	3,6%	4,0%
autres sous-classes regroupées	0,1%	3,8%	3,6%	0,9%	0,3%	2,4%
9. Peau et muqueuses	1,7%	1,4%	1,2%	1,5%	1,6%	1,5%
anti-inflammatoires	1,2%	0,1%	1,1%	1,1%	1,0%	1,1%
autres médicaments pour la peau et les muqueuses	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%	0,5%
10. Spasmolytiques	1,5%	0,8%	1,0%	1,2%	1,2%	1,1%
respiratoires	1,2%	0,5%	0,7%	0,8%	0,6%	0,7%
11. Médicaments non classés	3,3%	1,2%	1,9%	2,1%	1,8%	2,0%
12. Sous-total de 1 à 11	96,4%	96,5%	96,6%	96,4%	96,6%	96,5%
13. Médicaments non compris en 12	3,6%	3,5%	3,4%	3,6%	3,4%	3,5%
Nombre d'ordonnances actives	700 310	1 163 040	1 046 052	651 351	165 947	1 863 350

Tableau 9

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 personnes âgées assurées selon le type de médicaments, l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996

	LES DEUX SEXES					Total
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	
1. Anti-infectieux	31	35	31	38	38	34
2. Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	91	53	64	80	63	69
sympathomimétiques	57	32	39	49	40	42
autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	33	21	25	31	24	26
3. Cardiovasculaires	703	728	663	811	803	718
cardiotropes	314	331	285	385	402	324
hypolipémiants	90	95	117	61	12	93
antihypertenseurs	206	224	200	246	235	217
vasodilatateurs	92	79	60	118	155	84
4. Médicaments du système nerveux central (SNC)	519	650	520	708	785	596
analgésiques et antipyrétiques	272	269	227	332	377	270
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	236	211	192	267	278	221
• autres analgésiques et antipyrétiques	35	58	35	65	99	49
anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	16	13	14	16	16	14
psychotropes	40	76	57	67	78	61
• antidépresseurs	31	60	46	52	53	48
• tranquillisants	9	16	11	14	25	13
anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	188	287	218	290	312	246
• benzodiazépines	180	278	209	280	301	237
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	8	10	8	10	11	9
autres psychotropes	3	4	4	3	1	4
5. Électrolytes-diurétiques	162	242	154	274	408	209
diurétiques	134	203	133	226	320	175
autres électrolytes-diurétiques	29	39	22	48	88	34
6. Oto-rhino-laryngologie	56	61	45	79	93	59

Tableau 9 (suite)

	LES DEUX SEXES					Total
	Hommes	Femmes	65 à 74 ans	75 à 84 ans	85 ans ou +	
7. Gastro-intestinaux	108	122	102	136	150	116
divers gastro-intestinaux	103	117	98	130	145	111
• anti-ulcéreux	88	94	82	107	117	92
• agents de motilité ou prokinétiques	15	22	16	23	28	19
autres gastro-intestinaux	4	5	4	6	6	5
8. Hormones et substituts	207	364	312	290	226	299
corticostéroïdes	51	37	39	50	42	43
hypoglycémiants	119	106	114	115	75	111
thyroïdiens	35	130	85	100	101	91
autres sous-classes regroupées	2	91	74	24	8	54
9. Peau et muqueuses	36	34	32	40	44	35
anti-inflammatoires	26	24	23	28	28	25
autres médicaments pour la peau et les muqueuses	10	11	9	12	16	11
10. Spasmolytiques	31	19	20	31	32	24
respiratoires	25	11	15	21	16	17
11. Médicaments non classés	28	68	39	55	50	44
12. Médicaments non inclus ci-haut	84	76	73	94	94	81
13. Ensemble des médicaments	2 086	2 422	2 055	2 635	2 786	2 285

Tableau 10

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 personnes âgées assurées selon la région sociosanitaire et le type de médicaments, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996

Classe de médicaments	RÉGIONS SOCIOSANITAIRES																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	99
1. Anti-infectieux	33	36	38	29	32	34	35	38	33	33	31	35	33	30	31	33	7	33
2. Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	90	91	70	67	64	59	72	105	88	141	94	72	59	85	73	68	6	52
sympathomimétiques	57	55	45	42	41	35	49	65	61	88	60	47	38	52	48	40	6	32
autres médicaments système nerveux autonome (SNA)	33	36	25	25	23	25	23	40	26	53	33	25	21	32	25	28	–	20
3. Cardiovasculaires	762	832	787	708	733	670	704	721	822	743	708	770	703	769	699	723	23	597
cardiotropes	330	372	358	315	317	305	315	305	377	310	320	334	323	341	307	339	11	274
hypolipémiants	121	123	118	85	101	84	74	83	130	111	71	120	90	102	86	82	–	73
antihypertenseurs	207	237	214	215	226	208	224	225	212	248	224	220	210	240	221	224	9	194
vasodilatateurs	104	99	98	93	89	73	91	108	103	74	92	96	81	86	85	77	3	56
4. Médicaments du système nerveux central (SNC)	711	693	655	637	627	545	592	605	583	460	632	642	551	616	583	590	23	425
analgésiques et antipyrétiques	308	303	257	263	308	258	275	304	271	222	287	256	270	287	272	277	13	214
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	248	254	201	221	262	204	238	264	233	190	224	207	220	246	233	232	10	173
• autres analgésiques et antipyrétiques	60	50	56	42	46	54	37	40	38	32	63	49	49	41	39	45	3	41
anticonvulsivants (sauf benzodiazépines)	14	14	19	13	15	14	15	11	10	12	13	17	13	14	12	14	1	11
psychotropes	58	70	69	63	59	64	70	46	38	46	50	60	49	58	62	58	–	52
• antidépresseurs	44	61	52	47	46	50	61	38	33	40	41	46	39	43	49	46	–	45
• tranquillisants	14	10	16	15	13	14	9	8	5	5	9	14	10	15	13	12	–	7
anxiolytiques, sédatifs, hypnotiques	328	301	306	295	243	206	227	241	262	176	278	302	215	252	234	238	9	146
• benzodiazépines	317	289	292	285	233	198	218	236	256	169	270	291	210	245	227	230	6	141
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	11	12	14	10	10	8	9	5	6	7	9	11	5	7	7	7	3	6
autres psychotropes	4	4	5	3	3	4	4	4	2	4	3	6	4	4	3	3	–	3
5. Électrolytes-diurétiques	208	198	195	201	189	212	229	185	160	137	217	219	219	223	221	214	7	173
diurétiques	192	181	184	173	156	168	178	156	141	120	183	207	176	180	176	174	7	140
autres électrolytes-diurétiques	16	17	11	28	33	43	52	29	20	18	34	12	43	44	45	39	–	33

Tableau 10 (suite)

Classe de médicaments	RÉGIONS SOCIO-SANITAIRES																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	99
6. Oto-rhino-laryngologie	46	54	64	60	56	62	62	43	49	48	54	60	50	64	59	58	–	57
7. Gastro-intestinaux	137	141	118	104	139	109	140	121	137	130	155	121	107	122	107	111	3	94
divers gastro-intestinaux	133	135	112	101	136	103	135	118	133	129	149	116	102	117	102	107	3	90
• antiulcéreux	110	106	92	83	106	89	109	97	108	88	114	91	85	95	86	89	3	79
• agents de motilité ou procinétiques	24	29	20	18	30	15	26	21	24	40	35	25	17	22	16	18	–	10
autres gastro-intestinaux	4	6	5	3	3	6	5	3	4	2	6	5	5	5	5	4	–	5
8. Hormones et substituts	315	387	317	285	284	280	291	344	324	384	304	333	290	316	311	296	9	272
corticostéroïdes	52	54	44	42	38	37	34	55	56	74	55	48	40	50	44	45	1	42
hypoglycémiant	90	93	106	111	111	113	124	109	105	120	127	96	118	128	120	114	1	93
thyroïdiens	100	103	107	87	88	83	88	123	93	95	73	115	85	84	93	91	4	84
autres sous-classes regroupées	73	136	60	44	48	47	44	57	70	95	50	74	47	54	54	46	1	53
9. Peau et muqueuses	33	32	35	29	28	44	34	26	29	30	32	29	38	29	31	30	3	38
anti-inflammatoires	25	25	25	21	20	29	26	21	24	21	26	21	26	21	22	21	1	27
autres médicaments peau et muqueuses	8	8	11	8	8	15	9	6	6	9	6	9	12	8	9	9	1	12
10. Spasmodiques	29	25	26	27	23	21	23	29	21	33	29	27	21	25	30	22	1	18
respiratoires	22	17	18	19	18	14	16	22	14	30	23	19	15	18	22	16	1	11
11. Médicaments non classifiés	39	33	44	34	46	47	45	40	34	44	36	49	42	46	46	48	–	53
12. Médicaments non inclus ci-haut	80	77	81	80	82	81	78	77	73	72	90	89	77	76	76	82	4	86

Légende des régions socio-sanitaires

- | | |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Bas-St-Laurent | 10. Nord-du-Québec |
| 2. Saguenay–Lac-St-Jean | 11. Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine |
| 3. Québec | 12. Chaudière-Appalaches |
| 4. Mauricie–Bois-Francs | 13. Laval |
| 5. Estrie | 14. Lanaudière |
| 6. Montréal-Centre | 15. Laurentides |
| 7. Outaouais | 16. Montérégie |
| 8. Abitibi | 20. Nunavik et Terres-cries-de-la-Baie-James |
| 9. Côte-Nord | 99. Indéterminée |

Tableau 11

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de prescripteurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996

Nombre d'ordonnances actives	NOMBRE DE PRESCRIPTEURS									
	1		2		3		4 ou plus		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	134 764	100,0	–	–	–	–	–	–	134 764	100,0
2	100 666	79,7	25 639	20,3	–	–	–	–	126 305	100,0
3	70 377	68,9	27 673	27,1	4 049	4,0	–	–	102 099	100,0
4	45 626	61,1	23 057	30,9	5 410	7,3	567	0,8	74 660	100,0
5	28 047	54,6	17 046	33,2	5 275	10,3	977	1,9	51 345	100,0
6	16 361	49,5	11 495	34,8	4 060	12,3	1 110	3,4	33 026	100,0
7 à 9	16 950	41,7	14 331	35,3	6 707	16,5	2 665	6,6	40 653	100,0
10 ou plus	2 810	30,1	3 173	34,0	2 006	21,5	1 346	14,4	9 335	100,0
Sous-total 1 à 4	351 433	80,3	76 369	17,4	9 459	2,2	567	0,1	437 828	100,0
Sous-total 5 ou plus	61 358	49,1	42 872	34,3	16 042	12,8	4 752	3,8	125 024	100,0
Total	415 601	72,6	122 414	21,4	27 507	4,8	6 665	1,2	572 187	100,0

Tableau 12

Répartition des personnes âgées participantes selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de pharmaciens propriétaires dispensateurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, le 9 juin 1996

Nombre d'ordonnances actives	NOMBRE DE PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES									
	1		2		3		4 ou plus		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	134 764	100,0	–	–	–	–	–	–	134 764	100,0
2	120 776	95,6	5 529	4,4	–	–	–	–	126 305	100,0
3	95 523	93,6	6 358	6,2	218	0,2	–	–	102 099	100,0
4	69 093	92,5	5 308	7,1	252	0,3	7	–	74 660	100,0
5	46 913	91,4	4 164	8,1	255	0,5	13	–	51 345	100,0
6	30 000	90,8	2 818	8,5	194	0,6	14	–	33 026	100,0
7 à 9	36 271	89,2	4 028	9,9	327	0,8	27	0,1	40 653	100,0
10 ou plus	7 935	85,0	1 233	13,2	142	1,5	25	0,3	9 335	100,0
Sous-total 1 à 4	420 156	95,7	17 195	3,9	470	0,1	7	–	437 828	100,0
Sous-total 5 ou plus	113 184	90,5	11 010	8,8	776	0,6	54	–	125 024	100,0
Total	541 275	94,6	29 438	5,1	1 388	0,2	86	–	572 187	100,0