




Portrait quotidien

de la consommation médicamenteuse
des personnes de 64 ans ou moins

Les 9 juin 1996, 7 juin 1998 et 11 juin 2000



Régie de
l'assurance maladie

Québec



Portrait quotidien

de la consommation médicamenteuse
des personnes de 64 ans ou moins

inscrites au régime d'assurance médicaments
administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec

Les 9 juin 1996, 7 juin 1998 et 11 juin 2000

Rédaction

Carole Chamberland
Sonia Lantin
Louise Roberge

Recherche et conception

Louise Barnard
Carole Chamberland
Sonia Lantin
Louise Roberge

Traitement informatique

François Bédard
Nathalie Côté
Katty Gagné
Sylvie Gagné
Renelle Grenier
Jean-Marie Parent

Révision

Danielle Doyon
Joëlle Mimeault
Estelle Portelance

Traitement de texte

Line Bertrand
Carole Chamberland

Réalisation des tableaux

Line Bertrand
Sylvie Cassista
Hélène Villeneuve

Conception graphique

Caractéra inc.

Conception et réalisation de la page couverture

Daniel Tremblay

Impression

À venir

Symboles

—: sans objet

*: trop petit pour être exprimé

Rapport produit par la Régie de l'assurance maladie du Québec

Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec, 2002
ISBN 2-550-3799-2-6

Dans le présent document, le masculin désigne aussi bien les femmes que les hommes, sauf indication contraire.

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES	7
INTRODUCTION	9
1 - MÉTHODOLOGIE	11
1.1 Source des données	11
1.2 Population étudiée	11
1.3 Médicaments examinés	11
1.4 Ordonnances actives	12
1.5 Définition des variables	13
1.6 Traitement des données	13
2 - RÉSULTATS RELATIFS AUX PRESTATAIRES D'ASSISTANCE-EMPLOI	15
2.1 Prestataires d'assistance-emploi assurés	15
2.2 Prestataires d'assistance-emploi participants	17
2.2.1 Répartition selon le nombre d'ordonnances actives	18
2.2.2 Répartition selon le nombre de prescripteurs et de pharmaciens	19
2.2.3 Répartition selon la région sociosanitaire	19
2.3 Prestataires d'assistance-emploi répartis selon les classes de médicaments	19
2.3.1 Médicaments du système nerveux central (SNC)	21
2.3.2 Hormones et substituts	22
2.3.3 Médicaments cardiovasculaires	24
2.3.4 Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	24
2.3.5 Médicaments gastro-intestinaux	24
2.3.6 Anti-infectieux	25
2.4 Ordonnances actives	25
3 - RÉSULTATS RELATIFS AUX ADHÉRENTS	27
3.1 Adhérents assurés	27
3.2 Adhérents participants	29
3.2.1 Répartition selon le nombre d'ordonnances actives	30
3.2.2 Répartition selon le nombre de prescripteurs et de pharmaciens	31
3.2.3 Répartition selon la région sociosanitaire	31
3.3 Adhérents répartis selon les classes de médicaments	31
3.3.1 Hormones et substituts	33
3.3.2 Médicaments du système nerveux central (SNC)	34
3.3.3 Médicaments cardiovasculaires	35
3.3.4 Médicaments gastro-intestinaux	36
3.3.5 Anti-infectieux	36
3.3.6 Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	36
3.4 Ordonnances actives	36

4 - COMPARAISON DES RÉSULTATS RELATIFS AUX PRESTATAIRES D'ASSISTANCE-EMPLOI ET AUX ADHÉRENTS, 11 JUIN 2000	39
4.1 Population assurée	39
4.2 Population participante	41
4.2.1 Répartition selon le nombre d'ordonnances actives	41
4.2.2 Répartition selon le nombre de prescripteurs et de pharmaciens	41
4.3 Prestataires d'assistance-emploi et adhérents répartis selon les classes de médicaments	42
4.3.1 Médicaments du système nerveux central (SNC)	43
4.3.2 Hormones et substituts	44
4.3.3 Médicaments cardiovasculaires	44
4.3.4 Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	44
4.3.5 Médicaments gastro-intestinaux	44
4.4 Ordonnances actives	44
5 - DISCUSSION	47
5.1 Limites de l'étude	47
5.2 Interprétation des résultats	47
CONCLUSION	51
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	53
ANNEXE 1	55
Tableaux relatifs à la consommation médicamenteuse des prestataires d'assistance-emploi inscrits au régime d'assurance médicaments administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), 11 juin 2000	
ANNEXE 2	75
Tableaux relatifs à la consommation médicamenteuse des prestataires d'assistance-emploi inscrits au régime d'assurance médicaments administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), 7 juin 1998	
ANNEXE 3	95
Tableaux relatifs à la consommation médicamenteuse des prestataires d'assistance-emploi inscrits au régime d'assurance médicaments administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), 9 juin 1996	
ANNEXE 4	115
Tableaux relatifs à la consommation médicamenteuse des adhérents inscrits au régime d'assurance médicaments administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), 11 juin 2000	

ANNEXE 5	137
Tableaux relatifs à la consommation médicamenteuse des adhérents inscrits au régime d'assurance médicaments administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), 7 juin 1998	
ANNEXE 6	157
Tableaux relatifs à la consommation médicamenteuse des personnes de 64 ans ou moins inscrites au régime d'assurance médicaments administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), 11 juin 2000	
ANNEXE 7	163
Tableaux relatifs à la consommation médicamenteuse des personnes de 64 ans ou moins inscrites au régime d'assurance médicaments administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), 7 juin 1998	
ANNEXE 8	169
Régions sociosanitaires du Québec	
ANNEXE 9	171
Principales indications cliniques des classes de médicaments	

LISTE DES TABLEAUX ET DES GRAPHIQUES

Tableau A

Principales caractéristiques de la consommation médicamenteuse des prestataires d'assistance-emploi, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996, 7 juin 1998 et 11 juin 2000

Tableau B

Principales caractéristiques de la consommation médicamenteuse des adhérents, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998 et 11 juin 2000

Tableau C

Comparaison des principales caractéristiques de la consommation médicamenteuse des prestataires d'assistance-emploi et des adhérents, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau D

Répartition des prestataires d'assistance-emploi et des adhérents participants selon le nombre de prescripteurs et de pharmaciens, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau E

Pourcentage de prestataires d'assistance-emploi et d'adhérents assurés ayant au moins une ordonnance active selon certaines classes, sous-classes et sous-sous-classes de médicaments, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Graphique 1

Répartition des prestataires assurés selon le groupe d'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Graphique 2

Pourcentage de participation des prestataires selon le groupe d'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Graphique 3

Répartition des prestataires participants selon le nombre d'ordonnances actives et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Graphique 4

Pourcentage des prestataires assurés ayant au moins une ordonnance active selon les principales classes de médicaments, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996, 7 juin 1998 et 11 juin 2000

Graphique 5

Pourcentage des prestataires assurés ayant au moins une ordonnance active selon les principales classes de médicaments et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Graphique 6

Pourcentage des prestataires assurés ayant au moins une ordonnance active selon les principales sous-classes des médicaments du système nerveux central (SNC), régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996, 7 juin 1998 et 11 juin 2000

Graphique 7

Pourcentage des prestataires assurés ayant au moins une ordonnance active selon les principales sous-classes ou regroupement de sous-classes des hormones et substituts, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996, 7 juin 1998 et 11 juin 2000

Graphique 8

Pourcentage des prestataires assurés ayant au moins une ordonnance active selon les sous-classes des médicaments cardiovasculaires, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996, 7 juin 1998 et 11 juin 2000

Graphique 9

Pourcentage des ordonnances actives chez les prestataires participants selon les principales classes de médicaments, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996, 7 juin 1998 et 11 juin 2000

Graphique 10

Répartition des ordonnances actives des prestataires participants selon les classes de médicaments et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Graphique 11

Répartition des adhérents assurés selon le groupe d'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Graphique 12

Pourcentage de participation des adhérents selon le groupe d'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Graphique 13

Répartition des adhérents participants selon le nombre d'ordonnances actives et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Graphique 14

Pourcentage d'adhérents assurés ayant au moins une ordonnance active selon les principales classes de médicaments, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998 et 11 juin 2000

Graphique 15

Pourcentage d'adhérents assurés ayant au moins une ordonnance active selon les principales classes de médicaments et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Graphique 16

Pourcentage d'adhérents assurés ayant au moins une ordonnance active selon les principales sous-classes ou regroupement de sous-classes des hormones et substituts, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998 et 11 juin 2000

Graphique 17

Pourcentage d'adhérents assurés ayant au moins une ordonnance active selon les principales sous-classes des médicaments du système nerveux central (SNC), régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998 et 11 juin 2000

Graphique 18

Pourcentage d'adhérents assurés ayant au moins une ordonnance active selon les sous-classes des médicaments cardiovasculaires, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998 et 11 juin 2000

Graphique 19

Pourcentage des ordonnances actives chez les adhérents participants selon les principales classes de médicaments, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998 et 11 juin 2000

Graphique 20

Répartition des ordonnances actives des adhérents participants selon les classes de médicaments et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Graphique 21

Pourcentage de personnes assurées ayant au moins une ordonnance active selon les principales classes de médicaments et la catégorie de personnes assurées, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Graphique 22

Répartition des ordonnances actives des personnes participantes selon les classes de médicaments et la catégorie de personnes assurées, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

INTRODUCTION

Les médicaments occupent aujourd'hui une place prépondérante dans l'arsenal thérapeutique visant à prévenir, à soulager, à contrôler ou à guérir de la maladie. Par conséquent, la nécessité de connaître les caractéristiques de la consommation médicamenteuse au sein de la population québécoise s'impose pour déceler divers problèmes de santé, pour planifier des moyens d'action en vue d'optimiser l'utilisation des médicaments et pour gérer le plus judicieusement possible les dépenses s'y rattachant.

De nombreux instruments de mesure et méthodes de collecte de données peuvent être employés pour témoigner de l'utilisation des médicaments, notamment les sondages, les statistiques annuelles (1), les enquêtes transversales comme l'*Enquête sociale et de santé* (2) et les portraits quotidiens (3, 4). Ils fournissent toutefois des renseignements différents. La dernière approche a été retenue dans la présente étude.

Les analyses portant sur la consommation médicamenteuse quotidienne en facilitent la surveillance et le suivi et mettent en relief l'utilisation, pour une journée donnée, de plusieurs médicaments prescrits à une personne distincte. De ce type de portrait se dégage donc, dans une certaine mesure, l'intention du ou des prescripteurs quant aux traitements établis. Ainsi, ce portrait permet de nous renseigner sur l'existence de problèmes de santé dans une population déterminée. La consommation médicamenteuse observée au cours d'une journée donnée, lorsqu'elle est analysée à intervalles réguliers, permet de découvrir des tendances, mais non de préciser la consommation médicamenteuse quotidienne moyenne durant une année spécifique.

Cette étude apporte de nouvelles données sur la consommation médicamenteuse de la population âgée de 64 ans ou moins inscrite au régime d'assu-

rance médicaments qu'administre la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) dont le nombre s'est accru depuis l'implantation du régime général d'assurance médicaments le 1^{er} janvier 1997. Cette étude s'ajoute en fait au *Portrait quotidien de la consommation médicamenteuse des personnes âgées non hébergées* (3) publié en juin 2001.

Les objectifs poursuivis consistent à décrire et à quantifier l'utilisation des médicaments au cours d'une journée donnée chez les personnes de 64 ans ou moins assurées par la RAMQ, à en dégager des tendances et à procéder plus tard à une évaluation qualitative. La population à l'étude les 11 juin 2000 et 7 juin 1998 inclut les prestataires d'assurance-emploi et les adhérents. Pour le 9 juin 1996, elle comprend seulement les prestataires, puisqu'ils étaient les seuls dans ce groupe d'âge à être couverts par la RAMQ à cette date. Les données portant sur les deux catégories de personnes assurées sont présentées séparément.

Les résultats de l'étude pourront notamment aider les différents intervenants du réseau sociosanitaire à soutenir la prise de décision et à privilégier des moyens d'action en matière de prévention de la maladie et de promotion de la santé.

Le rapport comprend cinq chapitres. Dans le premier chapitre est décrite la méthodologie retenue pour effectuer l'étude. Les deuxième et troisième chapitres présentent respectivement les résultats obtenus quant aux caractéristiques respectives des prestataires d'assurance-emploi et des adhérents. Le quatrième chapitre met en parallèle les résultats relatifs aux deux catégories de personnes assurées à l'étude en ce qui a trait à leur pourcentage de participation et à l'utilisation de certaines classes de médicaments. La discussion constitue le cinquième chapitre.

1 - MÉTHODOLOGIE

Le portrait quotidien de la consommation médicamenteuse des personnes de 64 ans ou moins porte sur les ordonnances ayant eu cours les 9 juin 1996, 7 juin 1998 et 11 juin 2000. Ces dates sont les mêmes que celles qui ont été retenues pour le portrait quotidien de la consommation médicamenteuse des personnes âgées de 65 ans ou plus non hébergées (3) et toutes correspondent à un dimanche de juin. Retenir cette période de l'année permet d'éviter de sous-estimer la consommation médicamenteuse d'un certain nombre de personnes qui s'absentent du Québec l'hiver pour y revenir au printemps. Le choix d'un dimanche est aléatoire.

1.1 Source des données

Les données relatives aux médicaments proviennent de la banque informationnelle de données de la RAMQ. Les médicaments assurés et délivrés aux personnes admissibles au régime public d'assurance médicaments sont facturés électroniquement à la RAMQ par les pharmaciens communautaires. Certains renseignements fournis sur la demande de paiement sont recueillis dans des fichiers informatisés, dont le numéro d'assurance maladie, le code du médicament, la quantité dispensée, la durée de traitement de l'ordonnance ainsi que les numéros d'identification du prescripteur et du pharmacien. Toutes les données utilisées aux fins de l'étude sont anonymes. La banque de données de la RAMQ ne contient ni information sur le diagnostic ayant conduit à la prescription du médicament ni sur l'intention thérapeutique du prescripteur, à l'exception de la facturation relative aux programmes de gratuité pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement (MTS) et pour celui de la tuberculose.

1.2 Population étudiée

La population étudiée se compose des personnes de 64 ans ou moins, inscrites à la RAMQ d'une façon continue durant la période d'observation au

régime d'assurance médicaments. Il s'agit des deux catégories de personnes assurées suivantes : les prestataires d'assistance-emploi et les adhérents.

Le premier groupe est constitué de prestataires d'assistance-emploi, devant être inscrits au régime de façon continue durant les trois mois précédant les journées d'observation, soit respectivement entre le 9 mars et le 9 juin 1996 inclusivement, entre le 7 mars et le 7 juin 1998 inclusivement et pour l'année 2000, entre le 11 mars et le 11 juin inclusivement. Les prestataires d'assistance-emploi de 65 ans ou plus ont été inclus dans une autre étude (3).

Le second groupe est composé d'adhérents, devant être inscrits au régime de façon continue durant les trois mois précédant les journées d'observation, soit respectivement entre le 7 mars et le 7 juin 1998 inclusivement et, entre le 11 mars et le 11 juin 2000 inclusivement. Comme le régime général d'assurance médicaments a été instauré le 1^{er} janvier 1997, ces personnes s'y sont donc inscrites progressivement. Les adhérents ayant reçu des prestations d'assistance-emploi à un moment précis au cours de ces périodes sont exclus de l'étude.

La répartition des personnes selon le groupe d'âge est basée sur l'âge qu'elles avaient le 9 mars 1996, le 7 mars 1998 ou le 11 mars 2000.

Les pourcentages de prestataires ou d'adhérents présentés au tableau 7 (annexes 1 à 5) selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge sont obtenus en divisant le nombre de personnes ayant au moins une ordonnance active de médicaments de la classe visée par l'ensemble des personnes assurées d'une même catégorie (prestataires d'assistance-emploi ou adhérents).

1.3 Médicaments examinés

Il s'agit des médicaments inscrits à la *Liste de médicaments* (5) publiée par la RAMQ, y compris les médicaments d'exception¹, les médicaments

¹ Les médicaments d'exception sont couverts par le régime général dans les seuls cas, conditions et indications thérapeutiques que le ministre détermine par règlement.

couverts par le programme de gratuité pour le traitement des maladies transmissibles sexuellement ainsi que par le programme de gratuité pour la chimioprophylaxie et le traitement de la tuberculose. Ne sont pris en compte ni les fournitures inscrites à la *Liste de médicaments*, ni les médicaments délivrés dans le cadre du programme *Patient d'exception*², ni les produits pharmaceutiques en vente libre, sauf si ces derniers sont prescrits et inscrits à la Liste et facturés à la RAMQ.

Aux fins de l'étude, les médicaments sont classés d'après la codification utilisée dans la *Liste de médicaments*, soit selon l'usage thérapeutique attribué dans le système de l'*American Hospital Formulary Service (AHFS)* conçu par l'*American Society of Health-System Pharmacists (6)*. Les médicaments sont donc groupés par classes, sous-classes et sous-sous-classes.

Les médicaments les plus fréquemment dispensés, y compris ceux de la classe AHFS «Autres médicaments», sont présentés distinctement avec certaines de leurs sous-classes et sous-sous-classes. Au nombre de onze, les classes choisies regroupent environ 96 % des médicaments inscrits dans la Liste et sont présentées suivant l'ordre établi par l'AHFS (6) dans les tableaux 7, 8, 9 et 10: anti-infectieux, médicaments du système nerveux autonome (SNA), médicaments cardiovasculaires, médicaments du système nerveux central (SNC), électrolytes-diurétiques, ORLO (oto-rhino-laryngologie-ophtalmologie), médicaments gastro-intestinaux, hormones et substituts, peau et muqueuses (dermatologie), spasmolytiques et autres médicaments. Dans la classe des hormones et substituts, le regroupement «Autres hormones et substituts» comprend cinq sous-classes: les androgènes, les estrogènes et antiestrogènes, les progestatifs, les parathyroïdiens et les hormones hypophysaires.

Quatre pour cent des médicaments de la *Liste* n'appartenant à aucune des onze classes retenues sont réunis et appelés «Médicaments des autres classes regroupées». Il s'agit des antihistaminiques, des antinéoplasiques, des médicaments du sang,

des agents diagnostiques, des enzymes, des médicaments de la toux, des sels d'or, des antidotes des métaux lourds, des ocytociques, des vitamines ainsi que des médicaments d'exception³ n'ayant pu être assignés dans aucune des onze classes retenues.

Dans le texte, le choix des classes de médicaments retenus aux fins d'analyse et de discussion a été déterminé sur la base de leur prévalence d'utilisation et de leur intérêt thérapeutique. Ces classes de médicaments sont présentées par ordre décroissant du pourcentage de personnes assurées qui les utilisent. Certaines sous-classes font l'objet d'une analyse particulière suscitée par l'intérêt clinique des médicaments qui les composent. Les résultats concernant la classe des électrolytes-diurétiques sont présentés avec ceux de la sous-classe des anti-hypertenseurs, puisque ces médicaments servent principalement au traitement de l'hypertension.

1.4 Ordonnances actives

Les ordonnances actives retenues concernent exclusivement les médicaments à l'étude (section 1.3). Comme la majorité des ordonnances ont une durée de traitement inférieure à 90 jours, les ordonnances facturées à la RAMQ au cours des 90 jours précédant le jour d'observation sont repérées dans le fichier des médicaments, puis examinées. À titre d'exemple, une ordonnance est considérée active le 11 juin 2000 si la date de service se situe entre le 11 mars et le 11 juin 2000 et si la durée de traitement s'étend jusqu'au 11 juin 2000 inclusivement. Les services pharmaceutiques⁴ non liés à la dispensation de médicaments ne sont pas retenus dans cette étude.

Une ordonnance dispensée durant les journées précédant la fin de la durée de traitement d'une ordonnance antérieure de même dénomination commune, de même forme et de même teneur pour la même personne est exclue, même si elle est active lors de la journée d'observation. Ce faisant, il n'y a pas double comptage d'ordonnances pour un médicament qui aurait été renouvelé hâtivement.

Dans le texte, les termes *ordonnances actives* et *ordonnances* sont utilisés indifféremment.

² Le programme Patient d'exception concerne le paiement d'un médicament non inscrit à la Liste de médicaments pour une personne assurée auprès de la RAMQ lorsque la nature et la gravité de sa maladie de même que le coût de sa thérapie médicamenteuse lui imposent un fardeau financier difficilement acceptable. À la rigueur, il s'agit de cas qui nécessiteraient une admission dans un établissement de santé si le médicament en question n'était pas fourni à la personne.

³ Dans la Liste de médicaments, les médicaments d'exception sont regroupés sans classe AHFS.

⁴ Les services pharmaceutiques visés sont les opinions pharmaceutiques, les refus d'exécuter ou de renouveler une ordonnance ainsi que la rémunération mensuelle dans le cadre du mécanisme de surveillance et de suivi de la consommation des médicaments chez certains prestataires d'assistance-emploi.

1.5 Définition des variables

Prestataire d'assistance-emploi assuré

Personne de 64 ans ou moins qui détient un carnet de réclamation délivré par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS), y compris toute personne à sa charge reconnue par le MESS, ou personne de 60 à 64 ans qui reçoit une allocation d'aide au conjoint. Aux fins de l'étude, cette personne doit être inscrite à titre de prestataire la journée d'observation ainsi que de façon continue durant les trois mois précédents. Dans le texte, les termes *prestataire d'assistance-emploi* et *prestataire* sont utilisés indifféremment.

Prestataire d'assistance-emploi participant

Prestataire d'assistance-emploi assuré qui a au moins une ordonnance active la journée d'observation.

Adhérent assuré

Personne de moins de 65 ans qui détient une carte d'assurance maladie valide et est inscrite à la RAMQ au régime d'assurance médicaments. Cette personne n'a pas accès à une assurance collective et n'est ni prestataire d'assistance-emploi, ni détentrice d'un carnet de réclamation. Aux fins de l'étude, elle doit être inscrite à titre d'adhérent la journée d'observation ainsi que de façon continue durant les trois mois précédant cette journée.

Adhérent participant

Adhérent assuré qui a au moins une ordonnance active la journée d'observation.

Durée de traitement

Période correspondant au nombre de jours inscrits sur la demande de paiement transmise par le pharmacien à la RAMQ et comptabilisée à partir de la date de service de l'ordonnance.

Pharmacien

Tout pharmacien qui travaille dans un même local de pharmacie désigné par une raison sociale de pharmacie.

Prescripteur

Professionnel de la santé, médecin, résident en médecine, dentiste ou sage-femme qui a rédigé une ordonnance considérée active la journée d'observation.

Région sociosanitaire

Les données territoriales sont groupées selon le découpage retenu par le ministère de la Santé et des Services sociaux (annexe 8). Le code postal consigné au fichier d'inscription des personnes assurées détermine la région sociosanitaire à laquelle elles sont associées. Certaines personnes assurées se retrouvent dans un territoire « régions indéterminées », car leur code postal est invalide ou absent de la banque de données. La région sociosanitaire associée à chaque prescripteur est déterminée par le code postal du lieu de pratique principal consigné au fichier d'inscription des professionnels de la santé de la RAMQ. Certains prescripteurs se retrouvent dans un territoire « régions indéterminées » pour les raisons énumérées ci-dessus ou encore parce que leur lieu de pratique est situé à l'extérieur du Québec. La région sociosanitaire d'un pharmacien est déterminée par le code postal du local de pharmacie consigné au fichier d'inscription des professionnels de la santé de la RAMQ.

1.6 Traitement des données

Le traitement informatique a été effectué par les analystes et les techniciens en informatique du Service du développement et de l'entretien des systèmes de la Direction des systèmes d'information de la RAMQ. Les principaux logiciels utilisés sont Access et SAS.

Les pourcentages sont calculés à deux décimales près, mais, dans les annexes, les tableaux n'en comportent qu'une. Les pourcentages sont arrondis à la première décimale⁵.

⁵ De la sorte, le total ne correspond pas nécessairement à la somme des parties.

2 - RÉSULTATS RELATIFS AUX PRESTATAIRES D'ASSISTANCE-EMPLOI

Le présent chapitre dresse le portrait quotidien de la consommation médicamenteuse des prestataires d'assistance-emploi. Il porte sur les caractéristiques des prestataires assurés et des prestataires participants, sur le nombre d'ordonnances actives, sur les classes de médicaments délivrés et sur la répartition de ces variables selon la région sociosanitaire et selon le nombre de prescripteurs et de pharmaciens visités.

Les résultats obtenus le 11 juin 2000 et reproduits dans les tableaux de l'annexe 1 sont décrits en premier lieu. Ponctuellement, les résultats des 7 juin 1998 et 9 juin 1996 soulignent les tendances observées avec le temps. Les résultats relatifs à ces deux dates figurent dans les annexes 2 et 3 respectivement.

2.1 Prestataires d'assistance-emploi assurés

Le 11 juin 2000, 571 166 prestataires assurés sont inclus dans l'étude, 48,4% sont de sexe masculin. Selon l'âge, les prestataires se répartissent ainsi: 30,0% ont 19 ans ou moins, 20,9%, de 20 à 34 ans, 27,6%, de 35 à 49 ans et 21,5% ont de 50 à 64 ans (tableau 1, annexe 1; graphique 1).

Le nombre de prestataires assurés à l'étude le 11 juin 2000, est de 25% inférieur à celui observé le 9 juin 1996 (761 760). Le 7 juin 1998, le nombre s'établissait à 676 339. Pour ces trois journées, la répartition selon le sexe demeure similaire, mais elle diffère selon le groupe d'âge. Du 9 juin 1996 au 11 juin 2000, le poids relatif des groupes d'âge de 35 à 49 ans et de 50 à 64 ans augmente contrairement à celui des deux groupes d'âge plus jeunes. Ainsi, entre ces deux dates, il y a une baisse respective de 3,6 et de 4,8 points de pourcentage pour les groupes des 19 ans ou moins et des 20 à 34 ans, mais une hausse de 2,8 et de 5,6 points de pourcentage dans les groupes de 35 à 49 ans et de 50 à 64 ans respectivement (tableau 1, annexes 1, 2 et 3; tableau A). Il y a donc eu vieillissement du groupe des prestataires.

Le tableau A permet de comparer certaines caractéristiques de la consommation médicamenteuse des prestataires d'assistance-emploi au cours des trois journées retenues.

Graphique 1

Répartition des prestataires assurés selon le groupe d'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

■ Hommes
■ Femmes
■ Tous




Tableau A

Principales caractéristiques de la consommation médicamenteuse des prestataires d'assistance-emploi, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996, 7 juin 1998 et 11 juin 2000

PRESTATAIRES D'ASSISTANCE-EMPLOI	9 juin 1996	7 juin 1998	11 juin 2000
Nombre de personnes assurées¹	761 760	676 339	571 166
Répartition des personnes assurées¹			
Pourcentage hommes	48,5	48,3	48,4
Pourcentage femmes	51,5	51,7	51,6
Pourcentage 0-19 ans	33,6	32,7	30,0
Pourcentage 20-34 ans	25,7	23,0	20,9
Pourcentage 35-49 ans	24,8	26,2	27,6
Pourcentage 50-64 ans	15,9	18,0	21,5
Nombre de personnes participantes²	219 295	181 291	186 526
Pourcentage de personnes participantes²	28,8	26,8	32,7
Répartition des personnes participantes³			
Pourcentage hommes	37,0	37,4	38,7
Pourcentage femmes	63,0	62,6	61,3
Pourcentage 0-19 ans	12,5	12,5	10,9
Pourcentage 20-34 ans	22,8	18,5	16,7
Pourcentage 35-49 ans	31,4	31,9	32,6
Pourcentage 50-64 ans	33,3	37,1	39,9
Nombre d'ordonnances actives⁴	567 706	506 124	597 680
Pourcentage de personnes participantes ayant³			
De 1 à 4 ordonnances actives	85,1	82,1	76,5
De 5 à 9 ordonnances actives	13,5	15,9	20,1
10 ordonnances actives ou plus	1,4	2,0	3,4
Nombre moyen d'ordonnances actives⁴			
Par personne assurée	0,8	0,8	1,1
Par personne participante	2,6	2,8	3,2
Homme	2,7	2,9	3,2
Femme	2,5	2,8	3,2
0-19 ans	1,3	1,4	1,4
20-34 ans	1,8	1,9	2,1
35-49 ans	2,7	2,8	3,2
50-64 ans	3,5	3,7	4,2

¹ Tableau 1, annexes 1, 2 et 3.

² Tableau 2, annexes 1, 2 et 3.

³ Tableau 5, annexes 1, 2 et 3.


⁴ Tableau 3, annexes 1, 2 et 3.

2.2 Prestataires d'assistance-emploi participants

Le 11 juin 2000, 186 526 prestataires ont au moins une ordonnance active, soit 32,7% de tous les prestataires assurés visés par l'étude. Ce taux se situe à 26,2% chez les hommes et à 38,8% chez les femmes. Le pourcentage de participation aug-

mente avec l'âge ; il est de 11,8% chez les 19 ans ou moins, de 26,0% chez les 20 à 34 ans, de 38,6% chez les 35 à 49 ans et de 60,6% chez les 50 à 64 ans (tableau 2, annexe 1; graphique 2). Le pourcentage de prestataires participants était plus faible les 7 juin 1998 (26,8%) et 9 juin 1996 (28,8%) (tableau A).

Graphique 2



Le 11 juin 2000, 61,3% des prestataires participants sont des femmes. Les participants se répartissent ainsi: 10,9% ont 19 ans ou moins; 16,7%, ont 20 à 34 ans; 32,6%, ont 35 à 49 ans; 39,9%, ont 50 à 64 ans. Leur répartition par groupes d'âge varie

selon l'année visée, la plus importante différence est notée dans le groupe des 50 à 64 ans qui regroupait 33,3% des participants le 9 juin 1996 (tableau A).

2.2.1 Répartition selon le nombre d'ordonnances actives


Le 11 juin 2000, le tiers des prestataires participants (33,9%) dispose d'une seule ordonnance active et 3,4% en cumulent dix ou plus. Le pourcentage de participants ayant une seule ordon-

nance est plus élevé chez les femmes (35,5%) que chez les hommes (31,3%), alors que ces pourcentages s'équivalent chez les participants possédant cinq ordonnances ou plus, soit 23,6% et 23,4% respectivement (tableau 5, annexe 1; graphique 3).

Graphique 3

Répartition des prestataires participants selon le nombre d'ordonnances actives et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

- Hommes
- Femmes
- Tous



Il y a une diminution du pourcentage de prestataires participants disposant d'une seule ordonnance active le 11 juin 2000 (33,9%) comparativement aux 7 juin 1998 (39,1%) et 9 juin 1996 (41,7%). En

contrepartie, le pourcentage de ceux qui en présentent cinq ou plus est plus élevé le 11 juin 2000 (23,5%) comparativement à 17,9% le 7 juin 1998 et à 14,9%, le 9 juin 1996 (tableau 5, annexes 1, 2 et 3).

2.2.2 Répartition selon le nombre de prescripteurs et de pharmaciens

Le 11 juin 2000, 74,5% des prestataires participants se procurent l'ensemble de leurs ordonnances d'un seul prescripteur, 19,4%, de deux prescripteurs, 4,6%, de trois et 1,5%, de quatre ou plus (tableau 11, annexe 1). La majorité des participants (93,9%) les obtiennent ainsi de un ou deux prescripteurs. Un plus grand pourcentage de participants avaient eu des ordonnances rédigées par un seul prescripteur les 7 juin 1998 (78,3%) et 9 juin 1996 (79,0%) (tableau 11, annexes 1, 2 et 3).

Le 11 juin 2000, le pourcentage de prestataires participants ayant un seul prescripteur diminue à mesure que le nombre d'ordonnances actives augmente. Ainsi, 83,5% des prestataires participants ayant entre une et quatre ordonnances les reçoivent d'un seul prescripteur par rapport à 45,0% chez ceux qui en disposent de cinq ou plus (tableau 11, annexe 1).

Le 11 juin 2000, 94,8% des participants s'étaient procuré leurs ordonnances chez un seul pharmacien, 4,9%, chez deux pharmaciens, 0,3%, chez trois et une proportion négligeable chez quatre pharmaciens ou plus (tableau 12, annexe 1). La situation était similaire les années précédentes (tableau 12, annexes 2 et 3).

Le 11 juin 2000, le pourcentage de prestataires participants s'étant procuré leurs ordonnances d'un seul pharmacien diminue légèrement à mesure que le nombre d'ordonnances augmente. Ainsi, 96,4% des participants disposant de une à quatre ordonnances les ont reçues d'un seul pharmacien par rapport à 89,6% chez ceux qui en avaient cinq ou plus (tableau 12, annexe 1).

2.2.3 Répartition selon la région sociosanitaire

Les résultats relatifs aux régions du Nunavik, des Terres-Cries-de-la-Baie-James et du Nord-du-Québec sont fournis dans les tableaux 4, 6 et 10 (annexes 1, 2, 3). Ils sont toutefois exclus de

l'analyse, parce que ces trois régions présentent un trop petit nombre de personnes assurées.

Le 11 juin 2000, les plus hauts pourcentages de participation se trouvent dans les régions de Chaudière-Appalaches (42,8%) et du Bas-Saint-Laurent (40,4%) tandis que les plus bas se trouvent dans celles de Montréal-Centre (28,3%) et de l'Outaouais (28,9%). La région de Chaudière-Appalaches affiche également le pourcentage le plus élevé de prestataires ayant au moins cinq ordonnances actives (11,3%); elle est suivie de la région du Bas-Saint-Laurent (10,9%). Ce sont les régions de Montréal-Centre et de Laval qui ont les pourcentages les moins élevés, soit respectivement 6,3% et 6,7% (tableau 4, annexe 1). Les mêmes observations valent pour les 7 juin 1998 et le 9 juin 1996 (tableau 4, annexes 2 et 3).


2.3 Prestataires d'assistance-emploi répartis selon les classes de médicaments

Dans cette section, les pourcentages de prestataires d'assistance-emploi participants (ayant au moins une ordonnance active), par rapport au nombre de prestataires assurés, sont présentés par classes, sous-classes et sous-sous-classes de médicaments. Le lecteur trouvera une description des indications thérapeutiques et cliniques des médicaments faisant partie de certaines classes à l'annexe 9.

Les classes de médicaments où l'on retrouve le plus fort pourcentage de participation chez les prestataires sont, par ordre d'importance, les médicaments du système nerveux central (SNC) (19,4%), les hormones et substituts (13,9%), les médicaments cardiovasculaires (9,2%). Viennent ensuite les médicaments du système nerveux autonome (SNA) (5,3%), les médicaments gastro-intestinaux (4,6%), les électrolytes-diurétiques (3,3%) et les anti-infectieux (2,7%) (tableau 7, annexe 1). Le 7 juin 1998 et le 9 juin 1996, on observe le même ordre d'importance pour les cinq premières classes (tableau 7, annexes 2 et 3; graphique 4).

Graphique 4

Pourcentage des prestataires assurés ayant au moins une ordonnance active selon les principales classes de médicaments, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996, 7 juin 1998 et 11 juin 2000




Le 11 juin 2000, un pourcentage plus élevé de femmes que d'hommes ont au moins une ordonnance active dans la majorité des classes et sous-classes de médicaments, à l'exception des sous-classes des vasodilatateurs, des anticonvulsivants,

des autres médicaments du SNA ainsi que de la sous-sous-classe des tranquillisants (tableau 7, annexe 1; graphique 5). Les mêmes observations valent pour les 7 juin 1998 et 9 juin 1996 (tableau 7, annexes 2 et 3).

Graphique 5

Pourcentage des prestataires assurés ayant au moins une ordonnance active, selon les principales classes de médicaments et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000




2.3.1 Médicaments du système nerveux central (SNC)

Le 11 juin 2000, 19,4 % des prestataires assurés ont au moins une ordonnance active pour un médicament du SNC, soit 21,1 % chez les femmes et 17,7 % chez les hommes. C'est dans le groupe des 50 à 64 ans (40,2 %) et dans celui des 35 à 49 ans (26,6 %) que les pourcentages s'avèrent les plus élevés. Dans le groupe des femmes de 50 à 64 ans,

on retrouve le plus fort pourcentage (45,1 %) de personnes ayant au moins une ordonnance de médicaments du SNC (tableau 7, annexe 1).

Les pourcentages de prestataires assurés présentant des ordonnances de médicaments du SNC étaient plus bas les 7 juin 1998 (14,8 %) et 9 juin 1996 (15,3 %). Leur répartition par sous-classes des médicaments du SNC varie peu selon la journée étudiée (tableau 7, annexes 2 et 3 ; graphique 6).

Graphique 6



Anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques

Le 11 juin 2000, parmi les médicaments du SNC, les anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques s'avèrent les plus fréquemment utilisés, on les retrouve chez 10,3 % des prestataires. Le pourcentage de prestataires assurés ayant une ordonnance liée à la sous-sous-classe des benzodiazépines s'élève à 9,8 %. Le pourcentage chez les femmes est plus élevé (11,3 %) que chez les hommes (8,2 %). Ce pourcentage augmente avec le groupe d'âge : 0,2 % chez les 19 ans ou moins et 22,4 % chez les 50 à 64 ans. On retrouve le pourcentage le plus élevé (26,6 %) chez les femmes de 50 à 64 ans (tableau 7, annexe 1).

Psychotropes

Le 11 juin 2000, 9,5 % des prestataires assurés utilisent des psychotropes, sous-classe qui regroupe les antidépresseurs et les tranquillisants. On retrouve un plus fort pourcentage d'utilisateurs de psychotropes chez les femmes (10,8 %) que chez les hommes (8,2 %) (tableau 7, annexe 1).

Antidépresseurs

Le 11 juin 2000, 6,4 % des prestataires assurés possèdent au moins une ordonnance active d'antidépresseurs. Le pourcentage est presque deux fois plus élevé chez les femmes (8,4 %) que chez les hommes (4,3 %). Les pourcentages s'élèvent avec

l'âge : ils passent de 0,3 % chez les 19 ans ou moins à 12,1 % chez les 50 à 64 ans. Les femmes de 50 à 64 ans présentent le plus fort pourcentage (16,2 %), soit plus du double de celui des hommes du même groupe d'âge (7,5 %) (tableau 7, annexe 1).

Tranquillisants

Le 11 juin 2000, 4,3 % des prestataires assurés ont au moins une ordonnance active de tranquillisants. Le pourcentage est plus élevé chez les hommes (4,9 %) que chez les femmes (3,7 %), et il est particulièrement élevé dans le groupe des hommes de 35 à 49 ans (8,6 %) (tableau 7, annexe 1).

Analgésiques et antipyrétiques

Le 11 juin 2000, 6,9 % des prestataires assurés ont au moins une ordonnance d'un médicament de la sous-classe des analgésiques et des antipyrétiques. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), y

compris l'aspirine, constituent la majeure partie des ordonnances de médicaments de cette sous-classe et sont présents chez 5,5 % des prestataires assurés. Le pourcentage le plus élevé se retrouve chez les 50 à 64 ans (17,0 %) (tableau 7, annexe 1).


2.3.2 Hormones et substituts

Le 11 juin 2000, 13,9 % des prestataires assurés ont au moins une ordonnance de médicaments de la classe des hormones et substituts. Le pourcentage est plus élevé chez les femmes (21,7 %) que chez les hommes (5,6 %) et ce pourcentage augmente avec l'âge, atteignant 31,2 % chez les 50 à 64 ans (tableau 7, annexe 1). Les pourcentages de prestataires assurés ayant des ordonnances de cette classe de médicaments étaient de 11,0 % le 7 juin 1998 et de 11,4 % le 9 juin 1996 (tableau 7, annexes 2 et 3 ; graphique 7).

Graphique 7

Pourcentage des prestataires assurés ayant au moins une ordonnance active selon les principales sous-classes ou regroupement de sous-classes des hormones et substituts, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996, 7 juin 1998 et 11 juin 2000

■ 9 juin 1996
 ■ 7 juin 1998
 ■ 11 juin 2000



«Autres hormones et substituts»

Le 11 juin 2000, 5,4 % des prestataires assurés ont des ordonnances faisant partie de ce regroupement qui comprend principalement les estrogènes et les progestatifs. Ces médicaments sont utilisés presque exclusivement par les femmes (10,2 %), contre 0,2 % pour les hommes ; celles de 50 à 64 ans affichant le plus fort pourcentage (32,5 %) (tableau 7, annexe 1).

Thyroïdiens

Le 11 juin 2000, 3,0 % des prestataires assurés présentent au moins une ordonnance de médicaments de cette classe. Le pourcentage chez les femmes (4,8 %) est plus de quatre fois supérieur à celui chez les hommes (1,1 %). Les pourcentages augmentent avec l'âge ; ils varient ainsi de 0,2 % chez les 19 ans ou moins à 7,7 % chez les 50 à 64 ans (tableau 7, annexe 1).

Hypoglycémiant

Le 11 juin 2000, 2,7 % des prestataires assurés ont au moins une ordonnance d'hypoglycémiant. Le pourcentage s'élève avec l'âge, passant de 0,1 % chez les 19 ans ou moins à 8,5 % chez les 50 à 64 ans (tableau 7, annexe 1).

Anovulants

Chez les prestataires, 5,1 % des femmes utilisent des anovulants, le 11 juin 2000. Celles qui ont de 20 à 34 ans affichent le plus fort pourcentage (13,0 %). Le faible pourcentage observé chez les femmes de 19 ans ou moins (4,6 %) est dû au fait que les enfants sont compris dans ce groupe ; ceux-ci étant peu susceptibles d'utiliser des anovulants (tableau 7, annexe 1).


2.3.3 Médicaments cardiovasculaires

Le 11 juin 2000, 9,2% des prestataires assurés ont au moins une ordonnance de médicaments de cette classe. Le pourcentage chez les femmes est de 10,2% et chez les hommes de 8,2%. Ce pourcentage augmente avec l'âge, passant de 0,2% chez les 19 ans ou moins à 29,9% chez les 50 à 64 ans. Parmi les sous-classes de médicaments cardiovasculaires, les pourcentages de prestataires assurés qui présentent au moins une ordonnance active de

cardiotropes, d'antihypertenseurs ou d'hypolipémiants sont respectivement de 4,5%, 4,4% et 4,3%. Les pourcentages les plus élevés pour ces sous-classes concernent les groupes de 50 à 64 ans : 14,9%, 14,9% et 14,8% (tableau 7, annexe 1). Les pourcentages des prestataires assurés qui disposaient d'au moins une ordonnance de médicaments cardiovasculaires étaient respectivement 6,7% et de 6,3% les 7 juin 1998 et 9 juin 1996 (tableau 7, annexes 2 et 3; graphique 8).

Graphique 8

Pourcentage des prestataires assurés ayant au moins une ordonnance active selon les sous-classes des médicaments cardiovasculaires, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996, 7 juin 1998 et 11 juin 2000



Sous-classes des médicaments cardiovasculaires

2.3.4 Médicaments du système nerveux autonome (SNA)

Le 11 juin 2000, 5,3% des prestataires assurés utilisent des médicaments du SNA. Le pourcentage augmente avec le groupe d'âge; il passe de 1,7% chez les 19 ans ou moins à 9,7% chez les 50 à 64 ans. La sous-classe des sympathomimétiques est utilisée par 2,6% des prestataires assurés (tableau 7, annexe 1).

2.3.5 Médicaments gastro-intestinaux

Le 11 juin 2000, 4,6% des prestataires assurés ont au moins une ordonnance de médicaments gastro-intestinaux. Ce pourcentage est de 5,3% chez les femmes et de 3,9% chez les hommes. Les pourcentages augmentent avec l'âge passant de 0,2% chez les 19 ans ou moins à 11,9% chez les 50 à 64 ans. C'est dans le groupe des femmes âgées de 50 à 64 ans que l'on retrouve le plus fort pourcentage, soit 13,7%. Les anti-ulcéreux constituent la sous-sous-classe utilisée par la proportion la plus élevée de prestataires assurés (4,1%) (tableau 7, annexe 1).

2.3.6 Anti-infectieux

Le 11 juin 2000, 2,7% des prestataires assurés ont au moins une ordonnance d'anti-infectieux; le pourcentage est de 3,0% chez les femmes et de 2,5% chez les hommes. Le pourcentage est le plus élevé dans le groupe des 50 à 64 ans, soit 3,1% (tableau 7, annexe 1).

2.4 Ordonnances actives

Le 11 juin 2001, 617 806 ordonnances actives ont été dénombrées, de ce nombre, 20 126 ont dû être éliminées⁶ pour éviter un double décompte en raison des renouvellements hâtifs. Les résultats alors obtenus portent donc sur 597 680 ordonnances actives. Le nombre d'ordonnances retenues s'élevait à 567 706 le 9 juin 1996 (18 444 éliminées) et à 506 124, le 7 juin 1998 (10 124 éliminées) (tableau A).

Le nombre moyen d'ordonnances actives par prestataire assuré est de 1,1 le 11 juin 2000, soit 1,2

chez les femmes comparativement à 0,8 chez les hommes. Il augmente avec l'âge variant de 0,2 chez les 19 ans ou moins à 2,5 chez les 50 à 64 ans (tableau 3, annexe 1).


Cette même journée, le nombre moyen d'ordonnances actives par participant est le même chez les hommes et les femmes (3,2). Il augmente avec l'âge, soit 1,4 chez les 19 ans ou moins et 4,2 chez les 50 à 64 ans (tableau 3, annexe 1).

Le 11 juin 2000, 39,2% des ordonnances concernent les médicaments du SNC et 18,8%, les médicaments de la classe hormones et substituts. Les ordonnances des médicaments cardiovasculaires arrivent au troisième rang (15,1%), suivies de celles des médicaments du SNA (5,8%) et des médicaments gastro-intestinaux (5,1%) (tableau 8, annexe 1). Les 7 juin 1998 et 9 juin 1996, l'ordre d'importance des différentes classes est le même et les pourcentages d'ordonnances actives pour chacune d'elles varient peu (tableau 8, annexes 2 et 3; graphique 9).

Graphique 9

Pourcentage des ordonnances actives chez les prestataires participants selon les principales classes de médicaments, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996, 7 juin 1998 et 11 juin 2000

■ 9 juin 1996
■ 7 juin 1998
■ 11 juin 2000



⁶ Voir la section 1.4.


Le 11 juin 2000, 43,7% des ordonnances actives chez les hommes concernent des médicaments du SNC comparativement à 36,3% chez les femmes. Les hormones et substituts correspondent à 25,0% des ordonnances chez les femmes et à 9,1% de

celles chez les hommes, alors que les médicaments cardiovasculaires représentent 18,1% des ordonnances délivrées aux hommes et 13,1% aux femmes (tableau 8, annexe 1 ; graphique 10).

Graphique 10

Répartition des ordonnances actives des prestataires participants selon les classes de médicaments et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

-  SNC
-  Hormones et substituts
-  Cardiovasculaires
-  SNA
-  Gastro-intestinaux
-  Électrolytes-diurétiques
-  Anti-infectieux
-  Autres classes



3 - RÉSULTATS RELATIFS AUX ADHÉRENTS

Ce chapitre présente le portrait quotidien de la consommation médicamenteuse des adhérents. Il fait état des caractéristiques des adhérents assurés et des adhérents participants, du nombre d'ordonnances actives, des classes de médicaments délivrés et de la répartition de toutes ces variables selon la région sociosanitaire ainsi que selon le nombre de prescripteurs et de pharmaciens visités.

Les résultats obtenus le 11 juin 2000 sont présentés en premier lieu et reproduits dans les tableaux de

l'annexe 4. À l'occasion, des références aux résultats du 7 juin 1998 sont mentionnées (annexe 5).


3.1 Adhérents assurés

Le 11 juin 2000, 1 613 480 adhérents assurés sont inclus dans l'étude, 47,5 % sont des hommes. Selon les groupes d'âge, les adhérents assurés sont ainsi répartis : 25,1 % ont 19 ans ou moins ; 26,0 %, 20 à 34 ans ; 25,4 %, 35 à 49 ans ; 23,5 % ont de 50 à 64 ans (tableau 1, annexe 4 ; graphique 11).

Graphique 11

Répartition des adhérents assurés selon le groupe d'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Hommes
Femmes
Tous



Depuis le 1^{er} janvier 1997, cette catégorie de personnes est assurée par la RAMQ à la suite de l'instauration du régime général d'assurance médicaments. Ainsi, entre le 7 juin 1998 et le 11 juin 2000, il y a eu une augmentation de 13,2 % du nombre d'adhérents assurés retenus aux fins de l'étude sans observer un changement notable dans la répartition selon le sexe ou le groupe d'âge. Le 7 juin 1998, le nombre d'adhérents assurés inclus

dans l'étude s'élevait à 1 425 602 ; 52,3 % sont des femmes. Parmi les adhérents, 24,8 % ont 19 ans ou moins ; 26,3 %, 20 à 34 ans ; 24,5 %, 35 à 49 ans ; 24,4 %, ont de 50 à 64 ans (tableau B).

Le tableau B permet de comparer certaines caractéristiques de la consommation médicamenteuse des adhérents les 7 juin 1998 et 11 juin 2000.

Tableau B

**Principales caractéristiques de la consommation médicamenteuse
des adhérents, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ,
7 juin 1998 et 11 juin 2000**

ADHÉRENTS	7 juin 1998	11 juin 2000
Nombre de personnes assurées¹	1 425 602	1 613 480
Répartition des personnes assurées¹		
Pourcentage hommes	47,7	47,5
Pourcentage femmes	52,3	52,5
Pourcentage 0-19 ans	24,8	25,1
Pourcentage 20-34 ans	26,3	26,0
Pourcentage 35-49 ans	24,5	25,4
Pourcentage 50-64 ans	24,4	23,5
Nombre de personnes participantes²	346 536	410 714
Pourcentage de personnes participantes²	24,3	25,5
Répartition des personnes participantes³		
Pourcentage hommes	29,8	30,7
Pourcentage femmes	70,2	69,3
Pourcentage 0-19 ans	10,4	10,5
Pourcentage 20-34 ans	19,3	19,1
Pourcentage 35-49 ans	20,1	21,2
Pourcentage 50-64 ans	50,2	49,2
Nombre d'ordonnances actives⁴	688 602	876 525
Pourcentage de personnes participantes ayant³		
De 1 à 4 ordonnances actives	93,4	91,3
De 5 à 9 ordonnances actives	6,3	8,1
10 ordonnances actives ou plus	0,3	0,6
Nombre moyen d'ordonnances actives⁴		
Par personne assurée	0,5	0,5
Par personne participante	2,0	2,1
Homme	2,0	2,2
Femme	2,0	2,1
0-19 ans	1,3	1,3
20-34 ans	1,3	1,3
35-49 ans	1,8	1,9
50-64 ans	2,5	2,8

¹ Tableau 1, annexes 4 et 5.

² Tableau 2, annexes 4 et 5.

³ Tableau 5, annexes 4 et 5.

⁴ Tableau 3, annexes 4 et 5.

3.2 Adhérents participants


Le 11 juin 2000, 410 714 adhérents ont au moins une ordonnance active, soit 25,5% de l'ensemble de ceux qui ont été retenus aux fins de l'étude. Ce taux se situe à 16,5% chez les hommes et à 33,6% chez les femmes. Le pourcentage de participation

augmente avec l'âge; il est de 10,7% chez les 19 ans ou moins et de 53,3% chez les 50 à 64 ans (tableau 2, annexe 4; graphique 12). Le pourcentage d'adhérents participants le 7 juin 1998 (24,3%) était semblable à celui du 11 juin 2000 (25,5%) (tableau B).

Graphique 12

Pourcentage de participation des adhérents selon le groupe d'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

■ 9 juin 1996
 ■ 7 juin 1998
 ■ 11 juin 2000



Le 11 juin 2000, 69,3% des participants sont des femmes. Les participants se répartissent comme suit: 10,5% ont 19 ans ou moins; 19,1%, ont 20 à

34 ans; 21,2%, ont 35 à 49 ans; 49,2%, ont 50 à 64 ans. La répartition était semblable le 7 juin 1998 (tableau B).

3.2.1 Répartition selon le nombre d'ordonnances actives


Le 11 juin 2000, la moitié (50,3%) des participants dispose d'une seule ordonnance active, tandis que 8,7% en possèdent cinq ou plus. Un pourcentage à

peine plus élevé de femmes (50,9%) que d'hommes (49,0%) ont une seule ordonnance active; la situation s'inverse pour cinq ordonnances ou plus, soit 8,6% chez les femmes et 9,0% chez les hommes (tableau 5, annexe 4; graphique 13).

Graphique 13

Répartition des adhérents participants selon le nombre d'ordonnances actives et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

- Hommes
- Femmes
- Tous



Le 7 juin 1998, les adhérents disposaient d'une seule ordonnance active dans une proportion de 52,5%, alors que 6,6% en présentaient cinq ou plus. Le pourcentage d'adhérents participants

ayant dix ordonnances ou plus est passé de 0,3% le 7 juin 1998 à 0,6% le 11 juin 2000 (tableau 5, annexes 4 et 5).

3.2.2 Répartition selon le nombre de prescripteurs et de pharmaciens

Le 11 juin 2000, 82,8 % des adhérents participants se procurent leurs ordonnances d'un seul prescripteur; 14,3 % de deux prescripteurs; 2,4 % de trois; 0,6 % de quatre prescripteurs ou plus (tableau 11, annexe 4). La presque totalité d'entre eux (97,1 %) obtiennent ainsi leurs ordonnances de un ou deux prescripteurs. Le 7 juin 1998, 83,4 % des participants avaient des ordonnances rédigées par un seul prescripteur et seulement 0,5 % par quatre prescripteurs ou plus (tableau 11, annexe 5).

Le 11 juin 2000, le pourcentage d'adhérents participants ayant un seul prescripteur diminue à mesure que le nombre d'ordonnances actives augmente. Ainsi, parmi les participants qui disposent de deux ordonnances, 76,7 % les reçoivent d'un seul prescripteur comparativement à 24,4 % des adhérents qui en disposent de dix ou plus (tableau 11, annexe 4).

Le 11 juin 2000, la majorité des adhérents participants (96,8 %) se sont procurés leurs ordonnances actives chez un seul pharmacien, 3,1 %, chez deux pharmaciens, 0,1 %, chez trois et une proportion négligeable, chez quatre pharmaciens ou plus (tableau 12, annexe 4). La situation était identique le 7 juin 1998 (tableau 12, annexe 5).

Le 11 juin 2000, le pourcentage des adhérents participants s'étant procuré leurs ordonnances d'un seul pharmacien diminue légèrement à mesure que le nombre d'ordonnances augmente. Ainsi, 97,2 % des adhérents participants disposant de une à quatre ordonnances les reçoivent d'un seul pharmacien par rapport à 92,3 % chez ceux en ayant cinq ou plus (tableau 12, annexe 4).

3.2.3 Répartition selon la région sociosanitaire

Les résultats relatifs aux régions du Nunavik, des Terres-Cries-de-la-Baie-James et du Nord-du-Québec sont fournis dans les tableaux 4, 6 et 10 (annexes 4 et 5), mais ils sont exclus de l'analyse parce que ces trois régions comptent un trop petit nombre de personnes assurées.

Le 11 juin 2000, les plus hauts pourcentages de participation se retrouvent dans les régions de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (31,9 %), du Saguenay-Lac-St-Jean (30,2 %) et de Québec (29,9 %); le plus faible pourcentage s'observe dans la région de Montréal-Centre (21,6 %). La région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est celle où le pourcentage d'adhérents présentant cinq ordonnances actives ou plus est le plus haut (3,1 %); le plus bas pourcentage se trouvant dans la région de Montréal-Centre (1,8 %) (tableau 4, annexe 4). Le 7 juin 1998, les régions de Québec (28,8 %) et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (28,5 %) présentaient toujours les pourcentages les plus élevés de participants, alors que la région de Montréal-Centre présentait le plus faible pourcentage (21,4 %) (tableau 4, annexe 5).

3.3 Adhérents répartis selon les classes de médicaments


Dans la présente section, les pourcentages des adhérents participants (ayant au moins une ordonnance active), par rapport au nombre d'adhérents assurés, sont présentés par classes, sous-classes et sous-sous-classes de médicaments. Le lecteur trouvera une description des indications thérapeutiques et cliniques des médicaments faisant partie de certaines classes à l'annexe 9.

Les classes de médicaments où l'on retrouve le plus fort pourcentage de participation chez les adhérents sont, en ordre d'importance, celles des hormones et substituts (13,4 %), les médicaments du SNC (8,2 %) et les médicaments cardiovasculaires (7,7 %). Les électrolytes-diurétiques (2,5 %), les médicaments gastro-intestinaux (1,8 %), les anti-infectieux (1,7 %) et les médicaments du SNA (1,5 %) suivent avec un plus faible pourcentage (tableau 7, annexe 4). Le 7 juin 1998, l'ordre d'importance des classes était le même pour les quatre premières classes de médicaments (tableau 7, annexe 5; graphique 14).

Graphique 14

Pourcentage d'adhérents assurés ayant au moins une ordonnance active selon les principales classes de médicaments, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998 et 11 juin 2000

■ 7 juin 1998
 ■ 11 juin 2000




Le 11 juin 2000, un pourcentage plus élevé de femmes que d'hommes ont au moins une ordonnance active dans la majorité des classes et sous-classes, à l'exception des sous-classes des hypolipémiants, des vasodilatateurs et des hypoglycémifiants

(tableau 7, annexe 4; graphique 15). Le 7 juin 1998, le pourcentage de femmes se révélait également plus élevé que celui des hommes dans la presque totalité des classes (tableau 7, annexe 5).

Graphique 15

Pourcentage d'adhérents assurés ayant au moins une ordonnance active selon les principales classes de médicaments et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

■ Hommes
 ■ Femmes
 ■ Tous




3.3.1 Hormones et substituts

Le 11 juin 2000, 13,4% des adhérents assurés ont au moins une ordonnance active d'hormones et substituts. Chez les femmes, ce pourcentage s'élève à 22,4% tandis qu'il est à 3,3% chez les hommes. Les pourcentages les plus élevés se retrouvent chez les femmes du groupe d'âge de 50 à 64 ans (43,5%) et dans celui de 20 à 34 ans

(23,3%) (tableau 7, annexe 4). Le 7 juin 1998, le pourcentage d'assurés présentant au moins une ordonnance active dans cette classe atteignait 12,8%. Les pourcentages de participation selon les différentes sous-classes étaient d'un ordre de grandeur similaire à ceux observés le 11 juin 2000 (tableau 7, annexe 5; graphique 16).

Graphique 16



«Autres hormones et substituts»

Le 11 juin 2000, 5,5% des adhérents ont au moins une ordonnance du regroupement «Autres hormones et substituts», principalement constitué des estrogènes et des progestatifs. Leur usage s'adresse

presque exclusivement aux femmes, soit 10,4% contre 0,1% chez les hommes; le pourcentage le plus élevé correspondant à celles âgées de 50 à 64 ans (34,2%) (tableau 7, annexe 4).

Anovulants

Le 11 juin 2000, les anovulants sont utilisés par 20,4% des femmes du groupe d'âge 20 à 34 ans et par 3,4% du groupe des 35 à 49 ans. Le faible pourcentage observé chez les 19 ans ou moins (7,0%) est attribuable au fait que les enfants sont aussi inclus dans ce groupe d'âge; ceux-ci étant peu susceptibles d'utiliser des anovulants (tableau 7, annexe 4).

Thyroïdiens

Le 11 juin 2000, 2,7% des adhérents assurés ont au moins une ordonnance d'un médicament de cette classe. Le pourcentage chez les femmes (4,4%) est plus de cinq fois supérieur à celui observé chez les hommes (0,8%). Les pourcentages augmentent avec l'âge; 0,2% chez les 19 ans ou moins comparativement à 7,6% chez les 50 à 64 ans. Le pourcentage noté chez les femmes âgées de 50 à 64 ans s'élève à 11,5% (tableau 7, annexe 4).

Hypoglycémiantes

Le 11 juin 2000, 1,5% des adhérents assurés ont au moins une ordonnance d'hypoglycémiantes, soit

1,7% d'hommes et 1,3% de femmes. Le pourcentage s'élève avec l'âge; il est de 0,1% chez les 19 ans ou moins et de 4,8% chez les 50 à 64 ans (tableau 7, annexe 4).

3.3.2 Médicaments du système nerveux central (SNC)


Le 11 juin 2000, 8,2% des adhérents assurés ont au moins une ordonnance active pour un médicament du SNC. Le pourcentage est plus élevé chez les femmes (9,6%) que chez les hommes (6,7%) de même que dans les groupes plus âgés, soit 20,2% des 50 à 64 ans par rapport à 1,9% des 19 ans ou moins. Le pourcentage le plus haut (22,6%) se retrouve chez les femmes de 50 à 64 ans (tableau 7, annexe 4). Le 7 juin 1998, 7,2% des adhérents assurés avaient au moins une ordonnance de ces médicaments. Les pourcentages selon les sous-classes des médicaments du SNC varient peu entre le 7 juin 1998 et le 11 juin 2000 (tableau 7, annexe 5; graphique 17).

Graphique 17

Pourcentage d'adhérents assurés ayant au moins une ordonnance active selon les principales sous-classes des médicaments du système nerveux central (SNC), régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998 et 11 juin 2000

■ 7 juin 1998

□ 11 juin 2000



Anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques

Le 11 juin 2000, 3,2% des adhérents présentent une ordonnance pour un médicament de la sous-classe des anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques. C'est dans la sous-sous-classe des benzodiazépines que l'on retrouve la presque totalité de ceux-ci (3,1%). Le pourcentage chez les femmes est de 4,1% et celui chez les hommes est de 2,0%; cet écart est observé dans tous les groupes d'âge adulte. La proportion des utilisateurs s'accroît avec l'âge; de 0,1% chez les 19 ans ou moins, elle passe à 9,0% chez les 50 à 64 ans. On retrouve le pourcentage le plus élevé (11,3%) chez les femmes de 50 à 64 ans (tableau 7, annexe 4).

Analgsiques et antipyrétiques

Le 11 juin 2000, 3,2% des adhérents présentent au moins une ordonnance de médicament de la sous-classe des analgsiques et antipyrétiques. La presque totalité de ceux-ci (3,0%) présentent une ordonnance de la sous-sous-classe des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), comprenant l'aspirine; le plus haut taux de participation se retrouvant dans le groupe d'âge des 50 à 64 ans avec 9,3% (tableau 7, annexe 4).

Psychotropes

Le 11 juin 2000, 2,9% des adhérents assurés ont au moins une ordonnance de psychotropes, sous-classe qui comprend les antidépresseurs et les tranquillisants. Le pourcentage de femmes (3,9%) présentant au moins une ordonnance de cette sous-classe s'avère plus du double de celui des hommes (1,8%) (tableau 7, annexe 4).

Antidépresseurs

Le 11 juin 2000, 2,6% des adhérents assurés ont au moins une ordonnance d'antidépresseurs. Les

pourcentages s'élèvent avec l'âge: ils passent de 0,3% chez les 19 ans ou moins à 5,1% chez les 50 à 64 ans. Le pourcentage chez les femmes (3,6%) est plus de deux fois supérieur à celui chez les hommes (1,5%). Cette observation s'applique à tous les groupes d'âge. Le pourcentage le plus élevé se retrouve chez les femmes de 50 à 64 ans (6,7%) (tableau 7, annexe 4).

Tranquillisants

Le 11 juin 2000, les tranquillisants sont utilisés par 0,4% des adhérents tant chez les hommes que chez les femmes. Le groupe des 50 à 64 ans présente le pourcentage le plus élevé (0,8%) (tableau 7, annexe 4).


3.3.3 Médicaments cardiovasculaires

Le 11 juin 2000, 7,7% des adhérents assurés ont au moins une ordonnance active de médicaments de cette classe, dont un pourcentage légèrement plus élevé de femmes (8,2%) que d'hommes (7,1%). Les pourcentages augmentent avec l'âge: il passe de 0,2% chez les 19 ans ou moins à 26,1% chez les 50 à 64 ans. Les adhérents assurés ont au moins une ordonnance d'antihypertenseurs, d'hypolipémifiants ou de cardiotropes dans des proportions semblables soit 3,7%, 3,4% et 3,3% respectivement; les pourcentages de participation les plus élevés pour ces sous-classes concernant le groupe des 50 à 64 ans, soit 13,0%, 11,9% et 11,6% respectivement (tableau 7, annexe 4). Le 7 juin 1998, 7,0% des adhérents assurés avaient au moins une ordonnance de médicaments cardiovasculaires. Les pourcentages de participation pour les sous-classes des antihypertenseurs (3,0%) et des hypolipémifiants (2,7%) étaient plus faibles que les pourcentages observés le 11 juin 2000, soit 3,7% et 3,4% respectivement (tableau 7, annexes 5 et 4; graphique 18).

Graphique 18

Pourcentage d'adhérents assurés ayant au moins une ordonnance active selon les sous-classes des médicaments cardiovasculaires, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998 et 11 juin 2000

■ 7 juin 1998
■ 11 juin 2000



Sous-classes des médicaments cardiovasculaires

3.3.4 Médicaments gastro-intestinaux

Le 11 juin 2000, 1,8 % des adhérents assurés ont au moins une ordonnance de médicaments gastro-intestinaux, dont 2,1 % des femmes et 1,5 % des hommes. Les pourcentages augmentent avec l'âge : ils passent de 0,2 % chez les 19 ans ou moins à 4,9 % chez les 50 à 64 ans. C'est chez les femmes du groupe d'âge de 50 à 64 ans que l'on observe le plus fort pourcentage (5,5 %). Les anti-ulcéreux se retrouvant chez 1,6 % des adhérents, ils constituent les médicaments les plus utilisés de cette classe (tableau 7, annexe 4).

3.3.5 Anti-infectieux

Le 11 juin 2000, 1,7 % des adhérents assurés ont au moins une ordonnance d'anti-infectieux. Le pourcentage le plus élevé (2,1 %) se trouve dans le groupe des 19 ans ou moins (tableau 7, annexe 4).

3.3.6 Médicaments du système nerveux autonome (SNA)

Le 11 juin 2000, 1,5 % des adhérents assurés ont au moins une ordonnance de médicaments du SNA,

soit 1,6 % des femmes et 1,4 % des hommes; 1,1 % des adhérents ayant une ordonnance de la sous-classe des sympathomimétiques (tableau 7, annexe 4).

3.4 Ordonnances actives

Le 11 juin 2000, 894 727 ordonnances actives ont été dénombrées, mais 18 202 ont été éliminées⁷ pour éviter le double décompte en raison de renouvellements hâtifs. Les résultats obtenus en cette journée portent donc sur 876 525 ordonnances actives (tableau B). Le 7 juin 1998, le nombre d'ordonnances actives retenues s'élevait à 688 602, 17 198 ayant été éliminées.

Le nombre moyen d'ordonnances actives par adhérent assuré s'élève à 0,5 le 11 juin 2000. Il est de 0,7 chez les femmes et de 0,4 chez les hommes. Il augmente avec l'âge, puisqu'il passe de 0,1 chez les 19 ans ou moins à 1,5 chez les 50 à 64 ans (tableau 3, annexe 4).

Le nombre moyen d'ordonnances actives par participant est de 2,1 et se révèle similaire chez les hommes (2,2) et les femmes (2,1). Il augmente

⁷ Voir la section 1.4.

avec l'âge : il passe de 1,3 chez les 19 ans ou moins à 2,8 chez les 50 à 64 ans (tableau 3, annexe 4).

Le 7 juin 1998, le nombre moyen d'ordonnances actives était de 0,5 par adhérent assuré et de 2,0 par participant (tableau B).


Le 11 juin 2000, plus des trois quarts des ordonnances actives se retrouvent dans trois classes de médicaments. Elles se répartissent ainsi : hormones

et substituts (32,4%), médicaments du SNC (21,8%), médicaments cardiovasculaires (21,5%). Les pourcentages observés concernant les médicaments électrolytes-diurétiques et gastro-intestinaux sont respectivement de 5,1% et de 3,7% (tableau 8, annexe 4). Le 7 juin 1998, les trois principales classes de médicaments étaient les mêmes et leurs pourcentages respectifs, 34,4%, 20,8% et 20,9%, étaient semblables (tableau 8, annexe 5; graphique 19).

Graphique 19

Pourcentage des ordonnances actives chez les adhérents participants selon les principales classes de médicaments, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998 et 11 juin 2000

■ 7 juin 1998
 ■ 11 juin 2000




Le 11 juin 2000, 32,3% des ordonnances répertoriées chez les hommes se rapportent aux médicaments cardiovasculaires et 26,0%, aux médicaments du SNC. Chez les femmes, ces pourcentages sont de 16,6% et 19,9% respectivement. Chez les femmes,

41,6% des ordonnances actives sont pour des médicaments de la classe des hormones et substituts. Ce pourcentage représente plus du triple de celui observé chez les hommes (12,3%) (tableau 8, annexe 4; graphique 20).

Graphique 20

Répartition des ordonnances actives des adhérents participants selon les classes de médicaments et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

-  Hormones et substituts
-  SNC
-  Cardiovasculaires
-  Électrolytes-diurétiques
-  Gastro-intestinaux
-  Anti-infectieux
-  SNA
-  Autres classes



4 - COMPARAISON DES RÉSULTATS RELATIFS AUX PRESTATAIRES D'ASSISTANCE-EMPLOI ET AUX ADHÉRENTS, 11 JUIN 2000

4.1 Population assurée

Le 11 juin 2000, 571 166 prestataires d'assistance-emploi et 1 613 480 adhérents ont été retenus pour l'étude. La répartition selon le sexe est sensiblement la même dans les deux catégories de personnes assurées, mais, en ce qui concerne l'âge, elle présente des différences. Le pourcentage de personnes

assurées de 19 ans ou moins est effectivement plus élevé chez les prestataires (30,0%) que chez les adhérents (25,1%) (tableau C). Cependant, le groupe d'âge des 20 à 34 ans représente 26,0% des adhérents comparativement à 20,9% des prestataires (tableau C).

Tableau C

Comparaison des principales caractéristiques de la consommation médicamenteuse des prestataires d'assistance-emploi et des adhérents, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Le 11 juin 2000	Prestataires d'assistance-emploi	Adhérents
Nombre de personnes assurées¹	571 166	1 613 480
Répartition des personnes assurées¹		
Pourcentage hommes	48,4	47,5
Pourcentage femmes	51,6	52,5
Pourcentage 0-19 ans	30,0	25,1
Pourcentage 20-34 ans	20,9	26,0
Pourcentage 35-49 ans	27,6	25,4
Pourcentage 50-64 ans	21,5	23,5
Nombre de personnes participantes²	186 526	410 714
Pourcentage de personnes participantes²	32,7	25,5
Répartition des personnes participantes³		
Pourcentage hommes	38,7	30,7
Pourcentage femmes	61,3	69,3
Pourcentage 0-19 ans	10,9	10,5
Pourcentage 20-34 ans	16,7	19,1
Pourcentage 35-49 ans	32,5	21,2
Pourcentage 50-64 ans	39,9	49,2
Nombre d'ordonnances actives⁴	597 680	876 525
Pourcentage de personnes participantes ayant³		
De 1 à 4 ordonnances actives	76,5	91,3
De 5 à 9 ordonnances actives	20,1	8,1
Dix ordonnances actives ou plus	3,4	0,6
Nombre moyen d'ordonnances actives⁴		
Par personne assurée	1,1	0,5
Par personne participante	3,2	2,1
Homme	3,2	2,2
Femme	3,2	2,1
0-19 ans	1,4	1,3
20-34 ans	2,1	1,3
35-49 ans	3,2	1,9
50-64 ans	4,2	2,8

¹ Tableau 1, annexes 1 et 4.³ Tableau 5, annexes 1 et 4.² Tableau 2, annexes 1 et 4.⁴ Tableau 3, annexes 1 et 4.

4.2 Population participante

Le 11 juin 2000, 32,7 % des prestataires d'assistance-emploi assurés ont au moins une ordonnance active comparativement à 25,5 % des adhérents assurés. Le pourcentage de participation augmente avec l'âge et il est plus élevé chez les prestataires que chez les adhérents dans tous les groupes d'âge sauf dans le groupe d'âge de 50 à 64 ans. La différence est plus prononcée et s'observe chez les personnes de 35 à 49 ans, alors que 38,6 % des prestataires ont au moins une ordonnance active contre 21,2 % des adhérents (tableau 2, annexes 1 et 4).

La répartition des participants selon le sexe varie d'après la catégorie de personnes assurées. Chez les femmes, le pourcentage de participation est de 69,3 % chez les adhérents comparativement à 61,3 % chez les prestataires. Dans le groupe d'âge des 50 à 64 ans le pourcentage de participation est plus élevé chez les adhérents (49,2 %) que chez les prestataires (39,9 %) (tableau C).

4.2.1 Répartition selon le nombre d'ordonnances actives

Le 11 juin 2000, un plus grand pourcentage d'adhérents ont une seule ordonnance active (50,3 %) comparativement aux prestataires (33,9 %). Le pourcentage de participants présentant cinq ordonnances ou plus est près de trois fois plus élevé chez les prestataires (23,5 %) que chez les adhérents (8,7 %) (tableau 5, annexes 1 et 4).

4.2.2 Répartition selon le nombre de prescripteurs et de pharmaciens

Le 11 juin 2000, chez les adhérents, 82,8 % des participants ont un seul prescripteur par rapport à 74,5 % chez les prestataires. Quant à la répartition selon le nombre de pharmaciens, elle présente peu de différences entre les deux catégories de personnes assurées (tableau D).

Tableau D

Répartition des prestataires d'assistance-emploi et des adhérents participants selon le nombre de prescripteurs et de pharmaciens, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

PRESCRIPTEURS ET PHARMACIENS	Prestataires d'assistance-emploi (%)	Adhérents (%)
Nombre de prescripteurs		
1	74,5	82,8
2	19,4	14,3
3	4,6	2,4
4 ou plus	1,5	0,6
Nombre de pharmaciens		
1	94,8	96,8
2	4,9	3,1
3	0,3	0,1
4 ou plus	*	*


*: Trop petit pour être exprimé

4.3 Prestataires d'assistance-emploi et adhérents répartis selon les classes de médicaments

Le 11 juin 2000, 19,4 % des prestataires présentent une ordonnance active dans la classe des médicaments du SNC, ce qui en fait la première en

importance d'utilisation chez cette catégorie d'assurés (19,4%). Chez les adhérents, 13,4% de ceux-ci présentent une ordonnance active de la classe des hormones et substituts (tableau 7, annexes 1 et 4; graphique 21).

Graphique 21



Chez les prestataires, les pourcentages d'utilisation dans plusieurs classes de médicaments se révèlent plus élevés que chez les adhérents. C'est le cas, entre autres, pour les médicaments du SNC (particulièrement les benzodiazépines, les antidépresseurs,

les tranquillisants et les anticonvulsivants), les hypoglycémiant, les médicaments du SNA et les médicaments gastro-intestinaux (tableau 7, annexes 1 et 4; tableau E).

Tableau E

Pourcentage de prestataires d'assistance-emploi et d'adhérents assurés ayant au moins une ordonnance active selon certaines classes, sous-classes et sous-sous-classes de médicaments, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

CLASSES, SOUS-CLASSES ET SOUS-SOUS-CLASSES DE MÉDICAMENTS	Prestataires d'assistance-emploi (%)	Adhérents (%)
Médicaments du SNC	19,4	8,2
benzodiazépines	9,8	3,1
antidépresseurs	6,4	2,6
tranquillisants	4,3	0,4
- anticonvulsivants	2,9	0,6
Hormones et substituts	13,9	13,4
- hypoglycémiant	2,7	1,5
Cardiovasculaires	9,2	7,7
- cardiotropes	4,5	3,3
- hypolipémiants	4,3	3,4
- antihypertenseurs	4,4	3,7
- vasodilatateurs	0,9	0,3
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	5,3	1,5
- sympathomimétiques	2,6	1,1
Médicaments gastro-intestinaux	4,6	1,8

4.3.1 Médicaments du système nerveux central (SNC)

La différence la plus marquante entre les prestataires et les adhérents se situe parmi les personnes assurées présentant au moins une ordonnance active pour des médicaments de la classe du SNC (19,4 % c. 8,2 %). Les prestataires de 20 à 34 ans ont un pourcentage près de quatre fois supérieur à

celui des adhérents (12,1 % contre 3,2 %). Pour ce qui est des prestataires de 35 à 49 ans, le pourcentage s'avère trois fois plus élevé que celui chez les adhérents (26,6 % contre 8,4 %) (tableau 7, annexes 1 et 4; graphique 21).

Une importante différence est observée dans le groupe des 20 à 34 ans qui utilisent des benzodiazépines. En effet, les prestataires présentent un

pourcentage de participation sept fois supérieur à celui des adhérents (4,7% contre 0,6%). Le pourcentage de prestataires qui utilisent des antidépresseurs est près de trois fois plus élevé que celui des adhérents (6,4% contre 2,6%). La différence la plus marquée concerne les tranquillisants, le pourcentage de prestataires étant près de dix fois plus élevé que celui des adhérents (4,3% contre 0,4%) (tableau 7, annexes 1 et 4).

Le pourcentage de prestataires ayant au moins une ordonnance de médicaments anticonvulsivants est près de cinq fois supérieur à celui des adhérents (2,9% contre 0,6%) (tableau 7, annexes 1 et 4).

4.3.2 Hormones et substituts

Le pourcentage de personnes assurées ayant au moins une ordonnance d'hormones et substituts s'équivalait chez les prestataires (13,9%) et les adhérents (13,4%) (graphique 21), mais un écart plus important est noté dans le groupe des 35 à 49 ans (12,5% contre 8,0%). Le pourcentage de personnes assurées utilisant des hypoglycémiantes s'avère plus élevé chez les prestataires (2,7%) que chez les adhérents (1,5%). Chez les femmes de 20 à 34 ans, les anovulants sont utilisés dans une moins grande proportion chez les prestataires que chez les adhérentes (13,0% contre 20,4%) (tableau 7, annexes 1 et 4).

4.3.3 Médicaments cardiovasculaires

Le pourcentage de personnes assurées ayant au moins une ordonnance active de médicaments cardiovasculaires est plus élevé chez les prestataires (9,2%) que chez les adhérents (7,7%). Il en va de même dans tous les groupes d'âge adultes et dans toutes les sous-classes (tableau E; graphique 21).

4.3.4 Médicaments du système nerveux autonome (SNA)

Le pourcentage de personnes assurées ayant au moins une ordonnance de médicaments du SNA est plus de trois fois supérieur chez les prestataires (5,3%) que chez les adhérents (1,5%). La différence la plus importante touche le groupe des 35 à 49 ans qui présente un pourcentage plus de cinq fois supérieur chez les prestataires (7,2%) que chez les adhérents (1,3%) (tableau 7, annexes 1 et 4; tableau E; graphique 21).

4.3.5 Médicaments gastro-intestinaux

Le pourcentage de prestataires assurés ayant au moins une ordonnance de médicaments gastro-intestinaux est plus de deux fois supérieur à celui des adhérents (4,6% contre 1,8%). Des différences sont observées dans presque tous les groupes d'âge. Le pourcentage chez les 35 à 49 ans est trois fois plus élevé chez les prestataires que chez les adhérents (5,7% contre 1,7%) (tableau 7, annexes 1 et 4; graphique 21).



4.4 Ordonnances actives

Le 11 juin 2000, le nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante est plus élevé chez les prestataires (3,2) que chez les adhérents (2,1). Le nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée pour les prestataires (1,1) s'avère plus du double de celui des adhérents (0,5). Chez ces deux catégories de personnes assurées, les moyennes augmentent avec l'âge (tableau 3, annexes 1 et 4).

Chez les prestataires, 39,2% des ordonnances concernent des médicaments du SNC et 18,8%, des médicaments de la classe hormones et substituts. Chez les adhérents, 32,4% des ordonnances sont pour des médicaments de cette dernière classe alors que 21,8% sont pour des médicaments du SNC (tableau 8, annexes 1 et 4; graphique 22).

Graphique 22

Répartition des ordonnances actives des personnes participantes selon les classes de médicaments et la catégorie de personnes assurées, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000



5 - DISCUSSION

5.1 Limites de l'étude

Dans cette étude, il n'est fait état ni des ordonnances rédigées par des médecins et non délivrées par des pharmaciens, ni des médicaments prescrits et consommés lors d'un séjour à l'hôpital, ni des médicaments prescrits ou en vente libre non assurés par la RAMQ. Elle inclut par ailleurs toutes les ordonnances facturées à la RAMQ. Bien que nous ne sachions pas si ces médicaments ont été vraiment consommés, il est probable qu'ils le furent.

La consommation médicamenteuse pour chacune des journées à l'étude ne doit pas être considérée comme représentative de celle de n'importe quelle autre journée de l'année. L'important était d'évaluer, au fil des années, les données relatives à une même période pour éviter, entre autres, que les variations saisonnières viennent rendre plus difficiles ces comparaisons. Pour représenter la consommation quotidienne moyenne d'une année, il aurait fallu retenir une autre méthodologie. Or, l'atteinte de cet objectif aurait nécessité de prélever de nombreux échantillons aléatoires sur autant de groupes de personnes assurées par la RAMQ d'une façon continue au cours des mois ayant précédé chacune des dates cibles. Ce choix aurait alourdi indûment les travaux, sans ajouter d'intérêt à l'analyse.

L'utilisation de la classification AHFS empêche parfois d'associer un problème de santé unique à une classe ou sous-classe de médicaments. Des médicaments utilisés pour une même maladie peuvent en effet provenir de différentes classes ou sous-classes ou encore une classe peut regrouper des médicaments pour diverses conditions. Malgré tout, la classification retenue aux fins de l'étude permet de présumer certaines caractéristiques de l'état de santé des groupes de personnes assurées.

Les 2 184 646 personnes à l'étude le 11 juin 2000 représentent la grande majorité de la population de 64 ans ou moins (95 %) inscrite au régime d'assurance médicaments qu'administre la RAMQ.

Le 7 juin 1998, 96 % des personnes de 64 ans ou moins admissibles au régime ont été retenues et 99 % des prestataires l'ont été le 9 juin 1996.

Il ne faut toutefois pas généraliser les résultats obtenus à l'ensemble de la population québécoise. En 2000, les personnes de 64 ans ou moins assurées par la RAMQ représentaient 36 %⁸ de l'ensemble de la population de ce groupe d'âge ; il est possible que certaines caractéristiques diffèrent selon l'âge et le revenu.

Bien qu'il soit plausible que la consommation médicamenteuse des adhérents se rapproche de celle des personnes assurées dans le secteur privé, aucune donnée n'est disponible présentement pour arriver à une telle conclusion. Notons que les adhérents au régime général d'assurance médicaments s'y sont inscrits graduellement à la suite de son implantation le 1^{er} janvier 1997. On a présumé que leur approvisionnement en médicaments s'était stabilisé au cours des trois mois précédant le 7 juin 1998.

Par ailleurs, réunir les personnes assurées de 19 ans ou moins en un seul groupe rend difficile l'énoncé d'hypothèses concernant la consommation de certains médicaments. Une subdivision entre enfants et adolescents aurait permis d'apporter plus de précisions à ce sujet.

5.2 Interprétation des résultats

Les résultats de l'actuel portrait quotidien permettent d'observer des tendances ainsi que de constater certaines différences dans la consommation des médicaments chez deux catégories d'assurés : les prestataires de l'assistance emploi et les adhérents.

L'élévation importante de nombreux paramètres de mesure de la consommation médicamenteuse chez les prestataires entre le 9 juin 1996 et le 11 juin 2000 peut être attribuable à la combinaison de certains facteurs. Bien que les deux catégories

⁸ Calculs effectués avec les données des Statistiques annuelles 2000 de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

de personnes assurées aient le même âge, les résultats obtenus viennent supporter l'hypothèse d'une santé plus fragile chez les prestataires. Les prestataires utilisent en proportion plus élevée des antidépresseurs, des tranquillisants, des benzodiazépines, des médicaments du système gastro-intestinal ainsi que des hypoglycémifiants. Par ailleurs, les résultats plus élevés chez les prestataires relativement au pourcentage de participation, au nombre moyen d'ordonnances actives par personne ainsi qu'au pourcentage de participants ayant reçu cinq ordonnances ou plus peuvent aussi être expliqués par cet écart de santé.

Par contre, l'augmentation de 1996 à 2000 du pourcentage de participation des prestataires doit être interprétée avec prudence. Les différences observées peuvent être en partie liées à diverses caractéristiques sanitaires des sujets à l'étude plutôt qu'à l'évolution réelle de la consommation médicamenteuse. En effet, le MESS fait état d'un poids plus important de prestataires présentant des contraintes sévères à l'emploi en 2000-2001 qu'en 1998-1999 (28,5% contre 24,5%) (7). En revanche, la baisse de la consommation médicamenteuse observée dans certaines classes de médicaments (analgésiques et antipyrétiques, anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques) entre le 9 juin 1996 et le 7 juin 1998 serait due en partie à l'introduction d'une participation financière par les prestataires lors de l'implantation du régime général d'assurance médicaments (10).

D'autre part, l'impact de l'évolution des pratiques thérapeutiques, comme l'augmentation de l'utilisation de médicaments pour prévenir et traiter certains problèmes de santé ainsi que l'apparition de nouvelles indications dans le traitement et la prévention de certaines conditions de santé peuvent contribuer à l'augmentation de la consommation des médicaments de même que le vieillissement de la population en général. En effet, à mesure qu'on avance en âge, la fréquence de nombreux problèmes de santé s'élève aussi (2). Ceci se traduit dans cette étude par des augmentations de

l'utilisation de la plupart des classes de médicaments. Il s'agit entre autres des médicaments cardiovasculaires, des analgésiques, des psychotropes, des benzodiazépines et des hormones. Cependant, l'effet du vieillissement à l'intérieur de chacun des groupes d'âge n'a pas été vérifié dans cette étude.

Chez les deux catégories d'assurés, le pourcentage de participation est plus élevé chez les femmes que chez les hommes bien que le nombre moyen d'ordonnances actives par participant soit à peu près identique pour les deux sexes. Même si ce pourcentage de participation s'explique en partie par l'usage courant d'anovulants et d'hormones chez les femmes, les proportions plus élevées de celles qui utilisent d'autres médicaments laissent entrevoir des problèmes de santé particuliers. Ainsi, la proportion élevée de femmes qui prennent, entre autres, des médicaments cardiovasculaires, des benzodiazépines et des antidépresseurs peut être attribuée à des conditions de santé liées au milieu socio-économique ou à l'hygiène de vie. Le recours plus fréquent aux professionnels de la santé dans le traitement curatif et préventif de certaines conditions de santé pourrait être un facteur explicatif (9). Il est aussi possible que certains professionnels de la santé aient des approches différentes quant aux traitements prescrits aux femmes. Les diverses hypothèses émises sur la consommation médicamenteuse particulière des femmes méritent d'être explorées davantage.

Les résultats relatifs à certaines classes de médicaments sont difficilement interprétables. À titre d'exemple, les résultats relatifs à la classe des anti-infectieux doivent être commentés avec prudence, car les variations saisonnières influent sur la prise de ces médicaments contrairement à la plupart des médicaments des autres classes.

La majorité des ordonnances actives sont rédigées par un seul prescripteur et dispensées dans une seule pharmacie. Ceci reflète une certaine fidélité des assurés quant aux professionnels consultés quoique les prestataires se révèlent un peu plus

enclins à visiter plus d'un prescripteur et plus d'un pharmacien. Cependant, les données disponibles ne permettent pas de savoir si ces prescripteurs exercent leur profession dans une même clinique

médicale ou un même établissement et de ce fait partagent le même dossier médical du patient.

CONCLUSION

Les résultats de l'actuel portrait quotidien permettent de suivre les tendances et apportent un éclairage nouveau sur la consommation médicamenteuse des prestataires d'assistance-emploi et des adhérents. Ils soulèvent par ailleurs de nombreuses questions quant à l'utilisation des médicaments; plusieurs avenues mériteraient d'être explorées notamment les différences observées chez les femmes pour certaines classes de médicaments.

Comme cette étude présente des indicateurs de consommation d'un point de vue quantitatif, une analyse qualitative des ordonnances actives sera effectuée dans une prochaine étude. Cette étude couvrira notamment les interactions médicamenteuses à risque et les duplications thérapeutiques questionnables.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- 1- Régie de l'assurance maladie du Québec. Statistiques annuelles 2000. Section Le Régime d'assurance médicaments. Québec: Gouvernement du Québec. 2000; 227 p.
- 2- Papillon MJ, Laurier C, Barnard L, Baril J. Chapitre 22 «Consommation de médicaments» dans: Institut de la statistique du Québec (ISQ). Enquête sociale et de santé 1998. ISQ, Gouvernement du Québec. 2000; 445-60.
- 3- Régie de l'assurance maladie du Québec. Portrait quotidien de la consommation médicamenteuse des personnes âgées non hébergées. Québec: Gouvernement du Québec. 2001; 87 p.
- 4- Régie de l'assurance maladie du Québec. Rapport du comité d'analyse de la consommation médicamenteuse des personnes âgées. Québec: Gouvernement du Québec. Juin 1992; 181 p.
- 5- Régie de l'assurance maladie du Québec. Liste de médicaments. Québec: Gouvernement du Québec. 1996, 1998, 2000.
- 6- McEvoy GK, et al (eds.). American Hospital Formulary Service, Drug Information 2000. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists; 2000: ix-xi.
- 7- Boucher J, Bernard J. Rapport statistique sur les prestataires du programme d'assistance-emploi Août 2001. Direction de la recherche, de l'évaluation et de la statistique. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Novembre 2001; 23 p.
- 8- Martin P. Les mouvements de la clientèle de l'assurance médicaments à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Service de la recherche et de l'analyse des programmes. Régie de l'assurance maladie du Québec. Juillet 2001; 6 p.
- 9- Fournier MA, Piché J. Chapitre 19 «Recours aux services des professionnels de la santé et des services sociaux» dans: Institut de la statistique du Québec (ISQ). Enquête sociale et de santé 1998. ISQ, Gouvernement du Québec. 2000; 387-407.
- 10- Tamblyn R. Évaluation de l'impact du régime général d'assurance médicaments. Rapport présenté au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Mars 1999.

ANNEXE 1

Tableaux relatifs à la consommation médicamenteuse des prestataires d'assistance-emploi inscrits au régime d'assurance médicaments administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), 11 juin 2000

Tableau 1

Répartition des prestataires d'assistance-emploi assurés selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 2

Répartition des prestataires d'assistance-emploi assurés selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 3

Répartition des ordonnances actives chez les prestataires d'assistance-emploi selon le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 4

Principales caractéristiques de la consommation médicamenteuse des prestataires d'assistance-emploi assurés selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 5

Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 6

Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants (%) selon le nombre d'ordonnances actives et la région sociosanitaire et taux d'ordonnances actives pour 1 000 participants selon la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 7

Pourcentage des prestataires d'assistance-emploi assurés ayant au moins une ordonnance active selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 8

Répartition des ordonnances actives chez les prestataires d'assistance-emploi participants selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 9

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 prestataires d'assistance-emploi assurés selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 10

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 prestataires d'assistance-emploi assurés selon les classes de médicaments et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 11

Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de prescripteurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 12

Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de pharmaciens, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 1

Répartition des prestataires d'assistance-emploi assurés selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Région sociosanitaire	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine	6 000	6 077	3 295	2 370	3 425	2 987	12 077 2,1%
Bas-Saint-Laurent	8 534	8 717	4 276	3 272	5 056	4 647	17 251 3,0%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	10 709	11 766	5 842	4 815	6 630	5 188	22 475 3,9%
Québec	22 842	23 234	11 200	9 952	13 606	11 318	46 076 8,1%
Chaudière-Appalaches	8 592	9 567	4 390	3 479	5 135	5 155	18 159 3,2%
Mauricie-Bois-Francs	20 004	21 733	11 345	8 406	11 500	10 486	41 737 7,3%
Estrie	10 558	11 038	6 110	4 462	5 901	5 123	21 596 3,8%
Montréal-Centre	94 798	98 542	62 471	39 970	53 458	37 441	193 340 33,9%
Laval	7 538	9 093	5 428	3 565	4 383	3 255	16 631 2,9%
Laurentides	14 421	15 856	9 072	6 166	8 327	6 712	30 277 5,3%
Lanaudière	12 443	14 018	8 329	5 386	6 984	5 762	26 461 4,6%
Montérégie	35 030	39 381	23 133	15 853	19 519	15 901	74 411 13,0%
Outaouais	12 738	13 656	8 711	5 980	7 133	4 570	26 394 4,6%
Abitibi-Témiscamingue	6 221	6 299	3 786	2 883	3 399	2 452	12 520 2,2%
Côte-Nord	3 438	3 658	2 126	1 719	1 939	1 312	7 096 1,2%
Nord-du-Québec	360	415	245	180	207	143	775 0,1%
Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James	890	929	917	576	211	115	1 819 0,3%
Région indéterminée	1 064	1 007	745	459	560	307	2 071 0,4%
Ensemble du Québec	276 180 48,4%	294 986 51,6%	171 421 30,0%	119 498 20,9%	157 373 27,6%	122 874 21,5%	571 166 100%

Tableau 2

Répartition des prestataires d'assistance-emploi assurés selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

	HOMMES (ANS)					FEMMES (ANS)					HOMMES ET FEMMES (ANS)				
	0-19	20-34	35-49	50-64	Total	0-19	20-34	35-49	50-64	Total	0-19	20-34	35-49	50-64	Total
Aucune ordonnance active	77 595 89,6%	43 567 81,7%	53 472 68,0%	29 322 50,8%	203 956 73,9%	73 527 86,7%	44 879 67,8%	43 192 54,8%	19 086 29,3%	180 684 61,3%	151 122 88,2%	88 446 74,0%	96 664 61,4%	48 408 39,4%	384 640 67,3%
Au moins une ordonnance active	8 998 10,4%	9 758 18,3%	25 114 32,0%	28 354 49,2%	72 224 26,2%	11 301 13,3%	21 294 32,2%	35 595 45,2%	46 112 70,7%	114 302 38,8%	20 299 11,8%	31 052 26,0%	60 709 38,6%	74 466 60,6%	186 526 32,7%
Total	86 593 100%	53 325 100%	78 586 100%	57 676 100%	276 180 100%	84 828 100%	66 173 100%	78 787 100%	65 198 100%	294 986 100%	171 421 100%	119 498 100%	157 373 100%	122 874 100%	571 166 100%
	(31,4%)	(19,3%)	(28,5%)	(20,9%)	(100%)	(28,8%)	(22,4%)	(26,7%)	(22,1%)	(100%)	(30,0%)	(20,9%)	(27,6%)	(21,5%)	(100%)
Au moins cinq ordonnances actives	131 0,2%	1 341 2,5%	5 792 7,4%	9 621 16,7%	16 885 6,1%	124 0,2%	1 460 2,2%	7 939 10,1%	17 405 26,7%	26 928 9,1%	255 0,2%	2 801 2,3%	13 731 8,7%	27 026 22,0%	43 813 7,7%

Tableau 3

Répartition des ordonnances actives chez les prestataires d'assistance-emploi selon le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Ordonnances actives

HOMMES

	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Total	13 235	24 914	81 357	113 151	232 657 38,9%
Moyenne par prestataire assuré	0,2	0,5	1,0	2,0	0,8
Moyenne par prestataire participant	1,5	2,6	3,2	4,0	3,2

FEMMES

	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Total	15 380	40 091	112 251	197 301	365 023 61,1%
Moyenne par prestataire assuré	0,2	0,6	1,4	3,0	1,2
Moyenne par prestataire participant	1,4	1,9	3,2	4,3	3,2

HOMMES ET FEMMES

	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Total	28 615 4,8%	65 005 10,9%	193 608 32,4%	310 452 51,9%	597 680 100%
Moyenne par prestataire assuré	0,2	0,5	1,2	2,5	1,1
Moyenne par prestataire participant	1,4	2,1	3,2	4,2	3,2

Tableau 4

Principales caractéristiques de la consommation médicamenteuse des prestataires d'assistance-emploi assurés selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

	HOMMES ET FEMMES						
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	1 828	2 781	533	727	1 411	1 938	4 609
% de l'ensemble	30,5 %	45,8 %	16,2 %	30,7 %	41,2 %	64,9 %	38,2 %
cinq ordonnances actives	430	662	8	57	317	710	1 092
% de l'ensemble	7,2 %	10,9 %	0,2 %	2,4 %	9,3 %	23,8 %	9,0 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	1,0	1,5	0,2	0,6	1,3	2,7	1,2
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	3,3	3,2	1,4	2,1	3,2	4,2	3,2
Bas-Saint-Laurent							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	2 789	4 186	662	1 044	2 278	2 991	6 975
% de l'ensemble	32,7 %	48,0 %	15,5 %	31,9 %	46,1 %	64,4 %	40,4 %
cinq ordonnances actives	760	1 116	9	116	564	1 187	1 876
% de l'ensemble	8,9 %	12,8 %	0,2 %	3,6 %	11,2 %	25,5 %	10,9 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	1,1	1,6	0,2	0,7	1,5	2,8	1,4
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	3,4	3,4	1,4	2,2	3,4	4,3	3,4
Saguenay-Lac-Saint-Jean							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	3 099	5 553	877	1 451	2 842	3 482	8 652
% de l'ensemble	28,9 %	47,2 %	15,0 %	30,1 %	42,9 %	67,1 %	38,5 %
cinq ordonnances actives	708	1 461	14	127	670	1 358	2 169
% de l'ensemble	6,6 %	12,4 %	0,2 %	2,6 %	10,1 %	26,2 %	9,7 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,9	1,6	0,2	0,6	1,4	2,9	1,3
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	3,2	3,4	1,4	2,1	3,3	4,3	3,3
Québec							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	6 978	10 610	1 575	2 838	5 753	7 422	17 588
% de l'ensemble	30,6 %	45,7 %	14,1 %	28,5 %	42,3 %	65,6 %	38,2 %
cinq ordonnances actives	1 775	2 762	22	290	1 423	2 802	4 537
% de l'ensemble	7,8 %	11,9 %	0,2 %	2,9 %	10,5 %	24,8 %	9,9 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	1,0	1,6	0,2	0,6	1,4	2,8	1,3
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	3,4	3,4	1,4	2,2	3,3	4,3	3,4

Tableau 4 (suite)

	HOMMES ET FEMMES						
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Chaudière-Appalaches							
Nombre de prestataires ayant au moins:							
une ordonnance active	3 020	4 750	641	1 230	2 452	3 447	7 770
% de l'ensemble	35,2%	49,7%	14,6%	35,4%	47,8%	66,9%	42,8%
cinq ordonnances actives	786	1 263	7	129	627	1 286	2 049
% de l'ensemble	9,2%	13,2%	0,2%	3,7%	12,2%	25,0%	11,3%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	1,2	1,7	0,2	0,8	1,7	2,9	1,5
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	3,4	3,5	1,5	2,2	3,5	4,3	3,5
Mauricie-Bois-Francs							
Nombre de prestataires ayant au moins:							
une ordonnance active	5 695	9 531	1 622	2 316	4 738	6 550	15 226
% de l'ensemble	28,5%	43,9%	14,3%	27,6%	41,2%	62,5%	36,5%
cinq ordonnances actives	1 308	2 174	15	195	1 014	2 258	3 482
% de l'ensemble	6,5%	10,0%	0,1%	2,3%	8,8%	21,5%	8,3%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,9	1,4	0,2	0,6	1,3	2,5	1,2
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	3,2	3,1	1,3	2,0	3,1	4,1	3,2
Estrie							
Nombre de prestataires ayant au moins:							
une ordonnance active	2 978	4 568	836	1 252	2 387	3 071	7 546
% de l'ensemble	28,2%	41,4%	13,7%	28,1%	40,5%	60,0%	34,9%
cinq ordonnances actives	692	1 032	9	110	524	1 081	1 724
% de l'ensemble	6,6%	9,4%	0,2%	2,5%	8,9%	21,1%	8,0%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,9	1,3	0,2	0,6	1,3	2,5	1,1
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	3,2	3,2	1,4	2,1	3,1	4,2	3,2
Montréal-Centre							
Nombre de prestataires ayant au moins:							
une ordonnance active	22 134	32 509	6 157	8 862	18 693	20 931	54 643
% de l'ensemble	23,4%	33,0%	9,9%	22,2%	35,0%	55,9%	28,3%
cinq ordonnances actives	4 919	7 238	70	769	4 150	7 168	12 157
% de l'ensemble	5,2%	7,4%	0,1%	1,9%	7,8%	19,1%	6,3%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,7	1,0	0,1	0,5	1,1	2,3	0,9
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	3,2	3,1	1,4	2,1	3,2	4,0	3,1

Tableau 4 (suite)

	HOMMES ET FEMMES						
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Laval							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	1 849	3 321	548	930	1 705	1 987	5 170
% de l'ensemble»	24,5 %	36,5 %	10,1 %	26,1 %	38,9 %	61,0 %	31,1 %
cinq ordonnances actives	394	712	9	99	315	683	1 106
% de l'ensemble	5,2 %	7,8 %	0,2 %	2,8 %	7,2 %	21,0 %	6,7 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,8	1,1	0,2	0,6	1,1	2,5	1,0
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	3,1	3,1	1,5	2,2	2,9	4,1	3,1
Laurentides							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	3 653	6 248	1 102	1 662	3 156	3 981	9 901
% de l'ensemble	25,3 %	39,4 %	12,2 %	27,0 %	37,9 %	59,3 %	32,7 %
cinq ordonnances actives	808	1 443	17	138	681	1 415	2 251
% de l'ensemble	5,6 %	9,1 %	0,2 %	2,2 %	8,2 %	21,1 %	7,4 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,8	1,2	0,2	0,6	1,2	2,4	1,0
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	3,2	3,1	1,4	2,0	3,1	4,1	3,1
Lanaudière							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	3 325	5 601	1 017	1 545	2 743	3 621	8 926
% de l'ensemble»	26,7 %	40,0 %	12,2 %	28,7 %	39,3 %	62,9 %	33,7 %
cinq ordonnances actives	887	1 383	13	140	670	1 447	2 270
% de l'ensemble	7,1 %	9,9 %	0,2 %	2,6 %	9,6 %	25,1 %	8,6 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,9	1,3	0,2	0,6	1,3	2,8	1,1
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	3,4	3,3	1,4	2,1	3,2	4,4	3,3
Montérégie							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	9 250	15 423	2 934	4 382	7 619	9 738	24 673
% de l'ensemble	26,4 %	39,2 %	12,7 %	27,6 %	39,0 %	61,2 %	33,2 %
cinq ordonnances actives	2 108	3 591	33	410	1 678	3 578	5 699
% de l'ensemble	6,0 %	9,1 %	0,1 %	2,6 %	8,6 %	22,5 %	7,7 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,8	1,2	0,2	0,6	1,2	2,6	1,1
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	3,2	3,2	1,4	2,1	3,2	4,2	3,2

Tableau 4 (suite)

	HOMMES ET FEMMES						
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Outaouais							
Nombre de prestataires ayant au moins:							
une ordonnance active	2 977	4 644	870	1 378	2 581	2 792	7 621
% de l'ensemble	23,4%	34,0%	10,0%	23,0%	36,2%	61,1%	28,9%
cinq ordonnances actives	716	1 122	11	128	616	1 083	1 838
% de l'ensemble	5,6%	8,2%	0,1%	2,1%	8,6%	23,7%	7,0%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,8	1,1	0,1	0,5	1,2	2,6	0,9
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	3,3	3,2	1,4	2,1	3,3	4,3	3,2
Abitibi-Témiscamingue							
Nombre de prestataires ayant au moins:							
une ordonnance active	1 493	2 589	535	798	1 322	1 427	4 082
% de l'ensemble	24,0%	41,1%	14,1%	27,7%	38,9%	58,2%	32,6%
cinq ordonnances actives	328	543	11	50	254	556	871
% de l'ensemble	5,3%	8,6%	0,3%	1,7%	7,5%	22,7%	7,0%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,8	1,2	0,2	0,5	1,2	2,5	1,0
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	3,1	3,0	1,5	1,9	3,1	4,3	3,1
Côte-Nord							
Nombre de prestataires ayant au moins:							
une ordonnance active	871	1 506	288	493	784	812	2 377
% de l'ensemble	25,3%	41,2%	13,6%	28,7%	40,4%	61,9%	33,5%
cinq ordonnances actives	206	323	3	38	176	312	529
% de l'ensemble	6,0%	8,8%	0,1%	2,2%	9,1%	23,8%	7,5%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,8	1,2	0,2	0,6	1,3	2,6	1,0
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	3,3	3,0	1,4	2,0	3,2	4,3	3,1
Nord-du-Québec							
Nombre de prestataires ayant au moins:							
une ordonnance active	81	165	28	56	78	84	246
% de l'ensemble	22,5%	39,8%	11,4%	31,1%	37,7%	58,7%	31,7%
cinq ordonnances actives	20	27	0	2	17	28	47
% de l'ensemble	5,6%	6,5%	–	1,1%	8,2%	19,6%	6,1%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,7	1,2	0,2	0,5	1,1	2,5	0,9
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	3,1	2,9	1,7	1,7	2,9	4,3	3,0

Tableau 4 (suite)

	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James							
Nombre de prestataires ayant au moins:							
une ordonnance active	2	3	0	1	2	2	5
% de l'ensemble	0,2%	0,3%	–	0,2%	1,0%	1,7%	0,3%
cinq ordonnances actives	0	0	0	0	0	0	0
% de l'ensemble	–	–	–	–	–	–	–
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Région indéterminée							
Nombre de prestataires ayant au moins:							
une ordonnance active	202	314	74	87	165	190	516
% de l'ensemble	19,0%	31,2%	9,9%	19,0%	29,5%	61,9%	24,9%
cinq ordonnances actives	40	76	4	3	35	74	116
% de l'ensemble	3,8%	7,6%	0,5%	0,7%	6,3%	24,1%	5,6%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,6	1,0	0,2	0,3	0,9	2,6	0,8
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	3,1	3,2	1,7	1,7	3,2	4,3	3,1

Tableau 5

**Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants
selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge,
régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000**

HOMMES ET FEMMES														
Nombre d'ordonnances actives	Hommes		Femmes		0-19 ans		20-34 ans		35-49 ans		50-64 ans		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	22 634	31,3	40 591	35,5	14 844	73,1	16 679	53,7	18 335	30,2	13 367	18,0	63 225	33,9
2	14 524	20,1	21 207	18,6	3 744	18,4	6 269	20,2	12 704	20,9	13 014	17,5	35 731	19,2
3	10 482	14,5	14 733	12,9	1 101	5,4	3 440	11,1	9 255	15,2	11 419	15,3	25 215	13,5
4	7 699	10,7	10 843	9,5	355	1,8	1 863	6,0	6 684	11,0	9 640	13,0	18 542	9,9
5	5 312	7,4	8 047	7,0	127	0,6	1 180	3,8	4 626	7,6	7 426	10,0	13 359	7,2
6	3 878	5,4	5 826	5,1	60	0,3	692	2,2	3 139	5,2	5 213	7,8	9 704	5,2
7	2 609	3,6	4 013	3,5	27	0,1	405	1,3	2 012	3,3	4 178	5,6	6 622	3,6
8	1 680	2,3	2 879	2,5	18	0,1	197	0,6	1 309	2,2	3 035	4,1	4 559	2,4
9	1 167	1,6	1 982	1,7	14	0,1	118	0,4	950	1,6	2 067	2,8	3 149	1,7
10 ou plus	2 239	3,1	4 181	3,7	9	0,0	209	0,7	1 695	2,8	4 507	6,1	6 420	3,4
Sous-total (1 à 4)	55 339	76,6	87 374	76,4	20 044	98,7	28 251	91,0	46 978	77,4	47 440	63,7	142 713	76,5
Sous-total (5 ou plus)	16 885	23,4	26 928	23,6	255	1,3	2 801	9,0	13 731	22,6	27 026	36,3	43 813	23,5
Total	72 224	100	114 302	100	20 299	100	31 052	100	60 709	100	74 466	100	186 526	100
		(38,7)		(61,3)		(10,9)		(16,7)		(32,6)		(39,9)		

Tableau 6

Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants (%) selon le nombre d'ordonnances actives et la région sociosanitaire et taux d'ordonnances actives pour 1 000 participants selon la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Nombre d'ordonnances actives	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Bas-Saint-Laurent	Saguenay-Lac-Saint-Jean	Québec
1	33,0%	31,2%	32,3%	30,9%
2	19,3%	18,0%	18,3%	18,7%
3	13,5%	13,4%	13,8%	13,8%
4	10,5%	10,4%	10,5%	10,7%
5 ou plus	23,7%	26,9%	25,1%	25,8%
Taux d'ordonnances pour 1 000 prestataires participants	3 231	3 412	3 298	3 393

	Chaudière-Appalaches	Mauricie-Bois-Francs	Estrie	Montréal-Centre
1	29,8%	33,3%	35,0%	35,1%
2	19,0%	19,5%	18,8%	19,6%
3	14,0%	14,1%	13,7%	13,5%
4	10,9%	10,2%	9,6%	9,7%
5 ou plus	26,4%	22,9%	22,9%	22,3%
Taux d'ordonnances pour 1 000 prestataires participants	3 451	3 160	3 174	3 123

	Laval	Laurentides	Lanaudière	Montérégie
1	35,3%	34,9%	33,1%	34,9%
2	19,7%	20,1%	18,7%	18,9%
3	13,6%	12,7%	13,3%	13,4%
4	9,9%	9,5%	9,4%	9,8%
5 ou plus	21,4%	22,7%	25,4%	23,1%
Taux d'ordonnances pour 1 000 prestataires participants	3 062	3 138	3 319	3 163

Tableau 6 (suite)

Nombre d'ordonnances actives	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec
1	34,6 %	35,8 %	36,3 %	36,2 %
2	18,2 %	20,5 %	18,1 %	24,8 %
3	13,2 %	13,0 %	13,6 %	11,4 %
4	9,9 %	9,3 %	9,8 %	8,6 %
5 ou plus	24,1 %	21,3 %	22,3 %	19,1 %
Taux d'ordonnances pour 1 000 prestataires participants	3 218	3 054	3 084	2 947

	Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James	Indéterminée	
1	0,0 %	39,5 %	
2	0,0 %	20,4 %	
3	100,0 %	11,2 %	
4	0,0 %	6,4 %	
5 ou plus	0,0 %	22,5 %	
Taux d'ordonnances pour 1 000 prestataires participants	3 000	3 120	

Tableau 7

Pourcentage des prestataires d'assistance-emploi assurés ayant au moins une ordonnance active selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Classes de médicaments	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Anti-infectieux	2,5 %	3,0 %	2,5 %	2,5 %	2,9 %	3,1 %	2,7 %
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	5,1 %	5,5 %	1,7 %	3,6 %	7,2 %	9,7 %	5,3 %
– sympathomimétiques	2,2 %	3,0 %	1,6 %	1,8 %	2,7 %	4,5 %	2,6 %
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	3,3 %	3,0 %	0,1 %	1,9 %	4,9 %	6,3 %	3,1 %
Cardiovasculaires	8,2 %	10,2 %	0,2 %	1,6 %	8,7 %	29,9 %	9,2 %
– cardiotropes	4,2 %	4,8 %	0,1 %	0,8 %	3,9 %	14,9 %	4,5 %
– hypolipémiants	4,2 %	4,5 %	0,0 %	0,5 %	3,8 %	14,8 %	4,3 %
– antihypertenseurs	4,1 %	4,7 %	0,1 %	0,6 %	3,8 %	14,9 %	4,4 %
– vasodilatateurs	1,0 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,5 %	3,3 %	0,9 %
Médicaments du système nerveux central (SNC)	17,7 %	21,1 %	3,0 %	12,1 %	26,6 %	40,2 %	19,4 %
– analgésiques et antipyrétiques	6,2 %	7,6 %	0,5 %	1,8 %	7,2 %	20,3 %	6,9 %
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	5,0 %	5,9 %	0,2 %	1,3 %	5,4 %	17,0 %	5,5 %
• autres analgésiques et antipyrétiques	1,9 %	2,7 %	0,4 %	0,7 %	2,7 %	6,0 %	2,3 %
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	3,0 %	2,8 %	0,4 %	3,1 %	4,6 %	3,8 %	2,9 %
– psychotropes	8,2 %	10,8 %	0,5 %	7,4 %	15,5 %	16,6 %	9,5 %
• antidépresseurs	4,3 %	8,4 %	0,3 %	4,5 %	10,0 %	12,1 %	6,4 %
• tranquillisants	4,9 %	3,7 %	0,3 %	4,0 %	7,6 %	6,1 %	4,3 %
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	8,7 %	11,8 %	0,4 %	5,1 %	14,9 %	23,3 %	10,3 %
• benzodiazépines	8,2 %	11,3 %	0,2 %	4,7 %	14,1 %	22,4 %	9,8 %
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	1,2 %	1,3 %	0,2 %	0,7 %	2,1 %	2,4 %	1,3 %
– autres psychotropes	0,8 %	1,0 %	0,0 %	0,6 %	1,5 %	1,4 %	0,9 %
Électrolytes-diurétiques	2,1 %	4,5 %	0,1 %	0,5 %	2,9 %	11,3 %	3,3 %
– diurétiques	1,8 %	3,4 %	0,0 %	0,3 %	2,3 %	9,0 %	2,6 %
– autres électrolytes-diurétiques	0,5 %	1,6 %	0,0 %	0,2 %	0,9 %	3,7 %	1,1 %
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	1,1 %	1,6 %	0,7 %	0,8 %	1,5 %	2,6 %	1,4 %
Gastro-intestinaux	3,9 %	5,3 %	0,2 %	1,9 %	5,7 %	11,9 %	4,6 %
– divers gastro-intestinaux	3,7 %	5,0 %	0,2 %	1,7 %	5,4 %	11,5 %	4,4 %
• anti-ulcéreux	3,5 %	4,6 %	0,1 %	1,5 %	5,0 %	10,8 %	4,1 %
• agents de motilité ou procinétiques	0,5 %	0,8 %	0,0 %	0,2 %	0,7 %	1,7 %	0,6 %
– autres gastro-intestinaux	0,2 %	0,3 %	0,1 %	0,3 %	0,3 %	0,5 %	0,3 %
Hormones et substituts	5,6 %	21,7 %	4,4 %	11,7 %	12,5 %	31,2 %	13,9 %
– corticostéroïdes	2,0 %	2,8 %	1,6 %	1,3 %	2,5 %	4,6 %	2,4 %
– anovulants	–	5,1 %	2,3 %	7,2 %	1,5 %	0,1 %	2,6 %
– hypoglycémiant	2,7 %	2,8 %	0,1 %	0,7 %	2,7 %	8,5 %	2,7 %
– thyroïdiens	1,1 %	4,8 %	0,2 %	1,6 %	3,6 %	7,7 %	3,0 %
– autres hormones et substituts	0,2 %	10,2 %	0,4 %	1,8 %	4,1 %	17,4 %	5,4 %
Dermatologie	1,2 %	1,8 %	1,0 %	1,1 %	1,7 %	2,6 %	1,5 %
– anti-inflammatoires	0,8 %	1,1 %	0,6 %	0,6 %	1,1 %	1,8 %	1,0 %
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	0,6 %	0,8 %	0,5 %	0,5 %	0,7 %	1,1 %	0,7 %
Spasmodiques	0,4 %	0,8 %	0,0 %	0,2 %	0,7 %	1,7 %	0,6 %
– respiratoires	0,3 %	0,4 %	0,0 %	0,1 %	0,3 %	1,1 %	0,3 %
Classe Autres médicaments	1,4 %	1,7 %	0,4 %	0,6 %	1,4 %	4,3 %	1,6 %
Médicaments des autres classes regroupées	2,9 %	4,2 %	1,0 %	1,7 %	3,9 %	8,5 %	3,6 %
Ensemble des médicaments	26,1 %	38,7 %	11,8 %	25,9 %	38,5 %	60,6 %	32,6 %

Tableau 7 (suite)

Classes de médicaments	HOMMES				FEMMES			
	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans
Anti-infectieux	2,4 %	2,0 %	2,8 %	2,6 %	2,5 %	2,9 %	3,0 %	3,6 %
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	1,9 %	3,9 %	6,9 %	8,7 %	1,5 %	3,3 %	7,5 %	10,5 %
– sympathomimétiques	1,8 %	1,4 %	1,9 %	3,8 %	1,5 %	2,1 %	3,4 %	5,2 %
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	0,1 %	2,6 %	5,3 %	6,0 %	0,1 %	1,2 %	4,5 %	6,6 %
Cardiovasculaires	0,3 %	1,8 %	8,0 %	26,3 %	0,1 %	1,5 %	9,4 %	33,1 %
– cardiotropes	0,1 %	0,9 %	3,7 %	14,0 %	0,1 %	0,8 %	4,2 %	15,7 %
– hypolipémiques	0,0 %	0,6 %	4,0 %	13,9 %	0,0 %	0,4 %	3,6 %	15,5 %
– antihypertenseurs	0,2 %	0,7 %	3,6 %	13,9 %	0,1 %	0,5 %	4,1 %	15,9 %
– vasodilatateurs	0,0 %	0,0 %	0,6 %	3,9 %	0,0 %	0,0 %	0,5 %	2,9 %
Médicaments du système nerveux central (SNC)	3,8 %	12,8 %	23,7 %	34,7 %	2,1 %	11,6 %	29,6 %	45,1 %
– analgésiques et antipyrétiques	0,5 %	1,5 %	6,2 %	18,9 %	0,6 %	2,0 %	8,2 %	21,6 %
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	0,1 %	1,1 %	4,7 %	16,3 %	0,2 %	1,5 %	6,1 %	17,6 %
• autres analgésiques et antipyrétiques	0,4 %	0,6 %	2,2 %	4,9 %	0,3 %	0,7 %	3,1 %	7,1 %
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	0,5 %	3,6 %	4,6 %	3,8 %	0,4 %	2,6 %	4,6 %	3,9 %
– psychotropes	0,6 %	8,2 %	13,6 %	12,2 %	0,5 %	6,8 %	17,5 %	20,4 %
• antidépresseurs	0,2 %	3,6 %	6,8 %	7,5 %	0,4 %	5,2 %	13,2 %	16,2 %
• tranquillisants	0,4 %	5,8 %	8,6 %	5,9 %	0,1 %	2,5 %	6,6 %	6,2 %
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	0,4 %	5,4 %	12,9 %	18,5 %	0,4 %	4,8 %	16,8 %	27,5 %
• benzodiazépines	0,2 %	5,0 %	12,0 %	17,7 %	0,2 %	4,5 %	16,1 %	26,6 %
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	0,2 %	0,8 %	2,0 %	2,1 %	0,2 %	0,6 %	2,2 %	2,7 %
– autres psychotropes	0,0 %	0,7 %	1,3 %	1,1 %	0,0 %	0,5 %	1,7 %	1,7 %
Électrolytes-diurétiques	0,1 %	0,5 %	1,9 %	6,9 %	0,1 %	0,6 %	3,9 %	15,1 %
– diurétiques	0,0 %	0,3 %	1,5 %	6,3 %	0,0 %	0,3 %	3,0 %	11,4 %
– autres électrolytes-diurétiques	0,0 %	0,2 %	0,5 %	1,6 %	0,0 %	0,2 %	1,2 %	5,5 %
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	0,7 %	0,6 %	1,1 %	2,0 %	0,7 %	1,0 %	1,8 %	3,1 %
Gastro-intestinal	0,2 %	1,9 %	4,9 %	10,0 %	0,3 %	2,0 %	6,4 %	13,7 %
– divers gastro-intestinaux	0,2 %	1,7 %	4,6 %	9,6 %	0,2 %	1,6 %	6,2 %	13,3 %
• anti-ulcéreux	0,1 %	1,5 %	4,4 %	9,1 %	0,2 %	1,4 %	5,7 %	12,4 %
• agents de motilité ou prokinétiques	0,0 %	0,2 %	0,5 %	1,2 %	0,0 %	0,3 %	0,9 %	2,1 %
– autres gastro-intestinaux	0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,5 %	0,1 %	0,3 %	0,3 %	0,6 %
Hormones et substituts	1,9 %	2,5 %	5,5 %	14,1 %	6,9 %	19,2 %	19,5 %	46,3 %
– corticostéroïdes	1,7 %	1,0 %	1,7 %	3,7 %	1,4 %	1,5 %	3,2 %	5,3 %
– anovulants	–	–	–	–	4,6 %	13,0 %	3,0 %	0,1 %
– hypoglycémiques	0,1 %	0,7 %	2,6 %	8,6 %	0,1 %	0,7 %	2,9 %	8,4 %
– thyroïdiens	0,1 %	0,8 %	1,4 %	2,8 %	0,3 %	2,2 %	5,8 %	12,1 %
– autres hormones et substituts	0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,4 %	0,8 %	3,1 %	7,9 %	32,5 %
Dermatologie	0,9 %	0,8 %	1,3 %	2,1 %	1,1 %	1,3 %	2,0 %	3,1 %
– anti-inflammatoires	0,5 %	0,5 %	0,9 %	1,4 %	0,6 %	0,7 %	1,3 %	2,1 %
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	0,4 %	0,4 %	0,6 %	0,9 %	0,5 %	0,6 %	0,9 %	1,3 %
Spasmolytiques	0,1 %	0,1 %	0,4 %	1,3 %	0,0 %	0,2 %	0,9 %	2,1 %
– respiratoires	0,0 %	0,0 %	0,2 %	1,0 %	0,0 %	0,1 %	0,4 %	1,2 %
Classe Autres médicaments	0,4 %	0,6 %	1,3 %	3,9 %	0,3 %	0,6 %	1,6 %	4,6 %
Médicaments des autres classes regroupées	1,0 %	1,3 %	3,0 %	7,0 %	1,0 %	2,0 %	4,8 %	9,9 %
Ensemble des médicaments	10,4 %	18,2 %	31,9 %	49,2 %	13,3 %	32,1 %	45,1 %	70,7 %

Tableau 8

Répartition des ordonnances actives chez les prestataires d'assistance-emploi participants selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Classes de médicaments	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Anti-infectieux	4,4%	2,7%	15,6%	6,0%	3,7%	1,5%	3,4%
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	6,9%	5,1%	10,5%	7,0%	6,5%	4,6%	5,8%
– sympathomimétiques	2,8%	2,6%	9,9%	3,6%	2,4%	2,0%	2,7%
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	4,1%	2,5%	0,6%	3,5%	4,1%	2,6%	3,1%
Cardiovasculaires	18,1%	13,1%	1,4%	3,9%	10,8%	21,3%	15,1%
– cardiotropes	5,8%	4,3%	0,5%	1,6%	3,6%	6,8%	4,9%
– hypolipémiants	5,2%	3,7%	0,1%	1,0%	3,2%	6,1%	4,3%
– antihypertenseurs	5,8%	4,4%	0,9%	1,3%	3,5%	6,9%	4,9%
– vasodilatateurs	1,4%	0,7%	0,0%	0,0%	0,5%	1,5%	0,9%
Médicaments du système nerveux central (SNC)	43,7%	36,3%	22,4%	44,7%	48,8%	33,6%	39,2%
– analgésiques et antipyrétiques	8,9%	7,6%	3,1%	3,8%	7,2%	10,0%	8,1%
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	6,5%	5,2%	1,0%	2,5%	4,7%	7,4%	5,7%
• autres analgésiques et antipyrétiques	2,5%	2,4%	2,1%	1,4%	2,4%	2,6%	2,4%
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	5,2%	3,2%	3,5%	8,4%	5,6%	2,1%	4,0%
– psychotropes	14,0%	12,0%	3,8%	19,5%	18,3%	8,8%	12,8%
• antidépresseurs	6,0%	8,2%	1,9%	9,8%	10,0%	5,7%	7,3%
• tranquillisants	8,0%	3,9%	1,9%	9,8%	8,4%	3,1%	5,5%
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	13,5%	12,4%	2,4%	11,6%	16,2%	11,9%	12,8%
• benzodiazépines	11,9%	11,2%	1,5%	10,3%	14,3%	10,9%	11,5%
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	1,6%	1,2%	1,0%	1,3%	1,9%	1,0%	1,3%
– autres psychotropes	1,0%	0,9%	0,1%	1,2%	1,4%	0,7%	0,9%
Électrolytes-diurétiques	3,0%	4,2%	0,4%	1,1%	2,7%	5,3%	3,8%
– diurétiques	2,3%	2,9%	0,2%	0,6%	2,0%	3,8%	2,7%
– autres électrolytes-diurétiques	0,7%	1,3%	0,2%	0,4%	0,7%	1,5%	1,1%
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	1,5%	1,4%	4,5%	1,7%	1,3%	1,2%	1,5%
Gastro-intestinaux	5,3%	5,0%	1,7%	4,1%	5,4%	5,5%	5,1%
– divers gastro-intestinaux	4,9%	4,6%	1,2%	3,4%	5,0%	5,2%	4,7%
• anti-ulcéreux	4,2%	3,9%	0,9%	2,8%	4,2%	4,4%	4,0%
• agents de motilité ou procinétiques	0,6%	0,7%	0,3%	0,4%	0,6%	0,7%	0,6%
– autres gastro-intestinaux	0,3%	0,3%	0,4%	0,5%	0,3%	0,2%	0,3%
Hormones et substituts	9,1%	25,0%	27,7%	24,1%	14,0%	19,8%	18,8%
– corticostéroïdes	2,5%	2,4%	9,6%	2,5%	2,1%	1,9%	2,4%
– anovulants	–	4,1%	13,7%	13,3%	1,2%	0,0%	2,5%
– hypoglycémiant	4,9%	3,6%	1,0%	1,9%	3,4%	5,3%	4,1%
– thyroïdiens	1,4%	4,1%	1,0%	3,0%	3,0%	3,2%	3,0%
– autres hormones et substituts	0,3%	10,9%	2,5%	3,4%	4,2%	9,4%	6,8%
Dermatologie	1,8%	1,7%	6,8%	2,2%	1,6%	1,3%	1,8%
– anti-inflammatoires	1,1%	1,0%	3,7%	1,2%	1,0%	0,8%	1,0%
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	0,7%	0,7%	3,0%	1,0%	0,6%	0,5%	0,7%
Spasmolytiques	0,5%	0,6%	0,3%	0,4%	0,5%	0,7%	0,6%
– respiratoires	0,3%	0,3%	0,0%	0,1%	0,3%	0,4%	0,3%
Classe Autres médicaments	2,0%	1,5%	2,4%	1,4%	1,4%	1,9%	1,7%
Médicaments des autres classes regroupées	3,7%	3,3%	6,3%	3,4%	3,2%	3,3%	3,5%
Ensemble des médicaments	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nombre d'ordonnances actives	232 657	365 023	28 615	65 005	193 608	310 452	597 680

Tableau 8 (suite)

Classes de médicaments	HOMMES				FEMMES			
	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans
Anti-infectieux	16,6%	6,8%	5,4%	1,8%	14,6%	5,5%	2,5%	1,3%
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	12,8%	8,9%	7,3%	5,4%	8,6%	5,9%	6,0%	4,2%
– sympathomimétiques	11,9%	3,2%	2,1%	2,3%	8,2%	3,8%	2,7%	1,9%
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	0,8%	5,7%	5,3%	3,2%	0,4%	2,1%	3,3%	2,3%
Cardiovasculaires	2,1%	5,3%	12,7%	26,6%	0,9%	3,1%	9,4%	18,2%
– cardiotropes	0,5%	2,1%	4,1%	8,4%	0,4%	1,4%	3,2%	5,9%
– hypolipémiants	0,1%	1,3%	4,0%	7,4%	0,1%	0,7%	2,6%	5,3%
– antihypertenseurs	1,4%	1,9%	4,0%	8,4%	0,4%	1,0%	3,2%	6,0%
– vasodilatateurs	0,0%	0,1%	0,7%	2,3%	0,0%	0,0%	0,4%	1,1%
Médicaments du système nerveux central (SNC)	30,9%	58,0%	51,9%	36,2%	15,0%	36,5%	46,5%	32,2%
– analgésiques et antipyrétiques	3,1%	3,8%	7,3%	11,9%	3,1%	3,8%	7,1%	9,0%
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	0,8%	2,4%	4,9%	9,2%	1,2%	2,5%	4,6%	6,4%
• autres analgésiques et antipyrétiques	2,3%	1,4%	2,4%	2,7%	1,9%	1,3%	2,5%	2,6%
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	3,9%	11,7%	6,8%	2,8%	3,1%	6,3%	4,7%	1,8%
– psychotropes	4,6%	26,0%	19,5%	8,5%	3,1%	15,5%	17,5%	8,9%
• antidépresseurs	1,6%	9,1%	7,9%	4,5%	2,2%	10,2%	11,5%	6,4%
• tranquillisants	3,0%	16,9%	11,6%	4,1%	0,9%	5,4%	6,0%	2,6%
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	2,6%	14,6%	16,7%	12,2%	2,3%	9,7%	15,8%	11,7%
• benzodiazépines	1,6%	12,7%	14,6%	11,1%	1,4%	8,7%	14,1%	10,8%
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	1,1%	1,8%	2,1%	1,2%	0,9%	1,0%	1,7%	1,0%
– autres psychotropes	0,1%	1,6%	1,5%	0,7%	0,1%	1,0%	1,4%	0,7%
Électrolytes-diurétiques	0,5%	1,1%	2,2%	4,3%	0,4%	1,0%	3,1%	5,8%
– diurétiques	0,2%	0,6%	1,6%	3,5%	0,2%	0,6%	2,2%	3,9%
– autres électrolytes-diurétiques	0,2%	0,5%	0,6%	0,9%	0,2%	0,4%	0,9%	1,9%
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	5,1%	1,6%	1,2%	1,3%	4,0%	1,8%	1,4%	1,2%
Gastro-intestinal	1,6%	4,7%	5,5%	5,8%	1,8%	3,7%	5,3%	5,3%
– divers gastro-intestinaux	1,1%	4,1%	4,9%	5,5%	1,3%	3,0%	5,0%	5,0%
• anti-ulcéreux	0,8%	3,4%	4,3%	4,8%	0,9%	2,4%	4,2%	4,2%
• agents de motilité ou prokinétiques	0,3%	0,5%	0,5%	0,6%	0,3%	0,4%	0,7%	0,7%
– autres gastro-intestinaux	0,3%	0,4%	0,3%	0,2%	0,5%	0,6%	0,2%	0,2%
Hormones et substituts	13,7%	6,6%	7,2%	10,5%	39,9%	35,0%	18,9%	25,2%
– corticostéroïdes	11,6%	2,3%	1,8%	2,0%	7,8%	2,6%	2,4%	1,9%
– anovulants	–	–	–	–	25,5%	21,6%	2,1%	*
– hypoglycémiant	1,0%	2,1%	3,7%	6,8%	1,0%	1,7%	3,1%	4,4%
– thyroïdiens	0,6%	1,7%	1,4%	1,5%	1,4%	3,9%	4,3%	4,2%
– autres hormones et substituts	0,4%	0,5%	0,3%	0,2%	4,3%	5,2%	7,1%	14,8%
Dermatologie	6,9%	2,1%	1,6%	1,3%	6,7%	2,3%	1,7%	1,2%
– anti-inflammatoires	3,8%	1,1%	1,0%	0,8%	3,6%	1,3%	1,0%	0,8%
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	3,0%	0,9%	0,6%	0,5%	3,0%	1,1%	0,7%	0,4%
Spasmolytiques	0,3%	0,3%	0,4%	0,7%	0,2%	0,4%	0,6%	0,7%
– respiratoires	0,1%	0,1%	0,2%	0,5%	0,0%	0,2%	0,3%	0,4%
Classe Autres médicaments	3,1%	1,7%	1,5%	2,3%	1,9%	1,2%	1,3%	1,6%
Médicaments des autres classes regroupées	6,7%	3,0%	3,1%	3,8%	6,0%	3,6%	3,3%	3,1%
Ensemble des médicaments	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nombre d'ordonnances actives	13 235	24 914	81 357	113 151	15 380	40 091	112 251	197 301

Tableau 9

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 prestataires d'assistance-emploi assurés selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Classes de médicaments	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Anti-infectieux	37	33	26	33	46	37	35
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	58	63	18	38	80	117	61
– sympathomimétiques	24	32	17	19	30	51	28
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	34	31	1	19	51	66	32
Cardiovasculaires	152	162	2	21	133	538	157
– cardiotropes	49	54	1	9	44	172	51
– hypolipémiants	43	46	0	5	39	153	45
– antihypertenseurs	49	54	1	7	43	175	51
– vasodilatateurs	11	9	0	0	6	38	10
Médicaments du système nerveux central (SNC)	368	449	37	243	600	850	410
– analgésiques et antipyrétiques	75	94	5	21	88	253	85
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	54	64	2	13	58	187	60
• autres analgésiques et antipyrétiques	21	29	3	7	30	66	25
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	44	40	6	46	68	54	42
– psychotropes	118	149	6	106	225	222	134
• antidépresseurs	51	101	3	53	123	143	77
• tranquillisants	68	48	3	53	103	79	57
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	114	153	4	63	199	301	134
• benzodiazépines	101	138	2	56	176	275	120
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	13	14	2	7	23	26	14
– autres psychotropes	8	11	0	7	17	16	10
Électrolytes-diurétiques	25	52	1	6	33	133	39
– diurétiques	20	36	0	3	24	95	28
– autres électrolytes-diurétiques	6	16	0	2	9	38	11
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	13	18	7	9	17	31	15
Gastro-intestinaux	45	62	3	22	66	139	54
– divers gastro-intestinaux	41	57	2	19	61	131	49
• anti-ulcéreux	36	48	1	15	52	112	42
• agents de motilité ou prokinétiques	5	8	0	2	7	17	6
– autres gastro-intestinaux	2	3	1	3	3	5	3
Hormones et substituts	76	309	46	131	172	501	197
– corticostéroïdes	21	29	16	14	26	48	25
– anovulants	–	51	23	72	15	1	26
– hypoglycémiant	41	44	2	10	41	133	43
– thyroïdiens	12	50	2	16	37	81	32
– autres hormones et substituts	2	135	4	18	52	238	71
Dermatologie	15	21	11	12	20	32	18
– anti-inflammatoires	9	13	6	7	12	20	11
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	6	9	5	6	8	11	7
Spasmolytiques	4	8	0	2	7	17	6
– respiratoires	3	4	0	1	3	11	3
Classe Autres médicaments	17	18	4	7	17	47	18
Médicaments des autres classes regroupées	31	41	11	18	40	84	36
Ensemble des médicaments	842	1 237	167	544	1 230	2 527	1 046

Tableau 10

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 prestataires d'assistance-emploi assurés selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

RÉGION SOCIO SANITAIRE																		
Classe de médicaments	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	99
Anti-infectieux	26	25	35	29	35	44	29	27	22	15	26	31	34	32	30	33	0	32
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	74	72	68	64	45	56	54	57	64	48	64	75	54	69	61	62	0	41
– sympathomimétiques	34	36	34	28	22	24	29	30	38	26	34	32	25	30	32	31	0	24
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	41	36	34	36	23	32	25	27	27	22	31	43	29	38	29	32	0	17
Cardiovasculaires	228	217	192	189	180	116	136	153	178	195	218	227	137	191	160	162	2	134
– cardiotropes	71	75	60	60	57	38	42	47	60	68	70	74	46	60	53	54	0	44
– hypolipémiants	74	64	61	55	52	31	38	45	54	46	61	68	37	56	44	44	1	36
– antihypertenseurs	66	67	58	61	59	40	47	52	52	67	71	70	45	62	52	54	1	45
– vasodilatateurs	17	11	12	13	11	7	9	9	11	13	16	15	8	13	11	9	0	9
Médicaments du système nerveux central (SNC)	557	490	549	452	445	346	369	364	381	275	444	609	370	417	391	401	3	270
– analgésiques et antipyrétiques	124	114	105	98	96	66	78	87	91	66	115	114	75	92	84	85	1	61
• anti-inflammatoires non stéroïdiens	84	83	68	71	71	44	55	63	74	53	78	75	53	66	64	62	0	41
• autres analgésiques et antipyrétiques	40	30	37	26	25	21	23	24	17	13	37	39	22	25	20	22	1	20
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	57	52	50	38	40	39	37	32	43	52	45	63	38	37	33	43	1	23
– psychotropes	164	154	174	144	154	121	127	114	103	81	115	186	126	132	130	128	1	78
• antidépresseurs	103	104	104	86	97	60	86	73	60	55	75	105	65	75	79	73	1	51
• tranquillisants	61	50	70	58	57	60	41	41	43	26	41	81	61	56	50	55	0	27
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	192	149	197	154	136	107	116	114	132	65	154	224	115	139	126	128	0	93
– benzodiazépines	173	130	175	141	120	95	103	104	122	61	140	201	107	124	114	116	0	84
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	19	18	22	13	16	12	13	10	10	4	13	23	8	14	12	12	0	10
– autres psychotropes	13	14	13	11	9	8	6	9	7	6	8	14	9	12	10	9	0	7
Électrolytes diurétiques	44	38	41	44	39	35	36	37	30	41	41	56	42	49	41	40	1	30
– diurétiques	32	27	30	31	26	25	28	24	21	27	31	40	29	33	29	29	1	22
– autres électrolytes-diurétiques	11	10	11	13	12	11	7	13	9	14	9	15	13	16	12	11	0	8
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	18	11	21	12	15	15	13	14	12	12	17	23	13	15	14	15	1	11
Gastro-intestinaux	80	70	70	56	66	41	56	64	63	46	90	79	43	51	52	49	2	42
– divers gastro-intestinaux	76	66	62	52	62	37	54	60	59	46	85	71	39	47	48	46	2	40
• antiulcéreux	62	56	54	44	51	32	45	51	49	43	68	56	33	40	42	39	1	35
• agents de motilité ou prokinétiques	12	9	7	7	10	4	8	8	8	4	15	13	5	6	6	6	1	4
– autres gastro-intestinaux	3	3	4	2	3	3	2	3	1	0	3	4	3	2	3	3	0	2
Hormones et substituts	260	270	230	226	203	152	170	211	218	237	247	274	187	223	209	207	1	154
– corticostéroïdes	31	30	30	27	23	20	22	26	34	23	29	29	22	30	29	29	0	21
– anovulants	36	37	28	34	27	19	23	36	43	50	34	31	25	31	28	28	0	19
– hypoglycémiant	45	39	44	49	45	39	42	37	33	39	51	52	38	49	44	46	0	36
– thyroïdiens	49	39	37	31	33	26	26	30	38	40	34	54	35	34	31	32	0	22
– autres hormones et substituts	99	124	90	85	75	48	57	82	70	85	100	109	67	79	77	72	1	56

Tableau 10 (suite)

		RÉGION SOCIO SANITAIRE																
Classe de médicaments	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	99
Dermatologie	20	18	23	16	16	20	20	12	16	15	18	20	16	15	15	17	0	17
- anti-inflammatoires	13	12	13	10	8	12	12	8	11	9	12	13	10	8	10	9	0	10
- autres médicaments pour la peau et les muqueuses	7	5	9	6	8	8	8	4	5	5	6	7	6	6	6	7	0	8
Spasmolytiques	7	8	7	7	6	6	6	7	3	4	6	10	5	6	6	6	0	5
- respiratoires	3	3	3	4	3	3	3	3	2	1	4	5	3	4	4	3	0	1
Classe Autres médicaments	22	18	20	18	21	16	13	17	15	10	20	27	17	17	18	19	0	12
Médicaments des autres classes regroupées	43	33	40	40	35	35	28	34	31	36	42	47	35	36	29	38	0	30
Ensemble des médicaments	1380	1269	1295	1153	1109	883	929	996	1033	935	1233	1477	952	1120	1026	1049	8	777

Légende des régions sociosanitaires

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Bas-St-Laurent | 10. Nord-du-Québec |
| 2. Saguenay-Lac-St-Jean | 11. Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine |
| 3. Québec | 12. Chaudière-Appalaches |
| 4. Mauricie-Bois-Francis | 13. Laval |
| 5. Estrie | 14. Lanaudière |
| 6. Montréal-Centre | 15. Laurentides |
| 7. Outaouais | 16. Montérégie |
| 8. Abitibi-Témiscamingue | 20. Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James |
| 9. Côte-Nord | 99. Indéterminée |

Tableau 11

Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants¹ selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de prescripteurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Nombre d'ordonnances actives	NOMBRE DE PRESCRIPTEURS									
	1		2		3		4 ou plus		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	63 225	100,0	—	—	—	—	—	—	63 225	33,9
2	27 649	77,4	8 081	22,6	—	—	—	—	35 730	19,2
3	16 994	67,4	7 189	28,5	1 032	4,1	—	—	25 215	13,5
4	11 344	61,2	5 719	30,8	1 347	7,3	132	0,7	18 542	9,9
5	7 373	55,2	4 435	33,2	1 291	9,7	260	1,9	13 359	7,2
6	4 756	49,0	3 369	34,7	1 251	12,9	328	3,4	9 704	5,2
7 à 9	5 791	40,4	5 194	36,3	2 345	16,4	1 000	7,0	14 330	7,7
10 ou plus	1 801	28,1	2 128	33,2	1 368	21,3	1 123	17,5	6 420	3,4
Sous-total 1 à 4	119 212	83,5	20 989	14,7	2 379	1,7	132	0,1	142 712	76,5
Sous-total 5 ou plus	19 721	45,0	15 126	34,5	6 255	14,3	2 711	6,2	43 813	23,5
Total	138 933	74,5	36 115	19,4	8 634	4,6	2 843	1,5	186 525¹	100

1 La répartition selon le nombre de prescripteurs n'a pu être faite pour un prestataire d'assurance-emploi participant, aucune donnée relativement aux prescripteurs n'étant disponible parce qu'ils exercent à l'extérieur du Québec et ne sont pas inscrits à la RAMQ. Ainsi la répartition n'a pu être réalisée pour ce prestataire qui a deux ordonnances actives.

Tableau 12

Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de pharmaciens, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Nombre d'ordonnances actives	NOMBRE DE PHARMACIENS									
	1		2		3		4 ou plus		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	63 225	100,0	—	—	—	—	—	—	63 225	33,9
2	33 720	94,4	2 011	5,6	—	—	—	—	35 731	19,2
3	23 467	93,1	1 693	6,7	55	0,2	—	—	25 215	13,5
4	17 104	92,2	1 353	7,3	81	0,4	4	*	18 542	9,9
5	12 242	91,6	1 045	7,8	68	0,5	4	*	13 359	7,2
6	8 756	90,2	858	8,8	83	0,9	7	0,1	9 704	5,2
7 à 9	12 733	88,9	1 438	10,0	141	1,0	18	0,1	14 330	7,7
10 ou plus	5 529	86,1	800	12,5	75	1,2	16	0,3	6 420	3,4
Sous-total 1 à 4	137 516	96,4	5 057	3,5	136	0,1	4	*	142 713	76,5
Sous-total 5 ou plus	39 260	89,6	4 141	9,5	367	0,8	45	0,1	43 813	23,5
Total	176 776	94,8	9 198	4,9	503	0,3	49	*	186 526	100

ANNEXE 2

Tableaux relatifs à la consommation médicamenteuse des prestataires d'assistance-emploi inscrits au régime d'assurance médicaments administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), 7 juin 1998

Tableau 1

Répartition des prestataires d'assistance-emploi assurés selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 2

Répartition des prestataires d'assistance-emploi assurés selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 3

Répartition des ordonnances actives chez les prestataires d'assistance-emploi selon le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 4

Principales caractéristiques de la consommation médicamenteuse des prestataires d'assistance-emploi assurés selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 5

Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 6

Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants (%) selon le nombre d'ordonnances actives et la région sociosanitaire et taux d'ordonnances actives pour 1 000 participants selon la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 7

Pourcentage des prestataires d'assistance-emploi assurés ayant au moins une ordonnance active selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 8

Répartition des ordonnances actives chez les prestataires d'assistance-emploi participants selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 9

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 prestataires d'assistance-emploi assurés selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 10

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 prestataires d'assistance-emploi assurés selon les classes de médicaments et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 11

Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de prescripteurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 12

Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de pharmaciens, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 1

Répartition des prestataires d'assistance-emploi assurés selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Région sociosanitaire	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine	6 869	6 982	4 010	3 011	3 835	2 995	13 851 2,1%
Bas-Saint-Laurent	9 482	9 698	5 345	3 930	5 472	4 433	19 180 2,8%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	12 104	13 224	7 267	5 710	7 185	5 166	25 328 3,7%
Québec	25 874	26 399	14 070	12 337	14 784	11 082	52 273 7,7%
Chaudière-Appalaches	10 477	11 502	6 263	4 692	5 992	5 032	21 979 3,3%
Mauricie-Bois-Francs	22 549	24 523	13 996	10 131	12 743	10 202	47 072 7,0%
Estrie	11 956	12 514	7 664	5 477	6 484	4 845	24 470 3,6%
Montréal-Centre	110 441	114 680	76 319	51 993	59 692	37 117	225 121 33,3%
Laval	9 527	11 342	7 560	4 807	5 123	3 379	20 869 3,1%
Laurentides	17 704	19 574	12 487	8 411	9 622	6 758	37 278 5,5%
Lanaudière	15 026	17 004	11 109	7 227	7 936	5 758	32 030 4,7%
Montérégie	42 012	47 812	30 790	20 906	22 358	15 770	89 824 13,3%
Outaouais	15 102	16 197	11 089	7 940	7 698	4 572	31 299 4,6%
Abitibi-Témiscamingue	6 170	6 488	4 087	2 954	3 317	2 300	12 658 1,9%
Côte-Nord	4 020	4 466	2 775	2 247	2 093	1 371	8 486 1,3%
Nord-du-Québec	421	454	294	202	235	144	875 0,1%
Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James	1 066	1 218	1 206	711	222	145	2 284 0,3%
Région indéterminée	5 667	5 795	4 750	3 098	2 678	936	11 462 1,7%
Ensemble du Québec	326 467 48,3%	349 872 51,7%	221 081 32,7%	155 784 23,0%	177 469 26,2%	122 005 18,0%	676 339 100%

Tableau 2

Répartition des prestataires d'assistance-emploi assurés selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

	HOMMES (ANS)					FEMMES (ANS)					HOMMES ET FEMMES (ANS)				
	0-19	20-34	35-49	50-64	Total	0-19	20-34	35-49	50-64	Total	0-19	20-34	35-49	50-64	Total
Aucune ordonnance active	102 111 91,3%	59 777 85,5%	64 332 73,7%	32 360 56,4%	258 580 79,2%	96 292 88,2%	62 412 72,7%	55 387 61,5%	22 377 34,6%	236 468 67,6%	198 403 89,7%	122 189 78,4%	119 719 67,5%	54 737 44,9%	495 048 73,2%
Au moins une ordonnance active	9 743 8,7%	10 132 14,5%	22 998 26,3%	25 014 43,6%	67 887 20,8%	12 935 11,8%	23 463 27,3%	34 752 38,6%	42 254 65,4%	113 404 32,4%	22 678 10,3%	33 595 21,6%	57 750 32,5%	67 268 55,1%	181 291 26,8%
Total	111 854 100% (34,3%)	69 909 100% (21,4%)	87 330 100% (26,8%)	57 374 100% (17,6%)	326 467 100% (100%)	109 227 100% (31,2%)	85 875 100% (24,5%)	90 139 100% (25,8%)	64 631 100% (18,5%)	349 872 100% (100%)	221 081 100% (32,7%)	155 784 100% (23,0%)	177 469 100% (26,2%)	122 005 100% (18,0%)	676 339 100% (100%)
Au moins cinq ordonnances actives	125 0,1%	1 080 1,5%	4 224 4,8%	7 032 12,3%	12 461 3,8%	103 0,1%	1 166 1,4%	6 034 6,7%	12 762 19,8%	20 065 5,7%	228 0,1%	2 246 1,4%	10 258 5,8%	19 794 16,2%	32 526 4,8%

Tableau 3

Répartition des ordonnances actives chez les prestataires d'assistance-emploi selon le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Ordonnances actives

HOMMES

	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Total	13 699	24 115	66 851	89 476	194 141 38,4%
Moyenne par prestataire assuré	0,1	0,3	0,8	1,6	0,6
Moyenne par prestataire participant	1,4	2,4	2,9	3,6	2,9

FEMMES

	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Total	16 998	40 448	97 139	157 398	311 983 61,6%
Moyenne par prestataire assuré	0,2	0,5	1,1	2,4	0,9
Moyenne par prestataire participant	1,3	1,7	2,8	3,7	2,8

HOMMES ET FEMMES

	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Total	30 697 6,1%	64 563 12,8%	163 990 32,4%	246 874 48,8%	506 124 100%
Moyenne par prestataire assuré	0,1	0,4	0,9	2,0	0,8
Moyenne par prestataire participant	1,4	1,9	2,8	3,7	2,8

Tableau 4

Principales caractéristiques de la consommation médicamenteuse des prestataires d'assistance-emploi assurés selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

	HOMMES ET FEMMES						
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	1 738	2 785	566	813	1 376	1 768	4 523
% de l'ensemble	25,3 %	39,9 %	14,1 %	27,0 %	35,9 %	59,0 %	32,7 %
cinq ordonnances actives	330	490	6	46	226	542	820
% de l'ensemble	4,8 %	7,0 %	0,2 %	1,5 %	5,9 %	18,1 %	5,9 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,7	1,1	0,2	0,5	1,0	2,2	0,9
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,9	2,7	1,4	1,8	2,8	3,7	2,8
Bas-Saint-Laurent							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	2 502	3 970	692	1 081	2 063	2 636	6 472
% de l'ensemble	26,4 %	40,9 %	13,0 %	27,5 %	37,7 %	59,5 %	33,7 %
cinq ordonnances actives	519	808	8	79	412	828	1 327
% de l'ensemble	5,5 %	8,3 %	0,2 %	2,0 %	7,5 %	18,7 %	6,9 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,8	1,2	0,2	0,6	1,1	2,3	1,0
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	3,0	2,9	1,4	2,0	3,0	3,8	3,0
Saguenay-Lac-Saint-Jean							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	2 968	5 482	972	1 410	2 775	3 293	8 450
% de l'ensemble	24,5 %	41,5 %	13,4 %	24,7 %	38,6 %	63,7 %	33,4 %
cinq ordonnances actives	561	1 063	7	101	497	1 019	1 624
% de l'ensemble	4,6 %	8,0 %	0,1 %	1,8 %	6,9 %	19,7 %	6,4 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,7	1,2	0,2	0,5	1,1	2,4	1,0
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,9	2,9	1,4	1,9	2,8	3,8	2,9
Québec							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	6 505	10 359	1 772	2 965	5 466	6 661	16 864
% de l'ensemble	25,1 %	39,2 %	12,6 %	24,0 %	37,0 %	60,1 %	32,3 %
cinq ordonnances actives	1 317	2 082	21	213	1 092	2 073	3 399
% de l'ensemble	5,1 %	7,9 %	0,2 %	1,7 %	7,4 %	18,7 %	6,5 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,8	1,2	0,2	0,5	1,1	2,3	1,0
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	3,0	2,9	1,4	2,0	3,0	3,8	3,0

Tableau 4 (suite)

HOMMES ET FEMMES							
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Chaudière-Appalaches							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	2 916	4 829	868	1 373	2 452	3 052	7 745
% de l'ensemble	27,8%	42,0%	13,9%	29,3%	40,9%	60,7%	35,2%
cinq ordonnances actives	566	925	6	99	485	901	1 491
% de l'ensemble	5,4%	8,0%	0,1%	2,1%	8,1%	17,9%	6,8%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,8	1,2	0,2	0,6	1,2	2,2	1,0
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,9	2,9	1,4	2,0	3,0	3,7	2,9
Mauricie-Bois-Francs							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	5 280	9 159	1 631	2 464	4 454	5 890	14 439
% de l'ensemble	23,4%	37,4%	11,7%	24,3%	35,0%	57,7%	30,7%
cinq ordonnances actives	953	1 583	14	152	708	1 662	2 536
% de l'ensemble	4,2%	6,5%	0,1%	1,5%	5,6%	16,3%	5,4%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,7	1,0	0,2	0,5	1,0	2,1	0,9
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,9	2,7	1,3	1,9	2,7	3,6	2,8
Estrie							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	2 799	4 287	915	1 258	2 245	2 668	7 086
% de l'ensemble	23,4%	34,3%	11,9%	23,0%	34,6%	55,1%	29,0%
cinq ordonnances actives	542	754	6	84	402	804	1 296
% de l'ensemble	4,5%	6,0%	0,1%	1,5%	6,2%	16,6%	5,3%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,7	0,9	0,2	0,4	1,0	2,0	0,8
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,9	2,8	1,3	1,9	2,9	3,7	2,8
Montréal-Centre							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	20 537	31 798	6 581	9 478	17 606	18 670	52 335
% de l'ensemble	18,6%	27,7%	8,6%	18,2%	29,5%	50,3%	23,3%
cinq ordonnances actives	3 629	5 451	59	706	3 102	5 213	9 080
% de l'ensemble	3,3%	4,8%	0,1%	1,4%	5,2%	14,0%	4,0%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,5	0,8	0,1	0,4	0,8	1,8	0,6
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,8	2,7	1,4	2,0	2,8	3,6	2,8

Tableau 4 (suite)

	HOMMES ET FEMMES						
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Laval							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	1 783	3 386	693	1 067	1 585	1 824	5 169
% de l'ensemble	18,7 %	29,9 %	9,2 %	22,2 %	30,9 %	54,0 %	24,8 %
cinq ordonnances actives	292	550	6	85	248	503	842
% de l'ensemble	3,1 %	4,9 %	0,1 %	1,8 %	4,8 %	14,9 %	4,0 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,5	0,8	0,1	0,4	0,8	1,9	0,7
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,7	2,6	1,4	2,0	2,7	3,6	2,7
Laurentides							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	3 347	6 315	1 257	1 823	2 938	3 644	9 662
% de l'ensemble	18,9 %	32,3 %	10,1 %	21,7 %	30,5 %	53,9 %	25,9 %
cinq ordonnances actives	584	1 051	14	94	480	1 047	1 635
% de l'ensemble	3,3 %	5,4 %	0,1 %	1,1 %	5,0 %	15,5 %	4,4 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,5	0,9	0,1	0,4	0,8	2,0	0,7
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,8	2,7	1,4	1,8	2,8	3,6	2,7
Lanaudière							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	3 159	5 543	1 196	1 723	2 519	3 264	8 702
% de l'ensemble	21,0 %	32,6 %	10,8 %	23,8 %	31,7 %	56,7 %	27,2 %
cinq ordonnances actives	630	1 058	24	102	465	1 097	1 688
% de l'ensemble	4,2 %	6,2 %	0,2 %	1,4 %	5,9 %	19,1 %	5,3 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,6	0,9	0,2	0,4	0,9	2,2	0,8
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	3,0	2,8	1,4	1,9	2,9	3,9	2,9
Montérégie							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	8 695	15 708	3 293	4 802	7 493	8 815	24 403
% de l'ensemble	20,7 %	32,9 %	10,7 %	23,0 %	33,5 %	55,9 %	27,2 %
cinq ordonnances actives	1 514	2 650	37	283	1 298	2 546	4 164
% de l'ensemble	3,6 %	5,5 %	0,1 %	1,4 %	5,8 %	16,1 %	4,6 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,6	0,9	0,1	0,4	1,0	2,1	0,8
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,8	2,7	1,4	1,9	2,9	3,7	2,8

Tableau 4 (suite)

	HOMMES ET FEMMES						
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Outaouais							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	2 780	4 589	1 036	1 541	2 319	2 473	7 369
% de l'ensemble	18,4%	28,3%	9,3%	19,4%	30,1%	54,1%	23,5%
cinq ordonnances actives	531	829	8	103	456	793	1 360
% de l'ensemble	3,5%	5,1%	0,1%	1,3%	5,9%	17,3%	4,4%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,5	0,8	0,1	0,4	0,9	2,1	0,7
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,9	2,7	1,4	1,9	2,9	3,8	2,8
Abitibi-Témiscamingue							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	1 274	2 296	482	694	1 114	1 280	3 570
% de l'ensemble	20,7%	35,4%	11,8%	23,5%	33,6%	55,7%	28,2%
cinq ordonnances actives	225	367	4	34	184	370	592
% de l'ensemble	3,7%	5,7%	0,1%	1,2%	5,6%	16,1%	4,7%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,6	0,9	0,2	0,4	0,9	2,0	0,8
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,8	2,7	1,3	1,9	2,8	3,6	2,7
Côte-Nord							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	788	1 553	301	594	673	773	2 341
% de l'ensemble	19,6%	34,8%	10,9%	26,4%	32,2%	56,4%	27,6%
cinq ordonnances actives	141	247	3	37	116	232	388
% de l'ensemble	3,5%	5,5%	0,1%	1,7%	5,5%	16,9%	4,6%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,5	0,9	0,2	0,5	0,9	2,1	0,7
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,8	2,6	1,4	1,8	2,7	3,6	2,6
Nord-du-Québec							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	70	153	33	43	68	79	223
% de l'ensemble	16,6%	33,7%	11,2%	21,3%	28,9%	54,9%	25,5%
cinq ordonnances actives	10	23	0	2	10	21	33
% de l'ensemble	2,4%	5,1%	—	1,0%	4,3%	14,6%	3,8%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,4	0,9	0,1	0,4	0,7	2,0	0,7
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,7	2,5	1,3	1,9	2,5	3,6	2,6

Tableau 4 (suite)

	HOMMES ET FEMMES						
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	4	4	1	0	4	3	8
% de l'ensemble	0,4 %	0,3 %	0,1 %	—	1,8 %	2,1 %	0,4 %
cinq ordonnances actives	1	0	0	0	1	0	1
% de l'ensemble	0,1 %	—	—	—	0,5 %	—	*
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	*	*	*	0	0,1	0,1	*
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	3,5	1,3	1,0	0	2,8	2,3	2,4
Région indéterminée							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	742	1 188	389	466	600	475	1 930
% de l'ensemble	13,1 %	20,5 %	8,2 %	15,0 %	22,4 %	50,8 %	16,8 %
cinq ordonnances actives	116	134	5	26	76	143	250
% de l'ensemble	2,1 %	2,3 %	0,1 %	0,8 %	2,8 %	15,3 %	2,2 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,3	0,5	0,1	0,3	0,6	1,9	0,4
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,5	2,3	1,4	1,7	2,5	3,7	2,4

Tableau 5

**Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants
selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge,
régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998**

HOMMES ET FEMMES														
Nombre d'ordonnances actives	Hommes		Femmes		0-19 ans		20-34 ans		35-49 ans		50-64 ans		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	24 243	35,7	46 714	41,2	17 236	76,0	19 442	57,9	19 900	34,5	14 379	21,4	70 957	39,1
2	14 218	20,9	22 462	19,8	3 818	16,8	6 508	19,4	12 876	22,3	13 478	20,0	36 680	20,2
3	10 034	14,8	14 544	12,8	1 078	4,8	3 476	10,4	8 865	15,4	11 159	16,6	24 578	13,6
4	6 931	10,2	9 619	8,5	318	1,4	1 923	5,7	5 851	10,1	8 458	12,6	16 550	9,1
5	4 613	6,8	6 832	6,0	124	0,6	1 049	3,1	3 909	6,8	6 363	9,5	11 445	6,3
6	2 893	4,3	4 571	4,0	65	0,3	527	1,6	2 444	4,2	4 428	6,6	7 464	4,1
7	1 822	2,7	3 054	2,7	20	0,1	303	0,9	1 427	2,5	3 126	4,7	4 876	2,7
8	1 160	1,7	1 998	1,8	11	0,1	149	0,4	967	1,7	2 031	3,0	3 158	1,7
9	711	1,1	1 339	1,2	2	*	97	0,3	558	1,0	1 393	2,1	2 050	1,1
10 ou plus	1 262	1,9	2 271	2,0	6	*	121	0,4	953	1,7	2 453	3,7	3 533	2,0
Sous-total (1 à 4)	55 426	81,6	93 339	82,3	22 450	99,0	31 349	93,3	47 492	82,2	47 474	70,6	148 765	82,1
Sous-total (5 ou plus)	12 461	18,4	20 065	17,7	228	1,0	2 246	6,7	10 258	17,8	19 794	29,4	32 526	17,9
Total	67 887	100	113 404	100	22 678	100	33 595	100	57 750	100	67 268	100	181 291	100
		(37,4)		(62,6)		(12,5)		(18,5)		(31,9)		(37,1)		(100)

Tableau 6

Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants (%) selon le nombre d'ordonnances actives et la région sociosanitaire et taux d'ordonnances actives pour 1000 participants selon la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Nombre d'ordonnances actives	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Bas-Saint-Laurent	Saguenay-Lac-Saint-Jean	Québec
1	38,8 %	35,1 %	37,1 %	36,0 %
2	20,3 %	19,9 %	20,6 %	20,2 %
3	14,2 %	14,5 %	13,7 %	14,1 %
4	8,6 %	10,0 %	9,4 %	9,5 %
5 ou plus	18,1 %	20,5 %	19,2 %	20,2 %
Taux d'ordonnances pour 1 000 prestataires participants	2 809	2 967	2 871	2 956

	Chaudière-Appalaches	Mauricie-Bois-Francs	Estrie	Montréal-Centre
1	37,1 %	38,5 %	39,9 %	39,5 %
2	19,8 %	20,3 %	19,9 %	20,7 %
3	14,2 %	14,2 %	13,3 %	13,4 %
4	9,6 %	9,4 %	8,6 %	9,1 %
5 ou plus	19,3 %	17,6 %	18,3 %	17,4 %
Taux d'ordonnances pour 1 000 prestataires participants	2 902	2 769	2 790	2 758

	Laval	Laurentides	Lanaudière	Montérégie
1	40,8 %	41,4 %	39,2 %	40,2 %
2	21,3 %	20,0 %	19,8 %	19,8 %
3	13,1 %	13,0 %	12,9 %	13,6 %
4	8,5 %	8,7 %	8,7 %	9,4 %
5 ou plus	16,3 %	16,9 %	19,4 %	17,1 %
Taux d'ordonnances pour 1 000 prestataires participants	2 668	2 717	2 862	2 747

Tableau 6 (suite)

Nombre d'ordonnances actives	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec
1	40,6 %	40,1 %	42,8 %	39,5 %
2	18,7 %	21,7 %	20,6 %	24,2 %
3	13,1 %	12,8 %	12,7 %	13,0 %
4	9,2 %	8,8 %	7,4 %	8,5 %
5 ou plus	18,5 %	16,6 %	16,6 %	14,8 %
Taux d'ordonnances pour 1 000 prestataires participants	2 805	2 689	2 622	2 578

	Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James	Indéterminée	
1	62,5 %	49,5 %	
2	12,5 %	19,2 %	
3	0,0 %	11,5 %	
4	12,5 %	6,8 %	
5 ou plus	12,5 %	13,0 %	
Taux d'ordonnances pour 1 000 prestataires participants	2 375	2 367	

Tableau 7

Pourcentage des prestataires d'assistance-emploi assurés ayant au moins une ordonnance active selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Classes de médicaments	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Anti-infectieux	1,9%	2,4%	2,1%	2,0%	2,1%	2,4%	2,2%
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	4,2%	4,5%	1,4%	3,2%	6,2%	8,5%	4,4%
– sympathomimétiques	1,7%	2,4%	1,3%	1,5%	2,1%	4,2%	2,1%
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	2,8%	2,4%	0,1%	1,8%	4,5%	5,5%	2,6%
Cardiovasculaires	5,9%	7,4%	0,1%	1,2%	6,7%	25,5%	6,7%
– cardiotropes	3,2%	3,8%	0,1%	0,7%	3,4%	13,7%	3,5%
– hypolipémiants	2,5%	2,9%	*	0,3%	2,6%	10,8%	2,7%
– antihypertenseurs	2,6%	3,1%	0,1%	0,4%	2,7%	11,2%	2,9%
– vasodilatateurs	0,9%	0,7%	*	*	0,5%	3,4%	0,8%
Médicaments du système nerveux central (SNC)	13,4%	16,2%	2,5%	9,2%	21,4%	34,6%	14,8%
– analgésiques et antipyrétiques	4,0%	4,7%	0,4%	1,2%	4,7%	15,1%	4,4%
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	3,1%	3,3%	0,1%	0,7%	3,3%	11,7%	3,2%
• autres analgésiques et antipyrétiques	1,3%	1,9%	0,3%	0,5%	1,9%	5,0%	1,6%
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	2,2%	2,0%	0,4%	2,3%	3,3%	3,0%	2,1%
– psychotropes	5,6%	7,5%	0,3%	5,1%	11,4%	12,7%	6,6%
• antidépresseurs	2,6%	5,5%	0,2%	2,8%	6,8%	8,9%	4,1%
• tranquillisants	3,6%	2,7%	0,2%	2,8%	5,8%	5,0%	3,1%
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	6,9%	9,8%	0,3%	4,3%	12,8%	21,7%	8,4%
• benzodiazépines	6,4%	9,3%	0,2%	4,0%	12,1%	20,9%	7,9%
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	1,0%	1,1%	0,1%	0,6%	1,8%	2,2%	1,0%
– autres psychotropes	0,7%	0,9%	*	0,5%	1,5%	1,4%	0,8%
Électrolytes-diurétiques	1,4%	2,9%	*	0,3%	2,0%	8,6%	2,2%
– diurétiques	1,4%	2,8%	*	0,3%	1,9%	8,4%	2,1%
– autres électrolytes-diurétiques	0,3%	0,4%	*	0,1%	0,3%	1,2%	0,3%
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	0,8%	1,2%	0,6%	0,7%	1,1%	2,0%	1,0%
Gastro-intestinaux	2,6%	3,5%	0,2%	1,4%	4,0%	9,1%	3,1%
– divers gastro-intestinaux	2,5%	3,3%	0,2%	1,2%	3,8%	8,9%	2,9%
• anti-ulcéreux	2,2%	3,0%	0,1%	1,0%	3,4%	8,1%	2,6%
• agents de motilité ou prokinétiques	0,4%	0,7%	0,1%	0,2%	0,7%	1,7%	0,6%
– autres gastro-intestinaux	0,1%	0,2%	0,1%	0,2%	0,2%	0,4%	0,2%
Hormones et substituts	4,1%	17,6%	3,7%	9,8%	10,3%	27,1%	11,0%
– corticostéroïdes	1,4%	2,0%	1,2%	1,0%	1,8%	3,6%	1,7%
– anovulants	–	5,0%	2,3%	6,7%	2,3%	0,1%	3,3%
– hypoglycémiant	2,0%	2,2%	0,1%	0,6%	2,3%	7,4%	2,1%
– thyroïdiens	0,8%	3,7%	0,1%	1,2%	2,9%	6,6%	2,3%
– autres hormones et substituts	0,1%	7,3%	0,2%	0,8%	3,4%	14,9%	3,8%
Dermatologie	1,0%	1,4%	0,8%	0,9%	1,4%	2,2%	1,2%
– anti-inflammatoires	0,7%	0,9%	0,5%	0,5%	0,9%	1,6%	0,8%
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	0,4%	0,6%	0,4%	0,4%	0,6%	0,9%	0,5%
Spasmolytiques	0,4%	0,6%	*	0,2%	0,6%	1,7%	0,5%
– respiratoires	0,3%	0,4%	*	0,1%	0,3%	1,3%	0,3%
Classe Autres médicaments	0,8%	0,9%	0,3%	0,5%	0,9%	2,5%	0,9%
Médicaments des autres classes regroupées	2,0%	2,8%	0,9%	1,4%	2,8%	6,2%	2,4%
Ensemble des médicaments	20,8%	32,4%	10,3%	21,6%	32,5%	55,1%	26,8%

Tableau 7 (suite)

Classes de médicaments	HOMMES				FEMMES			
	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans
Anti-infectieux	2,0 %	1,6 %	2,0 %	2,1 %	2,2 %	2,3 %	2,2 %	2,8 %
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	1,5 %	3,6 %	6,1 %	7,5 %	1,4 %	2,8 %	6,4 %	9,3 %
– sympathomimétiques	1,4 %	1,2 %	1,5 %	3,5 %	1,3 %	1,7 %	2,7 %	4,8 %
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	0,1 %	2,5 %	4,8 %	5,2 %	0,1 %	1,2 %	4,1 %	5,7 %
Cardiovasculaires	0,2 %	1,3 %	6,1 %	22,3 %	0,1 %	1,2 %	7,3 %	28,4 %
– cardiotropes	0,1 %	0,7 %	3,1 %	12,8 %	0,1 %	0,6 %	3,7 %	14,5 %
– hypolipémiantes	*	0,3 %	2,7 %	9,9 %	*	0,3 %	2,4 %	11,6 %
– antihypertenseurs	0,1 %	0,5 %	2,5 %	10,3 %	*	0,4 %	2,9 %	12,1 %
– vasodilatateurs	*	*	0,6 %	3,9 %	*	*	0,5 %	2,8 %
Médicaments du système nerveux central (SNC)	3,3 %	9,6 %	18,8 %	29,4 %	1,7 %	8,9 %	24,0 %	39,3 %
– analgésiques et antipyrétiques	0,3 %	1,0 %	4,1 %	14,5 %	0,5 %	1,3 %	5,3 %	15,5 %
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	0,1 %	0,6 %	3,0 %	12,2 %	0,2 %	0,8 %	3,5 %	11,3 %
• autres analgésiques et antipyrétiques	0,2 %	0,5 %	1,5 %	3,8 %	0,3 %	0,6 %	2,3 %	6,1 %
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	0,4 %	2,7 %	3,4 %	2,9 %	0,4 %	2,0 %	3,3 %	3,0 %
– psychotropes	0,3 %	5,6 %	9,8 %	9,2 %	0,3 %	4,7 %	12,9 %	15,8 %
• antidépresseurs	0,1 %	2,1 %	4,3 %	5,2 %	0,2 %	3,4 %	9,2 %	12,1 %
• tranquillisants	0,2 %	4,1 %	6,5 %	4,8 %	0,1 %	1,8 %	5,1 %	5,1 %
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	0,3 %	4,5 %	10,8 %	16,7 %	0,3 %	4,2 %	14,7 %	26,2 %
• benzodiazépines	0,2 %	4,2 %	10,1 %	15,9 %	0,2 %	3,9 %	14,1 %	25,4 %
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	0,2 %	0,7 %	1,7 %	1,9 %	0,1 %	0,5 %	1,8 %	2,5 %
– autres psychotropes	*	0,6 %	1,3 %	1,1 %	*	0,5 %	1,7 %	1,6 %
Électrolytes-diurétiques	*	0,3 %	1,3 %	5,9 %	*	0,4 %	2,8 %	11,0 %
– diurétiques	*	0,2 %	1,2 %	5,7 %	*	0,3 %	2,6 %	10,8 %
– autres électrolytes-diurétiques	*	0,1 %	0,3 %	1,0 %	*	0,1 %	0,3 %	1,4 %
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	0,6 %	0,5 %	0,8 %	1,6 %	0,7 %	0,8 %	1,4 %	2,4 %
Gastro-intestinal	0,2 %	1,3 %	3,4 %	7,7 %	0,2 %	1,5 %	4,5 %	10,4 %
– divers gastro-intestinaux	0,1 %	1,1 %	3,2 %	7,5 %	0,2 %	1,2 %	4,3 %	10,1 %
• anti-ulcéreux	0,1 %	1,0 %	3,0 %	6,9 %	0,1 %	1,0 %	3,9 %	9,1 %
• agents de motilité ou prokinétiques	0,1 %	0,2 %	0,5 %	1,2 %	0,1 %	0,3 %	0,9 %	2,2 %
– autres gastro-intestinaux	*	0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,1 %	0,3 %	0,2 %	0,4 %
Hormones et substituts	1,4 %	1,9 %	4,3 %	11,6 %	6,1 %	16,2 %	16,1 %	40,8 %
– corticostéroïdes	1,2 %	0,8 %	1,2 %	3,0 %	1,1 %	1,2 %	2,3 %	4,3 %
– anovulants	–	–	–	–	4,5 %	12,1 %	2,3 %	0,1 %
– hypoglycémiantes	0,1 %	0,6 %	2,2 %	7,3 %	0,1 %	0,6 %	2,4 %	7,4 %
– thyroïdiens	0,1 %	0,5 %	1,0 %	2,1 %	0,2 %	1,8 %	4,7 %	10,6 %
– autres hormones et substituts	*	0,1 %	0,2 %	0,2 %	0,3 %	1,4 %	6,6 %	27,9 %
Dermatologie	0,8 %	0,7 %	1,1 %	1,9 %	0,9 %	1,0 %	1,6 %	2,4 %
– anti-inflammatoires	0,5 %	0,4 %	0,7 %	1,3 %	0,5 %	0,6 %	1,0 %	1,7 %
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	0,4 %	0,3 %	0,5 %	0,7 %	0,5 %	0,5 %	0,7 %	1,0 %
Spasmolytiques	*	0,2 %	0,4 %	1,4 %	0,1 %	0,2 %	0,7 %	2,0 %
– respiratoires	*	0,1 %	0,3 %	1,2 %	*	0,1 %	0,4 %	1,4 %
Classe Autres médicaments	0,3 %	0,4 %	0,8 %	2,4 %	0,3 %	0,5 %	0,9 %	2,5 %
Médicaments des autres classes regroupées	0,8 %	1,1 %	2,3 %	5,2 %	0,9 %	1,6 %	3,3 %	7,1 %
Ensemble des médicaments	8,7 %	14,5 %	26,3 %	43,6 %	11,8 %	27,3 %	38,6 %	65,4 %

Tableau 8

Répartition des ordonnances actives chez les prestataires d'assistance-emploi participants selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Classes de médicaments	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Anti-infectieux	4,8%	3,0%	15,9%	6,6%	3,6%	1,4%	3,7%
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	7,8%	5,6%	10,6%	8,0%	7,3%	5,0%	6,5%
– sympathomimétiques	3,1%	2,8%	9,9%	3,7%	2,4%	2,2%	2,9%
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	4,8%	2,8%	0,7%	4,4%	4,9%	2,8%	3,6%
Cardiovasculaires	17,5%	12,7%	1,2%	3,7%	10,9%	21,5%	14,6%
– cardiotropes	6,4%	4,8%	0,5%	1,7%	4,2%	7,8%	5,4%
– hypolipémiants	4,4%	3,3%	0,1%	0,7%	2,9%	5,5%	3,7%
– antihypertenseurs	5,0%	3,8%	0,6%	1,2%	3,2%	6,3%	4,3%
– vasodilatateurs	1,7%	0,8%	*	0,1%	0,7%	1,9%	1,2%
Médicaments du système nerveux central (SNC)	43,1%	35,3%	21,7%	41,8%	47,6%	33,3%	38,3%
– analgésiques et antipyrétiques	7,8%	6,2%	2,8%	3,2%	5,9%	8,8%	6,8%
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	5,5%	3,8%	0,9%	1,8%	3,7%	6,1%	4,5%
• autres analgésiques et antipyrétiques	2,3%	2,3%	1,9%	1,4%	2,3%	2,7%	2,3%
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	5,3%	3,2%	3,5%	8,2%	5,3%	2,1%	4,0%
– psychotropes	12,5%	10,7%	2,6%	16,2%	16,3%	7,9%	11,4%
• antidépresseurs	4,8%	7,0%	1,3%	7,6%	8,5%	4,9%	6,2%
• tranquillisants	7,6%	3,7%	1,3%	8,6%	7,9%	3,1%	5,2%
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	15,0%	14,0%	2,4%	12,7%	18,2%	13,7%	14,4%
• benzodiazépines	13,1%	12,7%	1,4%	11,2%	16,2%	12,6%	12,9%
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	1,8%	1,3%	1,1%	1,4%	2,1%	1,2%	1,5%
– autres psychotropes	1,2%	1,1%	0,1%	1,5%	1,8%	0,8%	1,1%
Électrolytes-diurétiques	2,9%	3,6%	0,4%	0,9%	2,5%	4,9%	3,4%
– diurétiques	2,5%	3,2%	0,3%	0,7%	2,2%	4,3%	2,9%
– autres électrolytes-diurétiques	0,5%	0,4%	0,1%	0,2%	0,3%	0,6%	0,4%
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	1,5%	1,5%	4,7%	1,7%	1,3%	1,2%	1,5%
Gastro-intestinal	5,0%	4,6%	1,7%	3,8%	5,0%	5,3%	4,8%
– divers gastro-intestinaux	4,7%	4,3%	1,2%	3,2%	4,7%	5,0%	4,5%
• anti-ulcéreux	3,9%	3,4%	0,7%	2,4%	3,8%	4,1%	3,6%
• agents de motilité ou prokinétiques	0,7%	0,8%	0,3%	0,6%	0,8%	0,9%	0,8%
– Autres gastro-intestinaux	0,3%	0,3%	0,4%	0,5%	0,2%	0,2%	0,3%
Hormones et substituts	9,3%	26,7%	28,1%	26,1%	15,0%	20,7%	20,0%
– corticostéroïdes	2,6%	2,4%	8,8%	2,5%	2,0%	1,9%	2,5%
– anovulants	–	5,6%	16,2%	16,2%	2,1%	*	5,0%
– hypoglycémiant	5,2%	3,7%	1,1%	2,2%	3,8%	5,6%	4,3%
– thyroïdiens	1,3%	4,3%	0,9%	3,1%	3,2%	3,4%	3,1%
– autres hormones et substituts	0,2%	10,7%	1,1%	2,0%	4,7%	9,8%	6,7%
Dermatologie	2,1%	1,8%	6,7%	2,4%	1,8%	1,3%	1,9%
– anti-inflammatoires	1,3%	1,1%	3,6%	1,3%	1,1%	0,9%	1,2%
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	0,8%	0,7%	3,0%	1,0%	0,7%	0,5%	0,8%
Spasmolytiques	0,7%	0,7%	0,3%	0,4%	0,6%	0,9%	0,7%
– respiratoires	0,5%	0,4%	*	0,2%	0,4%	0,6%	0,5%
Classe Autres médicaments	1,7%	1,1%	2,3%	1,3%	1,1%	1,4%	1,3%
Médicaments des autres classes regroupées	3,7%	3,3%	6,4%	3,4%	3,2%	3,2%	3,4%
Ensemble des médicaments	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nombre d'ordonnances actives	194 141	311 983	30 697	64 563	163 990	246 874	506 124

Tableau 8 (suite)

Classes de médicaments	HOMMES				FEMMES			
	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans
Anti-infectieux	17,1 %	8,0 %	5,2 %	1,7 %	14,9 %	5,7 %	2,5 %	1,3 %
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	12,4 %	10,9 %	8,5 %	5,8 %	9,1 %	6,3 %	6,6 %	4,5 %
– sympathomimétiques	11,4 %	3,7 %	2,1 %	2,4 %	8,7 %	3,7 %	2,6 %	2,1 %
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	1,0 %	7,2 %	6,4 %	3,4 %	0,4 %	2,6 %	3,9 %	2,4 %
Cardiovasculaires	1,7 %	4,9 %	13,0 %	26,7 %	0,8 %	3,0 %	9,5 %	18,5 %
– cardiotropes	0,6 %	2,2 %	4,6 %	9,7 %	0,4 %	1,4 %	3,8 %	6,8 %
– hypolipémiants	0,1 %	1,0 %	3,6 %	6,5 %	0,1 %	0,6 %	2,3 %	4,9 %
– antihypertenseurs	0,9 %	1,7 %	3,7 %	7,6 %	0,3 %	0,9 %	2,9 %	5,5 %
– vasodilatateurs	*	0,1 %	1,0 %	3,0 %	*	*	0,5 %	1,3 %
Médicaments du système nerveux central (SNC)	32,2 %	55,2 %	50,8 %	35,7 %	13,4 %	33,8 %	45,4 %	31,9 %
– analgésiques et antipyrétiques	2,5 %	3,3 %	6,2 %	11,0 %	3,0 %	3,1 %	5,7 %	7,6 %
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	0,6 %	1,8 %	4,0 %	8,3 %	1,1 %	1,8 %	3,4 %	4,9 %
• autres analgésiques et antipyrétiques	1,9 %	1,5 %	2,2 %	2,7 %	1,9 %	1,3 %	2,3 %	2,7 %
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	4,4 %	11,8 %	6,6 %	2,7 %	2,7 %	6,1 %	4,4 %	1,7 %
– psychotropes	3,4 %	22,0 %	17,4 %	7,6 %	2,0 %	12,7 %	15,6 %	8,1 %
• antidépresseurs	1,2 %	6,8 %	6,4 %	3,7 %	1,4 %	8,0 %	9,9 %	5,5 %
• tranquillisants	2,2 %	15,2 %	11,0 %	3,9 %	0,6 %	4,7 %	5,7 %	2,5 %
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	3,0 %	16,1 %	18,7 %	13,7 %	2,0 %	10,6 %	17,9 %	13,8 %
• benzodiazépines	1,7 %	14,0 %	16,2 %	12,4 %	1,1 %	9,6 %	16,1 %	12,7 %
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	1,3 %	2,1 %	2,5 %	1,3 %	0,9 %	1,1 %	1,8 %	1,1 %
– autres psychotropes	0,1 %	1,9 %	1,8 %	0,8 %	0,1 %	1,2 %	1,7 %	0,7 %
Électrolytes-diurétiques	0,4 %	1,0 %	2,0 %	4,5 %	0,3 %	0,9 %	2,9 %	5,2 %
– diurétiques	0,3 %	0,7 %	1,6 %	3,9 %	0,3 %	0,7 %	2,5 %	4,6 %
– autres électrolytes-diurétiques	0,1 %	0,2 %	0,4 %	0,7 %	0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,6 %
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	5,1 %	1,6 %	1,1 %	1,3 %	4,4 %	1,8 %	1,5 %	1,2 %
Gastro-intestinal	1,8 %	4,2 %	5,1 %	5,7 %	1,6 %	3,6 %	5,0 %	5,1 %
– divers gastro-intestinaux	1,3 %	3,7 %	4,7 %	5,4 %	1,2 %	2,9 %	4,7 %	4,8 %
• anti-ulcéreux	0,8 %	2,9 %	3,9 %	4,6 %	0,7 %	2,2 %	3,7 %	3,8 %
• agents de motilité ou prokinétiques	0,4 %	0,6 %	0,7 %	0,8 %	0,3 %	0,5 %	0,8 %	0,9 %
– autres gastro-intestinaux	0,4 %	0,3 %	0,2 %	0,2 %	0,4 %	0,5 %	0,2 %	0,2 %
Hormones et substituts	12,4 %	6,9 %	7,6 %	10,7 %	40,8 %	37,5 %	20,2 %	26,4 %
– corticostéroïdes	10,5 %	2,3 %	1,7 %	2,0 %	7,4 %	2,7 %	2,3 %	1,9 %
– anovulants	–	–	–	–	29,3 %	25,8 %	2,1 %	*
– hypoglycémiant	1,1 %	2,7 %	4,3 %	7,2 %	1,1 %	2,0 %	3,4 %	4,7 %
– thyroïdiens	0,5 %	1,5 %	1,4 %	1,4 %	1,3 %	4,1 %	4,5 %	4,5 %
– autres hormones et substituts	0,3 %	0,4 %	0,2 %	0,1 %	1,8 %	3,0 %	7,8 %	15,4 %
Dermatologie	6,9 %	2,3 %	1,8 %	1,5 %	6,5 %	2,4 %	1,8 %	1,2 %
– anti-inflammatoires	3,9 %	1,2 %	1,1 %	1,0 %	3,4 %	1,4 %	1,1 %	0,8 %
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	3,0 %	1,0 %	0,6 %	0,5 %	3,1 %	1,0 %	0,7 %	0,4 %
Spasmodiques	0,3 %	0,4 %	0,5 %	0,9 %	0,3 %	0,4 %	0,7 %	0,8 %
– respiratoires	*	0,3 %	0,3 %	0,8 %	*	0,2 %	0,4 %	0,6 %
Classe Autres médicaments	2,7 %	1,6 %	1,3 %	1,8 %	2,0 %	1,1 %	1,0 %	1,1 %
Médicaments des autres classes regroupées	7,1 %	3,1 %	3,2 %	3,7 %	5,9 %	3,6 %	3,2 %	2,9 %
Ensemble des médicaments	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Nombre d'ordonnances actives	13 699	24 115	66 851	89 476	16 998	40 448	97 139	157 398

Tableau 9

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 prestataires d'assistance-emploi assurés selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Classes de médicaments	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Anti-infectieux	29	26	22	27	33	29	27
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	46	50	15	33	68	101	48
– sympathomimétiques	18	25	14	15	22	45	22
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	28	25	1	18	45	56	27
Cardiovasculaires	104	113	2	15	101	434	109
– cardiotropes	38	43	1	7	38	158	40
– hypolipémiants	26	29	*	3	26	110	28
– antihypertenseurs	30	34	1	5	30	127	32
– vasodilatateurs	10	7	*	*	6	39	9
Médicaments du système nerveux central (SNC)	256	315	30	173	440	673	287
– analgésiques et antipyrétiques	46	55	4	13	55	178	51
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	33	34	1	8	34	124	33
• autres analgésiques et antipyrétiques	14	21	3	6	21	54	17
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	31	28	5	34	49	42	30
– psychotropes	74	95	4	67	151	160	85
• antidépresseurs	29	62	2	31	78	98	46
• tranquillisants	45	33	2	36	73	62	39
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	89	125	3	52	168	278	108
• benzodiazépines	78	113	2	47	149	254	96
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	11	11	1	6	19	24	11
– autres psychotropes	7	10	*	6	16	15	8
Électrolytes-diurétiques	17	32	*	4	23	100	25
– diurétiques	15	29	*	3	20	87	22
– autres électrolytes-diurétiques	3	4	*	1	3	12	3
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	9	13	7	7	12	24	11
Gastro-intestinaux	30	41	2	16	46	107	36
– divers gastro-intestinaux	28	39	2	13	43	102	33
• anti-ulcéreux	23	30	1	10	35	83	27
• agents de motilité ou prokinétiques	4	7	*	2	7	17	6
– autres gastro-intestinaux	1	2	1	2	2	4	2
Hormones et substituts	55	238	39	108	139	419	150
– corticostéroïdes	15	21	12	11	19	39	18
– anovulants	–	50	22	67	12	*	26
– hypoglycémiant	31	33	1	9	35	113	32
– thyroïdiens	8	38	1	13	30	68	23
– autres hormones et substituts	1	95	2	8	44	199	50
Dermatologie	12	16	9	10	16	27	14
– anti-inflammatoires	7	10	5	5	10	18	9
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	5	6	4	4	6	9	6
Spasmolytiques	4	6	*	2	6	17	5
– respiratoires	3	4	*	1	3	13	3
Classe Autres médicaments	10	10	3	5	10	27	10
Médicaments des autres classes regroupées	22	29	9	14	30	65	26
Ensemble des médicaments	595	892	139	414	924	2 023	748

Tableau 10

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 prestataires d'assistance-emploi assurés selon les classes de médicaments et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Classe de médicaments	RÉGION SOCIOSANITAIRE																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	99	
Anti-infectieux	21	22	28	22	26	34	25	22	19	7	23	25	24	24	23	25	0	25	
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	58	60	56	50	41	46	43	49	48	38	51	57	43	54	46	50	*	24	
– sympathomimétiques	26	29	26	22	18	19	23	22	27	26	27	24	20	26	24	23	*	14	
– autres médicaments du système nerveux (SNA)	33	31	30	29	23	27	20	27	21	11	24	34	24	28	22	27	*	10	
Cardiovasculaires	162	164	139	133	124	80	94	110	126	120	152	154	93	128	107	111	2	55	
– cardiotropes	58	62	51	48	44	30	34	37	49	51	55	56	36	47	40	43	0	21	
– hypolipémiants	49	45	40	35	32	19	22	29	33	27	38	44	22	33	26	26	1	13	
– antihypertenseurs	41	45	37	39	38	25	29	36	33	32	44	42	29	36	32	34	0	16	
– vasodilatateurs	14	12	11	12	10	6	9	9	12	9	15	12	7	11	10	8	*	4	
Médicaments du système nerveux central (SNC)	394	354	392	332	322	247	253	285	241	186	323	418	248	280	253	280	3	135	
– analgésiques et antipyrétiques	78	67	63	60	60	40	46	55	47	45	69	64	46	57	48	51	2	29	
• anti-inflammatoires non stéroïdiens	48	45	39	41	41	25	31	39	36	31	45	39	29	40	35	36	2	17	
• autres analgésiques et antipyrétiques	30	22	24	19	19	15	15	17	10	14	24	25	17	18	14	16	*	12	
– anticonvulsifs (sauf les benzodiazépines)	41	40	38	30	31	28	25	28	29	31	33	46	27	23	23	30	*	13	
– psychotropes	102	101	113	96	100	80	79	81	53	54	77	118	76	77	76	81	0	39	
• antidépresseurs	58	63	62	54	59	38	51	49	30	37	46	62	37	43	45	45	0	26	
• tranquillisants	44	38	51	42	42	42	28	32	23	17	31	56	39	33	30	36	*	14	
– anxiolytiques, sédatifs, hypnotiques	156	128	161	131	114	89	94	104	101	50	130	172	87	108	93	103	0	46	
• benzodiazépines	140	111	142	119	99	79	83	96	95	49	119	154	80	98	85	93	0	41	
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	15	18	19	12	15	10	10	9	6	1	12	18	6	10	7	9	*	5	
– autres psychotropes	11	12	11	9	9	8	5	9	7	6	9	11	8	9	8	8	*	4	
Électrolytes diurétiques	29	26	27	29	23	23	25	22	19	25	32	30	26	29	26	26	*	13	
– diurétiques	27	23	25	26	19	20	21	19	17	22	28	28	22	25	22	22	*	11	
– autres électrolytes-diurétiques	2	3	2	3	3	3	4	3	2	3	3	2	4	4	4	4	*	2	
Oto-rhino-laryngologie	11	8	16	10	11	12	9	9	9	8	12	15	11	11	10	11	0	9	
Gastro-intestinaux	58	52	47	39	48	28	38	41	42	35	61	49	28	34	33	32	0	18	
– divers gastro-intestinaux	54	48	42	36	45	25	36	38	37	33	56	44	24	30	31	30	0	15	
• anti-ulcéreux	43	39	35	29	36	21	29	33	31	27	44	35	20	25	25	25	0	13	
• agents de motilité ou prokinétique	11	9	7	6	9	4	6	6	6	6	13	9	4	5	5	5	*	2	
– autres gastro-intestinaux	3	3	4	3	2	3	2	2	3	2	4	4	3	3	2	2	*	2	
Hormones et substituts	203	215	181	177	157	117	127	172	170	191	199	207	136	167	156	157	1	84	
– corticostéroïdes	21	23	23	21	16	15	17	19	24	23	24	21	16	23	20	20	*	12	
– anovulants	35	34	28	33	26	17	25	35	45	47	35	35	25	32	29	30	*	19	
– hypoglycémiant	33	29	35	39	34	30	31	31	24	24	43	37	28	35	32	34	*	18	
– thyroïdiens	35	29	29	24	26	20	19	27	27	33	25	37	24	23	23	24	*	13	
– autres hormones et substituts	79	100	66	59	55	35	36	60	51	64	72	76	43	53	52	49	1	21	

Tableau 10 (suite)

Classe de médicaments	RÉGION SOCIOSANITAIRE																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	99
Dermatologie	16	17	18	13	13	15	14	10	15	16	15	15	15	11	12	13	*	9
– anti-inflammatoires	10	11	11	8	7	9	8	6	10	7	10	9	9	7	7	8	*	7
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	6	6	6	5	6	6	5	4	5	9	5	6	6	4	5	6	*	2
Spasmolytiques	6	6	7	6	5	5	5	5	3	3	4	8	3	5	6	5	*	2
– respiratoires	4	3	4	4	3	3	4	3	2	1	4	5	2	4	4	4	*	1
Classe Autres médicaments	13	10	12	10	13	9	8	10	8	3	11	13	9	8	10	10	1	7
Médicaments des autres classes regroupées	30	26	29	29	26	25	21	24	23	24	33	31	24	26	21	25	0	19

Légende des régions sociosanitaires

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Bas-St-Laurent | 10. Nord-du-Québec |
| 2. Saguenay–Lac-St-Jean | 11. Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine |
| 3. Québec | 12. Chaudière-Appalaches |
| 4. Mauricie–Bois-Francs | 13. Laval |
| 5. Estrie | 14. Lanaudière |
| 6. Montréal-Centre | 15. Laurentides |
| 7. Outaouais | 16. Montérégie |
| 8. Abitibi-Témiscamingue | 20. Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James |
| 9. Côte-Nord | 99. Indéterminée |

Tableau 11

Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants¹ selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de prescripteurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Nombre d'ordonnances actives	NOMBRE DE PRESCRIPTEURS									
	1		2		3		4 ou plus		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	70 957	100,0	—	—	—	—	—	—	70 957	39,2
2	28 726	78,3	7 869	21,5	—	—	—	—	36 595	20,2
3	16 691	67,9	6 917	28,1	919	3,7	—	—	24 527	13,6
4	10 271	62,1	4 941	29,9	1 196	7,2	113	0,7	16 521	9,1
5	6 374	55,7	3 736	32,6	1 093	9,6	217	1,9	11 420	6,3
6	3 654	49,0	2 586	34,7	949	12,7	266	3,6	7 455	4,1
De 7 à 9	4 086	40,5	3 612	35,8	1 638	16,2	734	7,3	10 070	5,6
10 ou plus	1 063	30,1	1 105	31,3	740	21,0	622	17,6	3 530	2,0
Sous-total 1 à 4	126 645	85,1	19 727	13,3	2 115	1,4	113	0,1	148 600	82,1
Sous-total 5 ou plus	15 177	46,7	11 039	33,9	4 420	13,6	1 839	5,7	32 475	17,9
Total	141 822	78,3	30 766	17,0	6 535	3,6	1 952	1,1	181 075¹	100

¹ La répartition selon le nombre de prescripteurs n'a pu être faite pour 216 prestataires d'assurance-emploi participants, aucune donnée relativement aux prescripteurs n'étant disponible parce qu'ils exercent à l'extérieur du Québec et ne sont pas inscrits à la RAMQ, soit pour 85 prestataires qui ont deux ordonnances actives, 51 qui en ont trois, 29 qui en ont quatre, 25 qui en ont cinq, 9 qui en ont six, 14 qui en ont de sept à neuf et 3 qui en ont dix ou plus.

Tableau 12

Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de pharmaciens, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Nombre d'ordonnances actives	NOMBRE DE PHARMACIENS									
	1		2		3		4 ou plus		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	70 957	100,0	—	—	—	—	—	—	70 957	39,1
2	34 953	95,3	1 727	4,7	—	—	—	—	36 680	20,2
3	23 171	94,3	1 361	5,5	46	0,2	—	—	24 578	13,6
4	15 529	93,8	956	5,8	60	0,4	5	*	16 550	9,1
5	10 790	94,3	608	5,3	41	0,4	6	0,1	11 445	6,3
6	6 981	93,5	454	6,1	27	0,4	2	*	7 464	4,1
De 7 à 9	9 345	92,7	683	6,8	48	0,5	8	0,1	10 084	5,6
10 ou plus	3 227	91,3	286	8,1	17	0,5	3	0,1	3 533	2,0
Sous-total 1 à 4	144 610	97,2	4 044	2,7	106	0,1	5	*	148 765	82,1
Sous-total 5 ou plus	30 343	93,3	2 031	6,2	133	0,4	19	0,1	32 526	17,9
Total	174 953	96,5	6 075	3,4	239	0,1	24	*	181 291	100

Tableaux relatifs à la consommation médicamenteuse des prestataires d'assistance-emploi inscrits au régime d'assurance médicaments administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), 9 juin 1996

Tableau 1

Répartition des prestataires d'assistance-emploi assurés selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996

Tableau 2

Répartition des prestataires d'assistance-emploi assurés selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996

Tableau 3

Répartition des ordonnances actives chez les prestataires d'assistance-emploi selon le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996

Tableau 4

Principales caractéristiques de la consommation médicamenteuse des prestataires d'assistance-emploi assurés selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996

Tableau 5

Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996

Tableau 6

Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants (%) selon le nombre d'ordonnances actives et la région sociosanitaire et taux d'ordonnances actives pour 1 000 participants selon la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996

Tableau 7

Pourcentage des prestataires d'assistance-emploi assurés ayant au moins une ordonnance active selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996

Tableau 8

Répartition des ordonnances actives chez les prestataires d'assistance-emploi participants selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996

Tableau 9

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 prestataires d'assistance-emploi assurés selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996

Tableau 10

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 prestataires d'assistance-emploi assurés selon les classes de médicaments et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996

Tableau 11

Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de prescripteurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996

Tableau 12

Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de pharmaciens, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996

Tableau 1

Répartition des prestataires d'assistance-emploi assurés selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administrés par la RAMQ, 9 juin 1996

Région sociosanitaire	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	7 731	7 918	4 820	3 786	4 108	2 935	15 649 2,1%
Bas-Saint-Laurent	10 617	10 877	6 389	4 800	5 808	4 497	21 494 2,8%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	14 096	15 375	9 085	7 416	7 724	5 246	29 471 3,9%
Québec	27 946	28 740	15 782	14 716	15 279	10 909	56 686 7,4%
Chaudière-Appalaches	12 235	13 586	7 875	6 042	6 737	5 167	25 821 3,4%
Mauricie-Bois-Francs	25 421	27 645	16 735	12 459	13 797	10 075	53 066 7,0%
Estrie	13 913	14 588	9 550	7 030	7 236	4 685	28 501 3,7%
Montréal-Centre	124 660	127 408	85 521	66 347	63 310	36 890	252 068 33,1%
Laval	11 233	13 006	8 831	6 364	5 578	3 466	24 239 3,2%
Laurentides	20 238	22 205	14 880	10 677	10 267	6 619	42 443 5,6%
Lanaudière	17 372	19 437	13 417	9 149	8 513	5 730	36 809 4,8%
Montérégie	48 527	54 435	36 592	26 380	24 378	15 612	102 962 13,5%
Outaouais	16 138	17 100	11 865	9 310	7 495	4 568	33 238 4,4%
Abitibi-Témiscamingue	6 870	7 450	4 951	3 659	3 419	2 291	14 320 1,9%
Côte-Nord	4 320	5 048	3 255	2 578	2 114	1 421	9 368 1,2%
Nord-du-Québec	472	554	377	282	224	143	1 026 0,1%
Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James	1 107	1 306	1 302	759	195	157	2 413 0,3%
Région indéterminée	6 199	5 987	4 921	3 828	2 661	776	12 186 1,6%
Ensemble du Québec	369 095 48,5%	392 665 51,5%	256 148 33,6%	195 582 25,7%	188 843 24,8%	121 187 15,9%	761 760 100%

Tableau 2

Répartition des prestataires d'assistance-emploi assurés selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996

	HOMMES (ANS)					FEMMES (ANS)					HOMMES ET FEMMES (ANS)				
	0-19	20-34	35-49	50-64	Total	0-19	20-34	35-49	50-64	Total	0-19	20-34	35-49	50-64	Total
Aucune ordonnance active	118 453 91,4%	76 098 84,3%	65 162 70,4%	28 317 50,1%	288 030 78,0%	110 188 87,1%	69 574 66,1%	54 873 57,0%	19 800 30,6%	254 435 64,8%	228 641 89,3%	145 672 74,5%	120 035 63,6%	48 117 39,7%	542 465 71,2%
Au moins une ordonnance active	11 217 8,7%	14 214 15,7%	27 440 29,6%	28 194 49,9%	81 065 22,0%	16 290 12,9%	35 696 33,9%	41 368 43,0%	44 876 69,4%	138 230 35,2%	27 507 10,7%	49 910 25,5%	68 808 36,4%	73 070 60,3%	219 295 28,8%
Total	129 670 100% (35,1%)	90 312 100% (24,5%)	92 602 100% (25,1%)	56 511 100% (15,3%)	369 095 100% (100%)	126 478 100% (32,2%)	105 270 100% (26,8%)	96 241 100% (24,5%)	64 676 100% (16,5%)	392 665 100% (100%)	256 148 100% (33,6%)	195 582 100% (25,7%)	188 843 100% (24,8%)	121 187 100% (15,9%)	761 760 100% (100%)
Au moins cinq ordonnances actives	97 0,1%	1 150 1,3%	4 116 4,4%	7 128 12,6%	12 491 3,4%	81 0,1%	1 370 1,3%	6 310 6,6%	12 447 19,3%	20 208 5,2%	178 0,1%	2 520 1,3%	10 426 5,5%	19 575 16,2%	32 699 4,3%

Tableau 3

Répartition des ordonnances actives chez les prestataires d'assistance-emploi selon le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996

Ordonnances actives

HOMMES

	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Total	15 696	30 777	74 376	95 251	216 100 38,1%
Moyenne par prestataire assuré	0,1	0,3	0,8	1,7	0,6
Moyenne par prestataire participant	1,4	2,2	2,7	3,4	2,7

FEMMES

	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Total	21 119	59 264	110 588	160 635	351 606 61,9%
Moyenne par prestataire assuré	0,2	0,6	1,2	2,5	0,9
Moyenne par prestataire participant	1,3	1,7	2,7	3,6	2,5

HOMMES ET FEMMES

	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Total	36 815 6,5%	90 041 15,9%	184 964 32,6%	255 886 45,1%	567 706 100%
Moyenne par prestataire assuré	0,1	0,5	1,0	2,1	0,8
Moyenne par prestataire participant	1,3	1,8	2,7	3,5	2,6

Tableau 4

Principales caractéristiques de la consommation médicamenteuse des prestataires d'assistance-emploi assurés selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996

	HOMMES ET FEMMES						
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine							
Nombre de prestataires ayant au moins:							
une ordonnance active	1 954	3 352	697	1 161	1 652	1 796	5 306
% de l'ensemble	25,3%	42,3%	14,5%	30,7%	40,2%	61,2%	33,9%
cinq ordonnances actives	268	420	4	38	226	420	688
% de l'ensemble	3,5%	5,3%	0,1%	1,0%	5,5%	14,3%	4,4%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,7	1,0	0,2	0,5	1,0	2,0	0,8
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,6	2,4	1,3	1,7	2,6	3,3	2,5
Bas-Saint-Laurent							
Nombre de prestataires ayant au moins:							
une ordonnance active	2 974	4 777	855	1 527	2 452	2 917	7 751
% de l'ensemble	28,0%	43,9%	13,4%	31,8%	42,2%	64,9%	36,1%
cinq ordonnances actives	550	821	9	100	393	869	1 371
% de l'ensemble	5,2%	7,6%	0,1%	2,1%	6,8%	19,3%	6,4%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,8	1,2	0,2	0,6	1,2	2,4	1,0
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,9	2,7	1,4	1,9	2,8	3,6	2,8
Saguenay-Lac-Saint-Jean							
Nombre de prestataires ayant au moins:							
une ordonnance active	3 627	6 709	1 270	2 219	3 256	3 591	10 336
% de l'ensemble	25,7%	43,6%	14,0%	29,9%	42,2%	68,5%	35,1%
cinq ordonnances actives	570	1 108	9	120	540	1 009	1 678
% de l'ensemble	4,0%	7,2%	0,1%	1,6%	7,0%	19,2%	5,7%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,7	1,2	0,2	0,6	1,2	2,5	1,0
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,7	2,7	1,4	1,9	2,8	3,6	2,7
Québec							
Nombre de prestataires ayant au moins:							
une ordonnance active	7 466	12 248	2 062	4 217	6 333	7 102	19 714
% de l'ensemble	26,7%	42,6%	13,1%	28,7%	41,5%	65,1%	34,8%
cinq ordonnances actives	1 325	2 089	13	247	1 112	2 042	4 341
% de l'ensemble	4,7%	7,3%	0,1%	1,7%	7,3%	18,7%	6,0%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,8	1,2	0,2	0,5	1,2	2,4	1,0
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,8	2,7	1,3	1,9	2,9	3,6	2,8

Tableau 4 (suite)

	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Chaudière-Appalaches							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	3 470	6 035	1 096	2 013	2 991	3 405	9 505
% de l'ensemble	28,4%	44,4%	13,9%	33,3%	44,4%	65,9%	36,8%
cinq ordonnances actives	638	970	10	119	516	963	1 608
% de l'ensemble	5,2%	7,1%	0,1%	2,0%	7,7%	18,6%	6,2%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,8	1,2	0,2	0,6	1,3	2,4	1,0
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,9	2,6	1,3	1,9	2,8	3,6	2,7
Mauricie-Bois-Francs							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	6 233	10 989	2 073	3 465	5 415	6 269	17 222
% de l'ensemble	24,5%	39,8%	12,4%	27,8%	39,3%	62,2%	32,5%
cinq ordonnances actives	969	1 491	13	145	764	1 538	2 460
% de l'ensemble	3,8%	5,4%	0,1%	1,2%	5,5%	15,3%	4,6%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,7	1,0	0,2	0,5	1,0	2,1	0,8
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,7	2,5	1,3	1,7	2,6	3,4	2,6
Estrie							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	3 285	5 169	1 188	1 840	2 625	2 801	8 454
% de l'ensemble	23,6%	35,4%	12,4%	26,2%	36,3%	59,8%	29,7%
cinq ordonnances actives	497	703	4	77	419	700	1 200
% de l'ensemble	3,6%	4,8%	0,0%	1,1%	5,8%	14,9%	4,2%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,6	0,9	0,2	0,5	1,0	2,0	0,8
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,6	2,5	1,3	1,7	2,8	3,4	2,5
Montréal-Centre							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	25 171	39 800	7 911	14 787	21 356	20 917	64 971
% de l'ensemble	20,2%	31,2%	9,3%	22,3%	33,7%	56,7%	25,8%
cinq ordonnances actives	2 581	5 798	50	799	3 131	5 399	9 379
% de l'ensemble	2,9%	4,6%	0,1%	1,2%	5,0%	14,6%	3,7%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,5	0,8	0,1	0,4	0,9	2,0	0,7
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,6	2,6	1,4	1,9	2,7	3,4	2,6

Tableau 4 (suite)

	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Laval							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	2 193	4 215	793	1 629	1 905	2 081	6 408
% de l'ensemble	19,5%	32,4%	9,0%	25,6%	34,2%	60,0%	26,4%
cinq ordonnances actives	314	553	4	97	243	523	867
% de l'ensemble	2,8%	4,3%	0,1%	1,5%	4,4%	15,1%	3,6%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,5	0,8	0,1	0,5	0,9	2,0	0,7
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,6	2,5	1,3	1,8	2,6	3,4	2,5
Laurentides							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	4 060	7 577	1 495	2 723	3 538	3 881	11 637
% de l'ensemble	20,1%	34,1%	10,1%	25,5%	34,5%	58,6%	27,4%
cinq ordonnances actives	592	1 018	9	104	489	1 008	1 610
% de l'ensemble	2,9%	4,6%	0,1%	1,0%	4,8%	15,2%	3,8%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,5	0,8	0,1	0,4	0,9	2,0	0,7
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,6	2,4	1,3	1,7	2,6	3,5	2,5
Lanaudière							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	3 647	6 683	1 381	2 470	2 977	3 502	10 330
% de l'ensemble	21,0%	34,4%	10,3%	27,0%	35,0%	61,1%	28,1%
cinq ordonnances actives	619	964	8	102	459	1 014	1 583
% de l'ensemble	3,6%	5,0%	0,1%	1,1%	5,4%	17,7%	4,3%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,6	0,9	0,1	0,5	0,9	2,3	0,7
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,8	2,5	1,3	1,7	2,7	3,7	2,6
Montérégie							
Nombre de prestataires ayant au moins :							
une ordonnance active	10 380	19 146	4 097	7 102	8 934	9 393	29 526
% de l'ensemble	21,4%	35,2%	11,2%	26,9%	36,7%	60,2%	28,7%
cinq ordonnances actives	1 593	2 683	38	351	1 340	2 547	4 276
% de l'ensemble	3,3%	4,9%	0,1%	1,3%	5,5%	16,3%	4,2%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,6	0,9	0,2	0,5	1,0	2,1	0,7
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,7	2,5	1,4	1,8	2,7	3,5	2,6

Tableau 4 (suite)

	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Outaouais							
Nombre de prestataires ayant au moins:							
une ordonnance active	3 275	5 481	1 178	2 200	2 644	2 734	8 756
% de l'ensemble	20,3%	32,1%	9,9%	23,6%	35,3%	59,9%	26,3%
cinq ordonnances actives	523	858	4	115	448	814	1 381
% de l'ensemble	3,2%	5,0%	0,0%	1,2%	6,0%	17,8%	4,2%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,5	0,8	0,1	0,4	1,0	2,2	0,7
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,7	2,6	1,3	1,8	2,8	3,7	2,6
Abitibi-Témiscamingue							
Nombre de prestataires ayant au moins:							
une ordonnance active	1 521	2 782	575	1 040	1 317	1 371	4 303
% de l'ensemble	22,1%	37,3%	11,6%	28,4%	38,5%	59,8%	30,1%
cinq ordonnances actives	242	385	2	46	190	389	627
% de l'ensemble	3,5%	5,2%	0,0%	1,3%	5,6%	17,0%	4,4%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,6	0,9	0,2	0,5	1,0	2,1	0,8
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,7	2,5	1,3	1,7	2,7	3,6	2,5
Côte-Nord							
Nombre de prestataires ayant au moins:							
une ordonnance active	895	1 805	373	754	747	826	2 700
% de l'ensemble	20,7%	35,8%	11,5%	29,3%	35,3%	58,1%	28,8%
cinq ordonnances actives	139	239	1	41	99	237	378
% de l'ensemble	3,2%	4,7%	0,0%	1,6%	4,7%	16,7%	4,0%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,6	0,9	0,2	0,5	0,9	2,1	0,7
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,7	2,4	1,3	1,8	2,5	3,6	2,5
Nord-du-Québec							
Nombre de prestataires ayant au moins:							
une ordonnance active	81	190	49	70	70	82	271
% de l'ensemble	17,2%	34,3%	13,0%	24,8%	31,3%	57,3%	26,4%
cinq ordonnances actives	8	24	0	2	10	20	32
% de l'ensemble	1,7%	4,3%	–	0,7%	4,5%	14,0%	3,1%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,4	0,8	0,2	0,4	0,8	1,9	0,6
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,3	2,3	1,3	1,6	2,5	3,2	2,3

Tableau 4 (suite)

	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James							
Nombre de prestataires ayant au moins:							
une ordonnance active	5	4	6	0	1	2	9
% de l'ensemble	0,5%	0,3%	0,5%	–	0,5%	1,3%	0,4%
cinq ordonnances actives	1	1	0	0	1	1	2
% de l'ensemble	0,1%	0,1%	–	–	0,5%	0,6%	0,1%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participant	2,8	2,5	1,0	0,0	8,0	5,0	2,7
Région indéterminée							
Nombre de prestataires ayant au moins:							
une ordonnance active	828	1 268	408	693	595	400	2 096
% de l'ensemble	13,4%	21,2%	8,3%	18,1%	22,4%	51,6%	17,2%
cinq ordonnances actives	62	83	0	17	46	82	145
% de l'ensemble	1,0%	1,4%	–	0,4%	1,7%	10,6%	1,2%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,3	0,4	0,1	0,3	0,5	1,6	0,3
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,0	1,9	1,3	1,6	2,1	3,1	2,0

Tableau 5

**Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants
selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge,
régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996**

HOMMES ET FEMMES														
Nombre d'ordonnances actives	Hommes		Femmes		0-19 ans		20-34 ans		35-49 ans		50-64 ans		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	30 500	37,6	60 827	44,0	20 975	76,3	29 911	59,9	24 431	35,5	16 010	21,9	91 327	41,7
2	18 177	22,4	28 145	20,4	4 669	17,0	9 999	20,0	16 154	23,5	15 500	21,2	46 322	21,1
3	11 972	14,8	17 363	12,6	1 252	4,6	4 975	10,0	10 661	15,5	12 447	17,0	29 335	13,4
4	7 925	9,8	11 687	8,5	433	1,6	2 505	5,0	7 136	10,4	9 538	13,1	19 612	8,9
5	4 870	6,0	7 382	5,3	105	0,4	1 301	2,6	4 220	6,1	6 626	9,1	12 252	5,6
6	3 037	3,8	4 756	3,4	43	0,2	587	1,2	2 541	3,7	4 622	6,3	7 793	3,6
7	1 834	2,3	2 977	2,2	16	0,1	306	0,6	1 488	2,2	3 001	4,1	4 811	2,2
8	1 094	1,4	1 887	1,4	8	0	152	0,3	837	1,2	1 984	2,7	2 981	1,4
9	651	0,8	1 214	0,9	5	0	81	0,2	539	0,8	1 240	1,7	1 865	0,9
10 ou plus	1 005	1,2	1 992	1,4	1	0	93	0,2	801	1,2	2 102	2,9	2 997	1,4
Sous-total (1 à 4)	68 574	84,6	118 022	85,4	27 329	99,4	47 390	95,0	58 382	84,9	53 495	73,2	186 596	85,1
Sous-total (5 ou plus)	12 491	15,4	20 208	14,6	178	0,7	2 520	5,1	10 426	15,2	19 575	26,8	32 699	14,9
Total	81 065	100	138 230	100	27 507	100	49 910	100	68 808	100	73 070	100	219 295	100
		(37,0)		(63,0)		(12,5)		(22,8)		(31,4)		(33,3)		

Tableau 6

Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants (%) selon le nombre d'ordonnances actives et la région sociosanitaire et taux d'ordonnances actives pour 1000 participants selon la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996

Nombre d'ordonnances actives	Gaspésie- Îles-de- la-Madeleine	Bas- Saint-Laurent	Saguenay- Lac-Saint-Jean	Québec
1	43,0%	37,6%	38,8%	38,8%
2	22,4%	20,8%	21,3%	20,1%
3	12,9%	14,2%	13,9%	14,0%
4	8,7%	9,7%	9,8%	9,8%
5 ou plus	13,0%	17,7%	16,2%	17,3%
Taux d'ordonnances pour 1 000 prestataires participants	2 459	2 764	2 706	2 768

	Chaudière- Appalaches	Mauricie- Bois-Francs	Etrie	Montréal- Centre
1	39,6%	41,3%	42,6%	41,6%
2	20,8%	21,5%	21,2%	21,6%
3	13,4%	13,8%	13,2%	13,6%
4	9,3%	9,2%	8,8%	8,9%
5 ou plus	16,9%	14,2%	14,2%	14,4%
Taux d'ordonnances pour 1000 prestataires participants	2 721	2 552	2 543	2 567

	Laval	Laurentides	Lanaudière	Montérégie
1	43,4%	43,8%	42,9%	42,7%
2	21,8%	21,1%	20,1%	21,0%
3	12,8%	12,9%	12,6%	13,3%
4	8,5%	8,5%	9,0%	8,6%
5 ou plus	13,5%	13,8%	15,3%	14,5%
Taux d'ordonnances pour 1000 prestataires participants	2 486	2 504	2 616	2 546

Tableau 6 (suite)

Nombre d'ordonnances actives	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec
1	42,3 %	43,6 %	44,8 %	48,3 %
2	20,4 %	20,5 %	20,6 %	23,3 %
3	12,8 %	12,6 %	12,3 %	11,1 %
4	8,8 %	8,8 %	8,3 %	5,5 %
5 ou plus	15,8 %	14,6 %	14,0 %	11,8 %
Taux d'ordonnances pour 1000 prestataires participants	2 622	2 534	2 481	2 273

	Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James	Indéterminée	
1	66,7 %	55,7 %	
2	0,0 %	21,5 %	
3	11,1 %	10,8 %	
4	0,0 %	5,1 %	
5 ou plus	22,2 %	6,9 %	
Taux d'ordonnances pour 1000 prestataires participants	2 667	1 960	

Tableau 7

Pourcentage des prestataires d'assistance-emploi assurés ayant au moins une ordonnance active selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996

Classes de médicaments	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Anti-infectieux	2,2%	2,9%	2,4%	2,4%	2,5%	3,0%	2,5%
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	4,5%	4,7%	1,4%	3,9%	7,0%	9,0%	4,6%
– sympathomimétiques	2,1%	2,7%	1,4%	2,0%	2,6%	5,0%	2,4%
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	2,7%	2,3%	0,1%	2,0%	4,6%	5,2%	2,5%
Cardiovasculaires	5,5%	7,1%	0,1%	1,2%	7,1%	26,7%	6,3%
– cardiotropes	3,2%	3,8%	0,1%	0,7%	3,7%	15,3%	3,5%
– hypolipémiants	1,9%	2,3%	0,0%	0,3%	2,3%	9,1%	2,1%
– antihypertenseurs	2,3%	2,9%	0,0%	0,4%	2,8%	11,3%	2,6%
– vasodilatateurs	0,9%	0,7%	0,0%	0,0%	0,6%	3,9%	0,9%
Médicaments du système nerveux central (SNC)	13,7%	16,9%	2,3%	9,7%	23,5%	39,1%	15,3%
– analgésiques et antipyrétiques	4,8%	5,8%	0,5%	2,1%	6,8%	18,5%	5,3%
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	3,6%	4,0%	0,2%	1,3%	4,6%	14,6%	3,8%
• autres analgésiques et antipyrétiques	1,6%	2,4%	0,4%	1,0%	2,8%	5,9%	2,0%
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	1,8%	1,6%	0,4%	1,8%	2,8%	2,6%	1,7%
– psychotropes	4,7%	6,5%	0,2%	4,2%	10,5%	11,9%	5,6%
• antidépresseurs	2,4%	4,9%	0,1%	2,5%	6,7%	8,5%	3,7%
• tranquillisants	2,7%	2,2%	0,1%	2,1%	4,8%	4,4%	2,4%
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	7,5%	10,4%	0,3%	4,9%	14,6%	25,0%	9,0%
• benzodiazépines	7,0%	9,9%	0,2%	4,5%	13,7%	24,0%	8,4%
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	1,1%	1,2%	0,2%	0,7%	2,0%	2,5%	1,1%
– autres psychotropes	0,6%	0,8%	0,0%	0,6%	1,5%	1,3%	0,7%
Électrolytes-diurétiques	1,2%	2,4%	0,0%	0,3%	1,9%	7,9%	1,8%
– diurétiques	1,1%	2,3%	0,0%	0,3%	1,8%	7,7%	1,8%
– autres électrolytes-diurétiques	0,2%	0,4%	0,0%	0,1%	0,3%	1,4%	0,3%
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	1,0%	1,4%	0,7%	1,1%	1,5%	2,4%	1,2%
Gastro-intestinaux	3,0%	3,7%	0,2%	1,7%	4,9%	10,5%	3,4%
– divers gastro-intestinaux	2,8%	3,5%	0,1%	1,4%	4,6%	10,1%	3,2%
• anti-ulcéreux	2,6%	3,1%	0,1%	1,3%	4,3%	9,2%	2,9%
• agents de motilité ou prokinétiques	0,4%	0,7%	0,0%	0,2%	0,8%	2,0%	0,6%
– autres gastro-intestinaux	0,2%	0,3%	0,1%	0,3%	0,4%	0,6%	0,3%
Hormones et substituts	3,8%	18,5%	3,9%	12,3%	10,7%	26,6%	11,4%
– corticostéroïdes	1,5%	2,0%	1,0%	1,3%	2,0%	3,8%	1,8%
– anovulants	–	7,2%	2,7%	9,5%	1,4%	0,1%	3,7%
– hypoglycémiant	1,9%	2,0%	0,1%	0,6%	2,2%	7,6%	1,9%
– thyroïdiens	0,6%	3,1%	0,1%	1,0%	2,6%	5,8%	1,9%
– autres hormones et substituts	0,1%	6,2%	0,1%	0,5%	3,7%	13,8%	3,3%
Dermatologie	1,5%	2,3%	1,2%	1,7%	2,3%	3,3%	1,9%
– anti-inflammatoires	1,0%	1,4%	0,7%	0,9%	1,4%	2,3%	1,2%
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	0,7%	1,1%	0,6%	0,9%	1,0%	1,3%	0,9%
Spasmolytiques	0,5%	0,8%	0,0%	0,2%	0,8%	2,3%	0,6%
– respiratoires	0,4%	0,6%	0,0%	0,2%	0,6%	1,9%	0,5%
Classe Autres médicaments	0,8%	0,6%	0,4%	0,4%	0,7%	1,8%	0,7%
Médicaments des autres classes regroupées	1,9%	2,4%	0,7%	1,3%	2,7%	5,8%	2,2%
Ensemble des médicaments	22,0%	35,2%	10,7%	25,5%	36,4%	60,3%	28,8%

Tableau 7 (suite)

Classes de médicaments	HOMMES				FEMMES			
	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans
Anti-infectieux	2,3 %	1,9 %	2,2 %	2,4 %	2,5 %	2,9 %	2,9 %	3,5 %
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	1,5 %	4,2 %	6,8 %	8,3 %	1,3 %	3,6 %	7,1 %	9,6 %
– sympathomimétiques	1,5 %	1,6 %	2,0 %	4,6 %	1,3 %	2,4 %	3,3 %	5,3 %
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	0,1 %	2,7 %	5,0 %	4,9 %	0,1 %	1,4 %	4,3 %	5,5 %
Cardiovasculaires	0,1 %	1,2 %	6,3 %	23,5 %	0,1 %	1,2 %	7,8 %	29,5 %
– cardiotropes	0,1 %	0,6 %	3,3 %	14,3 %	0,1 %	0,7 %	4,0 %	16,1 %
– hypolipémiantes	0,0 %	0,3 %	2,4 %	8,1 %	0,0 %	0,3 %	2,1 %	10,0 %
– antihypertenseurs	0,1 %	0,4 %	2,4 %	9,9 %	0,0 %	0,4 %	3,1 %	12,5 %
– vasodilatateurs	0,0 %	0,0 %	0,7 %	4,6 %	0,0 %	0,0 %	0,5 %	3,3 %
Médicaments du système nerveux central (SNC)	2,8 %	9,4 %	20,6 %	34,2 %	1,7 %	10,1 %	26,4 %	43,3 %
– analgésiques et antipyrétiques	0,4 %	1,6 %	5,8 %	18,1 %	0,6 %	2,5 %	7,6 %	18,8 %
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	0,1 %	1,0 %	4,2 %	15,1 %	0,2 %	1,5 %	5,1 %	14,1 %
• autres analgésiques et antipyrétiques	0,3 %	0,7 %	2,2 %	4,7 %	0,4 %	1,2 %	3,3 %	6,9 %
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	0,4 %	2,1 %	2,9 %	2,6 %	0,4 %	1,6 %	2,7 %	2,5 %
– psychotropes	0,2 %	4,3 %	8,9 %	8,8 %	0,2 %	4,1 %	12,0 %	14,6 %
• antidépresseurs	0,1 %	1,8 %	4,4 %	5,3 %	0,1 %	3,1 %	8,9 %	11,2 %
• tranquillisants	0,1 %	2,9 %	5,4 %	4,1 %	0,1 %	1,4 %	4,2 %	4,6 %
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	0,3 %	4,8 %	12,4 %	20,0 %	0,3 %	5,0 %	16,7 %	29,3 %
• benzodiazépines	0,2 %	4,4 %	11,5 %	19,1 %	0,2 %	4,6 %	15,9 %	28,4 %
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	0,2 %	0,8 %	1,9 %	2,2 %	0,2 %	0,7 %	2,0 %	2,7 %
– autres psychotropes	0,0 %	0,6 %	1,3 %	1,0 %	0,0 %	0,5 %	1,7 %	1,5 %
Électrolytes-diurétiques	0,0 %	0,2 %	1,1 %	5,5 %	0,1 %	0,4 %	2,6 %	10,1 %
– diurétiques	0,0 %	0,2 %	1,1 %	5,3 %	0,0 %	0,4 %	2,5 %	9,7 %
– autres électrolytes-diurétiques	0,0 %	0,0 %	0,2 %	1,1 %	0,0 %	0,1 %	0,4 %	1,6 %
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	0,7 %	0,8 %	1,1 %	2,0 %	0,7 %	1,3 %	1,8 %	2,7 %
Gastro-intestinal	0,1 %	1,6 %	4,5 %	9,4 %	0,2 %	1,8 %	5,3 %	11,4 %
– divers gastro-intestinaux	0,1 %	1,4 %	4,2 %	9,1 %	0,1 %	1,4 %	5,0 %	11,0 %
• anti-ulcéreux	0,1 %	1,3 %	4,0 %	8,5 %	0,1 %	1,3 %	4,5 %	9,8 %
• agents de motilité ou prokinétiques	0,0 %	0,2 %	0,6 %	1,4 %	0,0 %	0,3 %	1,0 %	2,4 %
– autres gastro-intestinaux	0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,5 %	0,1 %	0,4 %	0,4 %	0,7 %
Hormones et substituts	1,2 %	1,9 %	4,2 %	11,9 %	6,7 %	21,2 %	17,0 %	39,5 %
– corticostéroïdes	1,1 %	1,0 %	1,4 %	3,3 %	0,9 %	1,5 %	2,6 %	4,3 %
– anovulants	–	–	–	–	5,5 %	17,7 %	2,8 %	0,1 %
– hypoglycémiantes	0,1 %	0,6 %	2,1 %	7,6 %	0,1 %	0,6 %	2,3 %	7,7 %
– thyroïdiens	0,1 %	0,4 %	0,8 %	1,8 %	0,2 %	1,5 %	4,3 %	9,4 %
– autres hormones et substituts	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,8 %	7,1 %	25,6 %
Dermatologie	1,0 %	1,2 %	1,8 %	2,7 %	1,3 %	2,1 %	2,8 %	3,8 %
– anti-inflammatoires	0,6 %	0,7 %	1,2 %	2,0 %	0,7 %	1,2 %	1,7 %	2,6 %
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	0,5 %	0,6 %	0,8 %	1,1 %	0,6 %	1,1 %	1,3 %	1,6 %
Spasmolytiques	0,0 %	0,2 %	0,5 %	2,0 %	0,1 %	0,3 %	1,0 %	2,6 %
– respiratoires	0,0 %	0,1 %	0,4 %	1,8 %	0,0 %	0,2 %	0,7 %	2,0 %
Classe Autres médicaments	0,4 %	0,3 %	0,7 %	2,3 %	0,3 %	0,4 %	0,7 %	1,4 %
Médicaments des autres classes regroupées	0,7 %	1,2 %	2,5 %	5,0 %	0,7 %	1,3 %	2,9 %	6,6 %
Ensemble des médicaments	8,7 %	15,7 %	29,6 %	49,9 %	12,9 %	33,9 %	43,0 %	69,4 %

Tableau 8

Répartition des ordonnances actives chez les prestataires d'assistance-emploi participants selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996

Classes de médicaments	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Anti-infectieux	4,2 %	3,4 %	17,2 %	5,9 %	3,0 %	1,5 %	3,7 %
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	8,5 %	5,8 %	10,4 %	8,8 %	7,6 %	5,0 %	6,8 %
– sympathomimétiques	3,8 %	3,1 %	9,8 %	4,5 %	2,8 %	2,5 %	3,4 %
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	4,7 %	2,7 %	0,5 %	4,4 %	4,8 %	2,5 %	3,4 %
Cardiovasculaires	16,1 %	12,0 %	0,9 %	3,3 %	10,5 %	21,2 %	13,6 %
– cardiotropes	6,5 %	4,9 %	0,5 %	1,6 %	4,2 %	8,5 %	5,5 %
– hypolipémiants	3,5 %	2,6 %	0,1 %	0,7 %	2,4 %	4,5 %	2,9 %
– antihypertenseurs	4,4 %	3,7 %	0,3 %	1,0 %	3,1 %	6,1 %	3,9 %
– vasodilatateurs	1,8 %	0,9 %	0,0 %	0,1 %	0,7 %	2,2 %	1,2 %
Médicaments du système nerveux central (SNC)	43,1 %	35,2 %	18,5 %	36,9 %	47,3 %	34,9 %	38,2 %
– analgésiques et antipyrétiques	9,5 %	7,6 %	3,6 %	4,9 %	8,0 %	10,4 %	8,3 %
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	6,6 %	4,8 %	1,1 %	2,8 %	5,0 %	7,4 %	5,5 %
• autres analgésiques et antipyrétiques	2,9 %	2,8 %	2,5 %	2,1 %	3,0 %	3,0 %	2,8 %
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	4,5 %	2,6 %	3,4 %	5,8 %	4,3 %	1,7 %	3,3 %
– psychotropes	10,1 %	8,9 %	1,6 %	11,3 %	13,5 %	6,9 %	9,4 %
• antidépresseurs	4,5 %	6,1 %	0,9 %	5,9 %	7,6 %	4,4 %	5,4 %
• tranquillisants	5,7 %	2,8 %	0,7 %	5,4 %	5,8 %	2,5 %	3,9 %
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	16,7 %	15,0 %	2,5 %	13,4 %	19,9 %	15,3 %	15,7 %
• benzodiazépines	14,8 %	13,6 %	1,3 %	11,7 %	17,7 %	14,0 %	14,0 %
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	2,0 %	1,4 %	1,2 %	1,7 %	2,2 %	1,2 %	1,6 %
– autres psychotropes	1,2 %	1,0 %	0,1 %	1,4 %	1,7 %	0,7 %	1,1 %
Électrolytes-diurétiques	2,5 %	3,1 %	0,3 %	0,7 %	2,3 %	4,5 %	2,9 %
– diurétiques	2,1 %	2,7 %	0,3 %	0,6 %	2,0 %	3,8 %	2,5 %
– autres électrolytes-diurétiques	0,4 %	0,4 %	0,1 %	0,1 %	0,3 %	0,6 %	0,4 %
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	2,1 %	1,8 %	5,1 %	2,6 %	1,7 %	1,3 %	1,9 %
Gastro-intestinaux	5,8 %	4,8 %	1,3 %	4,1 %	5,7 %	5,8 %	5,2 %
– divers gastro-intestinaux	5,4 %	4,4 %	0,9 %	3,4 %	5,3 %	5,5 %	4,8 %
• anti-ulcéreux	4,7 %	3,6 %	0,6 %	2,9 %	4,5 %	4,5 %	4,0 %
• agents de motilité ou prokinétiques	0,7 %	0,8 %	0,3 %	0,5 %	0,8 %	0,9 %	0,8 %
– autres gastro-intestinaux	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,6 %	0,4 %	0,3 %	0,4 %
Hormones et substituts	8,5 %	26,3 %	28,9 %	29,0 %	14,3 %	18,6 %	19,5 %
– corticostéroïdes	2,6 %	2,4 %	7,3 %	2,9 %	2,2 %	1,9 %	2,5 %
– anovulants	–	8,1 %	19,1 %	20,8 %	1,5 %	0,0 %	5,0 %
– hypoglycémiant	4,7 %	3,4 %	1,2 %	1,9 %	3,3 %	5,3 %	3,9 %
– thyroïdiens	1,1 %	3,5 %	0,8 %	2,2 %	2,7 %	2,8 %	2,6 %
– autres hormones et substituts	0,2 %	8,9 %	0,6 %	1,2 %	4,7 %	8,5 %	5,6 %
Dermatologie	3,1 %	3,0 %	9,1 %	4,3 %	2,8 %	1,9 %	3,1 %
– anti-inflammatoires	1,8 %	1,7 %	4,8 %	2,2 %	1,7 %	1,2 %	1,8 %
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	1,3 %	1,3 %	4,2 %	2,1 %	1,2 %	0,7 %	1,3 %
Spasmodiques	0,9 %	0,9 %	0,3 %	0,5 %	0,8 %	1,1 %	0,9 %
– respiratoires	0,7 %	0,6 %	0,1 %	0,4 %	0,6 %	0,9 %	0,7 %
Classe Autres médicaments	1,4 %	0,7 %	2,6 %	0,8 %	0,8 %	0,9 %	1,0 %
Médicaments des autres classes regroupées	3,9 %	3,1 %	5,6 %	3,2 %	3,3 %	3,2 %	3,4 %
Ensemble des médicaments	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Nombre d'ordonnances actives	216 100	351 606	36 815	90 041	184 964	255 886	567 706

Tableau 8 (suite)

Classes de médicaments	HOMMES				FEMMES			
	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans
Anti-infectieux	19,6%	6,6%	3,3%	1,6%	15,4%	5,5%	2,7%	1,5%
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	13,2%	12,8%	8,9%	5,9%	8,2%	6,8%	6,7%	4,5%
– sympathomimétiques	12,4%	4,9%	2,6%	2,9%	8,0%	4,3%	2,9%	2,2%
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	0,8%	7,9%	6,4%	3,0%	0,3%	2,5%	3,8%	2,3%
Cardiovasculaires	1,1%	4,5%	12,4%	25,2%	0,7%	2,6%	9,2%	18,9%
– cardiotropes	0,6%	2,1%	4,7%	10,2%	0,5%	1,3%	3,8%	7,5%
– hypolipémiants	0,1%	0,9%	3,2%	5,0%	0,1%	0,5%	1,9%	4,2%
– antihypertenseurs	0,5%	1,4%	3,4%	6,8%	0,2%	0,7%	3,0%	5,7%
– vasodilatateurs	0,0%	0,1%	1,1%	3,3%	0,0%	0,1%	0,5%	1,6%
Médicaments du système nerveux central (SNC)	27,0%	50,4%	50,8%	37,3%	12,1%	29,8%	45,0%	33,5%
– analgésiques et antipyrétiques	3,6%	5,2%	8,4%	12,6%	3,7%	4,8%	7,7%	9,1%
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	0,8%	3,0%	5,5%	9,6%	1,4%	2,7%	4,6%	6,1%
• autres analgésiques et antipyrétiques	2,8%	2,2%	3,0%	3,0%	2,2%	2,1%	3,1%	2,9%
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	4,3%	9,3%	5,5%	2,2%	2,7%	4,0%	3,5%	1,4%
– psychotropes	2,2%	15,9%	14,2%	6,4%	1,2%	8,9%	12,9%	7,1%
• antidépresseurs	0,9%	5,7%	6,0%	3,4%	0,9%	6,0%	8,7%	5,0%
• tranquillisants	1,3%	10,2%	8,2%	3,0%	0,3%	2,9%	4,3%	2,2%
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	3,0%	18,0%	20,8%	15,4%	2,1%	11,1%	19,2%	15,2%
• benzodiazépines	1,6%	15,5%	18,2%	14,0%	1,0%	9,8%	17,3%	14,1%
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	1,4%	2,5%	2,6%	1,4%	1,0%	1,3%	1,9%	1,2%
– autres psychotropes	0,1%	2,0%	1,7%	0,7%	0,1%	1,0%	1,7%	0,7%
Électrolytes-diurétiques	0,3%	0,6%	1,7%	4,0%	0,4%	0,8%	2,6%	4,7%
– diurétiques	0,2%	0,5%	1,5%	3,4%	0,3%	0,7%	2,3%	4,1%
– autres électrolytes-diurétiques	0,1%	0,1%	0,2%	0,6%	0,0%	0,1%	0,3%	0,7%
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	6,2%	2,8%	1,6%	1,5%	4,2%	2,5%	1,8%	1,3%
Gastro-intestinal	1,3%	5,1%	6,3%	6,4%	1,3%	3,5%	5,3%	5,4%
– divers gastro-intestinaux	0,9%	4,6%	5,8%	6,1%	0,9%	2,8%	5,0%	5,1%
• anti-ulcéreux	0,6%	4,0%	5,1%	5,2%	0,6%	2,4%	4,1%	4,1%
• agents de motilité ou prokinétiques	0,4%	0,6%	0,7%	0,9%	0,2%	0,5%	0,9%	1,0%
– autres gastro-intestinaux	0,4%	0,5%	0,4%	0,3%	0,4%	0,7%	0,4%	0,3%
Hormones et substituts	11,3%	7,1%	6,9%	9,8%	41,9%	40,3%	19,3%	23,8%
– corticostéroïdes	9,3%	2,9%	1,9%	2,1%	5,7%	2,8%	2,4%	1,9%
– anovulants	–	–	–	–	33,3%	31,5%	2,4%	*
– hypoglycémiant	1,3%	2,5%	3,8%	6,6%	1,1%	1,6%	3,0%	4,6%
– thyroïdiens	0,5%	1,3%	1,0%	1,1%	1,0%	2,8%	3,9%	3,9%
– autres hormones et substituts	0,2%	0,4%	0,2%	0,1%	0,8%	1,6%	7,7%	13,5%
Dermatologie	9,5%	4,2%	2,7%	2,0%	8,7%	4,4%	2,9%	1,8%
– anti-inflammatoires	5,0%	2,2%	1,7%	1,3%	4,7%	2,3%	1,7%	1,2%
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	4,5%	2,0%	1,1%	0,7%	4,0%	2,1%	1,2%	0,7%
Spasmolytiques	0,3%	0,6%	0,7%	1,2%	0,3%	0,5%	0,9%	1,1%
– respiratoires	0,1%	0,4%	0,6%	1,1%	0,1%	0,4%	0,6%	0,8%
Classe Autres médicaments	3,5%	1,0%	0,9%	1,5%	2,0%	0,7%	0,6%	0,6%
Médicaments des autres classes regroupées	6,7%	4,3%	3,8%	3,5%	4,8%	2,6%	3,0%	3,1%
Ensemble des médicaments	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nombre d'ordonnances actives	15 696	30 777	74 376	95 251	21 119	59 264	110 588	160 365

Tableau 9

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 prestataires d'assistance-emploi assurés selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996

Classes de médicaments	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Anti-infectieux	25	30	25	27	29	32	28
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	50	52	15	41	75	106	51
– sympathomimétiques	22	28	14	21	27	52	25
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	28	24	1	20	47	54	26
Cardiovasculaires	94	107	1	15	103	448	101
– cardiotropes	38	43	1	7	41	179	41
– hypolipémiants	20	23	0	3	24	95	22
– antihypertenseurs	26	33	0	4	31	129	29
– vasodilatateurs	11	8	0	0	7	46	9
Médicaments du système nerveux central (SNC)	252	315	27	170	463	737	285
– analgésiques et antipyrétiques	55	68	5	23	78	219	62
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	39	43	2	13	49	157	41
• autres analgésiques et antipyrétiques	17	25	4	10	30	62	21
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	27	23	5	27	42	36	25
– psychotropes	59	80	2	52	132	145	70
• antidépresseurs	26	54	1	27	75	93	41
• tranquillisants	33	25	1	25	57	52	29
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	98	134	4	62	194	323	117
• benzodiazépines	86	122	2	54	173	297	105
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	11	13	2	8	22	26	12
– autres psychotropes	7	9	0	6	16	14	8
Électrolytes-diurétiques	14	28	0	3	22	94	21
– diurétiques	12	24	0	3	19	81	18
– autres électrolytes-diurétiques	2	4	0	1	3	14	3
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	12	16	7	12	17	28	14
Gastro-intestinaux	34	43	2	19	56	122	39
– divers gastro-intestinaux	32	39	1	16	52	115	36
• anti-ulcéreux	27	32	1	13	44	95	30
• agents de motilité ou prokinétiques	4	7	0	2	8	20	6
– autres gastro-intestinaux	2	3	1	3	4	6	3
Hormones et substituts	50	235	42	133	140	393	145
– corticostéroïdes	15	22	10	13	21	41	19
– anovulants	–	72	27	96	14	1	37
– hypoglycémiant	27	30	2	9	32	113	29
– thyroïdiens	6	31	1	10	27	60	19
– autres hormones et substituts	1	80	1	5	46	179	41
Dermatologie	18	27	13	20	28	40	23
– anti-inflammatoires	11	15	7	10	16	26	13
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	7	12	6	10	11	14	10
Spasmolytiques	5	8	0	2	8	24	6
– respiratoires	4	6	0	2	6	20	5
Classe Autres médicaments	8	6	4	4	7	19	7
Médicaments des autres classes regroupées	3	4	4	3	3	4	4
Ensemble des médicaments	220	352	107	255	364	603	288

Tableau 10

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 prestataires d'assistance-emploi assurés selon les classes de médicaments et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996

Classes de médicaments	RÉGION SOCIOSANITAIRE																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	99	
Anti-infectieux	24	27	29	24	26	31	26	22	20	26	28	30	27	25	24	27	1	27	
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	61	66	63	52	42	48	48	55	48	50	45	58	44	53	48	52	0	19	
- sympathomimétiques	30	34	32	25	20	22	29	27	29	32	25	26	19	29	26	27	0	13	
- autres médicaments système nerveux (SNA)	31	32	31	27	22	26	20	28	19	18	20	32	24	24	22	25	0	6	
Cardiovasculaires	148	151	134	121	109	78	91	107	115	100	123	147	86	107	99	101	2	37	
- cardiotropes	56	60	55	48	42	32	36	40	47	46	48	58	36	43	39	42	0	16	
- hypolipémiants	39	38	32	27	25	15	18	25	31	22	25	36	17	23	21	20	1	7	
- antihypertenseurs	37	39	35	34	32	25	26	32	27	30	36	39	27	31	29	30	1	11	
- vasodilatateurs	15	13	12	12	10	7	11	10	11	2	13	14	7	10	10	8	0	3	
Médicaments du système nerveux central (SNC)	400	348	393	326	298	255	266	286	242	167	300	405	244	265	247	269	3	101	
- analgésiques et antipyrétiques	95	77	75	68	66	54	62	66	59	42	76	78	54	62	57	60	1	29	
• anti-inflammatoires non stéroïdiens	59	53	47	47	47	34	42	47	45	32	49	48	36	43	41	42	0	18	
• autres analgésiques et antipyrétiques	36	25	28	22	19	20	19	19	15	10	27	30	18	19	16	18	1	10	
- anticonvulsifs (sauf les benzodiazépines)	37	34	32	27	24	23	21	25	24	20	28	38	21	19	20	24	0	8	
- psychotropes	83	85	95	78	78	67	68	69	39	41	60	97	61	60	61	64	0	25	
• antidépresseurs	48	57	54	45	46	36	47	43	23	27	38	55	32	37	39	39	0	18	
• tranquillisants	35	29	40	33	31	31	20	26	16	14	22	42	30	24	21	25	0	7	
- anxiolytiques, sédatifs, hypnotiques	171	136	176	141	118	101	106	112	110	60	125	178	96	111	97	108	1	34	
• benzodiazépines	155	118	157	128	102	90	94	102	103	57	114	160	89	101	90	97	1	32	
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	16	17	19	13	16	12	12	10	7	4	11	19	7	10	8	10	0	3	
- autres psychotropes	9	12	11	8	6	8	5	9	6	3	7	10	8	9	7	8	0	2	
Électrolytes diurétiques	27	23	24	24	18	20	23	22	17	13	23	26	24	24	22	22	0	8	
- diurétiques	25	21	22	22	15	16	19	19	15	11	21	24	20	20	18	18	0	6	
- autres électrolytes-diurétiques	2	2	2	3	3	3	4	3	1	2	3	2	4	4	4	3	0	1	
Oto-rhino-laryngologie	13	9	18	12	12	17	12	9	11	7	13	16	12	13	11	13	0	15	
Gastro-intestinaux	61	57	49	39	46	33	45	43	43	24	61	52	31	34	32	34	0	19	
- divers gastro-intestinaux	58	54	45	36	43	30	42	41	41	22	57	48	28	31	30	32	0	16	
• antiulcéreux	49	43	38	30	34	26	35	34	35	19	44	38	23	26	26	27	0	14	
• agents de motilité ou procinétique	10	11	7	6	9	4	7	6	6	4	13	10	4	5	5	5	0	2	
- autres gastro-intestinaux	3	3	4	3	3	3	2	2	2	2	4	4	4	3	2	3	0	3	
Hormones et substituts	196	205	176	168	146	116	127	168	168	173	183	195	132	156	151	152	0	73	
- corticostéroïdes	23	27	23	21	15	15	16	19	21	27	17	21	15	24	20	21	0	9	
- anovulants	46	46	42	46	38	27	36	51	60	54	53	50	34	43	41	42	0	27	
- hypoglycémiant	33	25	33	33	31	27	28	28	22	19	35	32	27	32	28	30	0	16	
- thyroïdiens	29	24	24	20	18	16	15	25	21	24	21	30	19	18	19	20	0	9	
- autres hormones et substituts	66	83	54	48	44	31	31	46	44	50	56	63	37	40	43	40	0	12	

Tableau 10 (suite)

Classes de médicaments	RÉGION SOCIOSANITAIRE																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	99
Dermatologie	25	24	28	20	19	25	21	17	20	12	20	25	23	19	18	21	0	21
– anti-inflammatoires	16	15	17	12	11	14	13	10	12	7	12	14	13	11	11	12	0	10
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	9	8	12	8	8	11	8	7	7	5	8	11	10	8	7	9	0	11
Spasmolytiques	7	7	9	7	6	6	6	7	4	4	5	9	5	7	6	6	0	2
– respiratoires	5	4	6	5	5	5	4	5	2	3	5	7	4	6	5	5	0	1
Classe Autres médicaments	8	7	10	8	9	7	6	7	5	2	7	9	5	6	6	7	1	4
Médicaments des autres classes regroupées	28	26	31	27	24	26	21	19	22	22	26	30	24	24	21	25	1	14
Ensemble des médicaments	998	950	964	828	755	662	692	762	715	600	834	1002	657	733	685	729	8	340

Légende des régions sociosanitaires

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Bas-St-Laurent | 10. Nord-du-Québec |
| 2. Saguenay–Lac-St-Jean | 11. Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine |
| 3. Québec | 12. Chaudière-Appalaches |
| 4. Mauricie–Bois-Francs | 13. Laval |
| 5. Estrie | 14. Lanaudière |
| 6. Montréal-Centre | 15. Laurentides |
| 7. Outaouais | 16. Montérégie |
| 8. Abitibi-Témiscamingue | 20. Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James |
| 9. Côte-Nord | 99. Indéterminée |

Tableau 11

Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de prescripteurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996

Nombre d'ordonnances actives	NOMBRE DE PRESCRIPTEURS									
	1		2		3		4 ou plus		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	91 327	100,0	—	—	—	—	—	—	91 327	41,7
2	35 585	76,8	10 737	23,2	—	—	—	—	46 322	21,1
3	19 552	66,7	8 539	29,1	1 244	4,2	—	—	29 335	13,4
4	11 740	59,9	6 269	32,0	1 440	7,3	163	0,8	19 612	8,9
5	6 559	53,5	4 202	34,3	1 258	10,3	233	1,9	12 252	5,6
6	3 649	46,8	2 859	36,7	978	12,6	307	3,9	7 793	3,6
7 à 9	3 953	40,9	3 362	34,8	1 654	17,1	688	7,1	9 657	4,4
10 ou plus	923	30,8	959	32,0	608	20,3	507	16,9	2 997	1,4
Sous-total 1 à 4	158 204	84,8	25 545	13,7	2 684	1,4	163	0,1	186 596	85,1
Sous-total 5 ou plus	15 084	46,1	11 382	34,8	4 498	13,8	1 735	5,3	32 699	14,9
Total	173 288	79,0	36 927	16,8	7 182	3,3	1 898	0,9	219 295	100

Tableau 12

Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de pharmaciens, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996

Nombre d'ordonnances actives	NOMBRE DE PHARMACIENS									
	1		2		3		4 ou plus		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	91 327	100,0	—	—	—	—	—	—	91 327	41,7
2	42 793	92,4	3 529	7,6	—	—	—	—	46 322	21,1
3	26 385	89,9	2 806	9,6	144	0,5	—	—	29 335	13,4
4	17 336	88,4	2 098	10,7	165	0,8	13	0,1	19 612	8,9
5	10 664	87,0	1 432	11,7	138	1,1	18	0,2	12 252	5,6
6	6 783	87,0	900	11,6	95	1,2	15	0,2	7 793	3,6
7 à 9	8 221	85,1	1 224	12,7	179	1,9	33	0,3	9 657	4,4
10 ou plus	2 490	83,1	427	14,3	60	2,0	20	0,7	2 997	1,4
Sous-total 1 à 4	177 841	95,3	8 433	4,5	309	0,2	13	*	186 596	85,1
Sous-total 5 ou plus	28 158	86,1	3 983	12,2	472	1,4	86	0,3	32 699	14,9
Total	205 999	93,9	12 416	5,7	781	0,4	99	0,1	219 295	100

ANNEXE 4

Tableaux relatifs à la consommation médicamenteuse des adhérents inscrits au régime d'assurance médicaments administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), 11 juin 2000

Tableau 1

Répartition des adhérents assurés selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 2

Répartition des adhérents assurés selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 3

Répartition des ordonnances actives chez les adhérents selon le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 4

Principales caractéristiques de la consommation médicamenteuse des adhérents assurés selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 5

Répartition des adhérents participants selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 6

Répartition des adhérents participants (%) selon le nombre d'ordonnances actives et la région sociosanitaire et taux d'ordonnances actives pour 1 000 participants selon la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 7

Pourcentage des adhérents assurés ayant au moins une ordonnance active selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 8

Répartition des ordonnances actives chez les adhérents participants selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 9

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 adhérents assurés selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 10

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 adhérents assurés selon les classes de médicaments et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 11

Répartition des adhérents participants selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de prescripteurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 12

Répartition des adhérents participants selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de pharmaciens, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 1

Répartition des adhérents assurés selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Région sociosanitaire	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine	15 726	16 589	8 290	6 475	9 858	7 692	32 315 2,0%
Bas-Saint-Laurent	26 997	28 813	14 545	12 792	15 040	13 433	55 810 3,5%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	29 046	32 091	15 836	15 681	15 333	14 287	61 137 3,8%
Québec	58 859	67 986	25 612	37 899	29 993	33 341	126 845 7,9%
Chaudière-Appalaches	44 192	47 796	23 990	22 203	22 506	23 289	91 988 5,7%
Mauricie-Bois-Francs	52 461	57 782	27 674	25 781	28 121	28 667	110 243 6,8%
Estrie	29 755	33 127	16 599	15 229	15 266	15 788	62 882 3,9%
Montréal-Centre	191 657	212 632	95 696	121 152	101 620	85 821	404 289 25,1%
Laval	35 523	39 742	19 191	18 831	18 845	18 398	75 265 4,7%
Laurentides	52 757	58 124	30 669	25 343	29 665	25 204	110 881 6,9%
Lanaudière	42 002	45 574	23 932	19 527	23 019	21 098	87 576 5,4%
Montérégie	125 519	139 646	69 023	65 000	67 045	64 097	265 165 16,4%
Outaouais	29 456	32 200	16 803	15 876	16 061	12 916	61 656 3,8%
Abitibi-Témiscamingue	17 678	18 979	9 769	8 568	9 680	8 640	36 657 2,3%
Côte-Nord	9 251	10 157	4 886	5 244	4 922	4 356	19 408 1,2%
Nord-du-Québec	1 599	1 726	865	826	816	818	3 325 0,2%
Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James	89	110	69	62	38	30	199 0,0%
Région indéterminée	3 709	4 130	1 934	2 864	1 791	1 250	7 839 0,5%
Ensemble du Québec	766 276 47,5%	847 204 52,5%	405 383 25,1%	419 353 26,0%	409 619 25,4%	379 125 23,5%	1 613 480 100%

Tableau 2

Répartition des adhérents assurés selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

	HOMMES (ANS)					FEMMES (ANS)					HOMMES ET FEMMES (ANS)				
	0-19	20-34	35-49	50-64	Total	0-19	20-34	35-49	50-64	Total	0-19	20-34	35-49	50-64	Total
Aucune ordonnance active	186 674 92,0%	186 829 92,9%	169 037 84,5%	97 502 60,1%	640 042 83,5%	175 406 86,7%	154 097 70,6%	153 627 73,3%	79 594 36,7%	562 724 66,4%	362 080 89,3%	340 926 81,3%	322 664 78,8%	177 096 46,7%	1 202 766 74,5%
Au moins une ordonnance active	16 273 8,0%	14 259 7,1%	30 903 15,5%	64 799 39,9%	126 234 16,5%	27 030 13,4%	64 168 29,4%	56 052 26,7%	137 230 63,3%	284 480 33,6%	43 303 10,7%	78 427 18,7%	86 955 21,2%	202 029 53,3%	410 714 25,5%
Total	202 947 100% (26,5%)	201 088 100% (26,2%)	199 940 100% (26,1%)	162 301 100% (21,2%)	766 276 100% (100%)	202 436 100% (23,9%)	218 265 100% (25,8%)	209 679 100% (24,8%)	216 824 100% (25,6%)	847 204 100% (100%)	405 383 100% (25,1%)	419 353 100% (26,0%)	409 619 100% (25,4%)	379 125 100% (23,5%)	1 613 480 100% (100%)
Au moins cinq ordonnances actives	143 0,1%	277 0,1%	1 836 0,9%	9 094 5,6%	11 350 1,5%	141 0,1%	439 0,2%	2 585 1,2%	21 306 9,8%	24 471 2,9%	284 0,1%	716 0,2%	4 421 1,1%	30 400 8,0%	35 821 2,2%

Tableau 3
**Répartition des ordonnances actives chez les adhérents selon le sexe et l'âge,
régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000**
Ordonnances actives
HOMMES

	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Total	22 064	21 745	59 997	170 305	274 111 31,3%
Moyenne par prestataire assuré	0,1	0,1	0,3	1,1	0,4
Moyenne par prestataire participant	1,4	1,5	1,9	2,6	2,2

FEMMES

	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Total	33 342	81 070	102 772	385 230	602 414 68,7%
Moyenne par prestataire assuré	0,2	0,4	0,5	1,8	0,7
Moyenne par prestataire participant	1,2	1,3	1,8	2,8	2,1

HOMMES ET FEMMES

	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Total	55 406 6,3%	102 815 11,7%	162 769 18,6%	555 535 63,4%	876 525 100%
Moyenne par prestataire assuré	0,1	0,3	0,4	1,5	0,5
Moyenne par prestataire participant	1,3	1,3	1,9	2,8	2,1

Tableau 4

Principales caractéristiques de la consommation médicamenteuse des adhérents assurés selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

	HOMMES ET FEMMES						
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine							
Nombre d'adhérents ayant au moins :							
une ordonnance active	3 296	7 000	1 280	1 661	2 827	4 528	10 296
% de l'ensemble	21,0 %	42,2 %	15,4 %	25,7 %	28,7 %	58,9 %	31,9 %
cinq ordonnances actives	294	716	10	13	156	831	1 010
% de l'ensemble	1,9 %	4,3 %	0,1 %	0,2 %	1,6 %	10,8 %	3,1 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,5	1,0	0,2	0,3	0,6	1,8	0,7
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,2	2,2	1,3	1,3	1,9	3,0	2,2
Bas-Saint-Laurent							
Nombre d'adhérents ayant au moins :							
une ordonnance active	4 810	11 223	1 905	2 868	3 585	7 675	16 033
% de l'ensemble	17,8 %	39,0 %	13,1 %	22,4 %	23,8 %	57,1 %	28,7 %
cinq ordonnances actives	474	1 009	17	20	206	1 240	1 483
% de l'ensemble	1,8 %	3,5 %	0,1 %	0,2 %	1,4 %	9,2 %	2,7 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,4	0,8	0,2	0,3	0,5	1,6	0,6
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,2	2,1	1,3	1,3	1,9	2,8	2,2
Saguenay-Lac-Saint-Jean							
Nombre d'adhérents ayant au moins :							
une ordonnance active	5 308	13 143	2 078	3 472	3 911	8 990	18 451
% de l'ensemble	18,3 %	41,0 %	13,1 %	22,1 %	25,5 %	62,9 %	30,2 %
cinq ordonnances actives	416	1 385	18	24	167	1 592	1 801
% de l'ensemble	1,4 %	4,3 %	0,1 %	0,2 %	1,1 %	11,1 %	3,0 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,4	0,9	0,2	0,3	0,5	1,9	0,7
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,1	2,3	1,3	1,3	1,9	3,0	2,2
Québec							
Nombre d'adhérents ayant au moins :							
une ordonnance active	11 094	26 788	3 193	8 121	7 033	19 535	37 882
% de l'ensemble	18,9 %	39,4 %	12,5 %	21,4 %	23,5 %	58,6 %	29,9 %
cinq ordonnances actives	1 062	2 473	26	77	361	3 071	3 535
% de l'ensemble	1,8 %	3,6 %	0,1 %	0,2 %	1,2 %	9,2 %	2,8 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,4	0,9	0,2	0,3	0,4	1,6	0,7
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,2	2,2	1,3	1,3	1,9	2,8	2,2

Tableau 4 (suite)

	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Chaudière-Appalaches							
Nombre d'adhérents ayant au moins:							
une ordonnance active	7 629	18 052	2 815	4 601	5 122	13 143	25 681
% de l'ensemble	17,3 %	37,8 %	11,7 %	20,7 %	22,8 %	56,4 %	27,9 %
cinq ordonnances actives	665	1 589	12	38	260	1 944	2 254
% de l'ensemble	1,5 %	3,3 %	0,1 %	0,2 %	1,2 %	8,4 %	2,5 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,4	0,8	0,2	0,3	0,4	1,5	0,6
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,1	2,1	1,3	1,3	1,9	2,7	2,1
Mauricie-Bois-Francs							
Nombre d'adhérents ayant au moins:							
une ordonnance active	9 023	21 412	3 239	5 428	6 129	15 639	30 435
% de l'ensemble	17,2 %	37,1 %	11,7 %	21,1 %	21,8 %	54,6 %	27,6 %
cinq ordonnances actives	825	1 782	17	43	289	2 258	2 607
% de l'ensemble	1,6 %	3,1 %	0,1 %	0,2 %	1,0 %	7,9 %	2,4 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,4	0,8	0,2	0,3	0,4	1,5	0,6
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,2	2,1	1,3	1,3	1,8	2,7	2,1
Estrie							
Nombre d'adhérents ayant au moins:							
une ordonnance active	4 989	11 481	1 855	3 012	3 241	8 362	16 470
% de l'ensemble	16,8 %	34,7 %	11,2 %	19,8 %	21,2 %	53,0 %	26,2 %
cinq ordonnances actives	417	978	10	27	140	1 218	1 395
% de l'ensemble	1,4 %	3,0 %	0,1 %	0,2 %	0,9 %	7,7 %	2,2 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,4	0,7	0,1	0,3	0,4	1,4	0,6
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,1	2,1	1,3	1,3	1,8	2,7	2,1
Montréal-Centre							
Nombre d'adhérents ayant au moins:							
une ordonnance active	28 270	59 210	8 291	18 728	19 315	41 146	87 480
% de l'ensemble	14,8 %	27,9 %	8,7 %	15,5 %	19,0 %	47,9 %	21,6 %
cinq ordonnances actives	2 428	4 714	68	224	1 012	5 838	7 142
% de l'ensemble	1,3 %	2,2 %	0,1 %	0,2 %	1,0 %	6,8 %	1,8 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,3	0,6	0,1	0,2	0,4	1,3	0,5
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,1	2,1	1,3	1,3	1,9	2,7	2,1

Tableau 4 (suite)

	HOMMES ET FEMMES						
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Laval							
Nombre d'adhérents ayant au moins :							
une ordonnance active	5 754	12 310	1 661	3 152	3 843	9 408	18 064
% de l'ensemble	16,2 %	31,0 %	8,7 %	16,7 %	20,4 %	51,1 %	24,0 %
cinq ordonnances actives	499	1 018	8	38	172	1 299	1 517
% de l'ensemble	1,4 %	2,6 %	0,0 %	0,2 %	0,9 %	7,1 %	2,0 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,4	0,7	0,1	0,2	0,4	1,4	0,5
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,2	2,1	1,3	1,3	1,8	2,7	2,1
Laurentides							
Nombre d'adhérents ayant au moins :							
une ordonnance active	8 531	18 980	3 378	4 868	6 028	13 237	27 511
% de l'ensemble	16,2 %	32,7 %	11,0 %	19,2 %	20,3 %	52,5 %	24,8 %
cinq ordonnances actives	741	1 533	17	36	290	1 931	2 274
% de l'ensemble	1,4 %	2,6 %	0,1 %	0,1 %	1,0 %	7,7 %	2,1 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,4	0,7	0,1	0,3	0,4	1,4	0,5
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,2	2,1	1,3	1,3	1,9	2,7	2,1
Lanaudière							
Nombre d'adhérents ayant au moins :							
une ordonnance active	7 098	15 799	2 570	3 860	4 926	11 541	22 897
% de l'ensemble	16,9 %	34,7 %	10,7 %	19,8 %	21,4 %	54,7 %	26,2 %
cinq ordonnances actives	720	1 510	26	35	288	1 881	2 230
% de l'ensemble	1,7 %	3,3 %	0,1 %	0,2 %	1,3 %	8,9 %	2,6 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,4	0,8	0,1	0,3	0,4	1,6	0,6
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,3	2,2	1,3	1,3	1,9	2,8	2,2
Montérégie							
Nombre d'adhérents ayant au moins :							
une ordonnance active	20 140	46 376	7 260	12 260	13 709	33 287	66 516
% de l'ensemble	16,1 %	33,2 %	10,5 %	18,9 %	20,5 %	51,9 %	25,1 %
cinq ordonnances actives	1 822	3 620	35	92	625	4 690	5 442
% de l'ensemble	1,5 %	2,6 %	0,1 %	0,1 %	0,9 %	7,3 %	2,1 %
Nombre d'ordonnances actives par personne assurée	0,4	0,7	0,1	0,2	0,4	1,4	0,5
Nombre d'ordonnances actives par personne participante	2,2	2,1	1,3	1,3	1,8	2,7	2,1

Tableau 4 (suite)

HOMMES ET FEMMES							
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Outaouais							
Nombre d'adhérents ayant au moins:							
une ordonnance active	4 764	10 086	1 604	2 832	3 439	6 975	14 850
% de l'ensemble	16,2%	31,3%	9,6%	17,8%	21,4%	54,0%	24,1%
cinq ordonnances actives	459	948	6	23	218	1 160	1 407
% de l'ensemble	1,6%	2,9%	0,0%	0,1%	1,4%	9,0%	2,3%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,4	0,7	0,1	0,2	0,4	1,5	0,5
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,2	2,2	1,3	1,4	2,0	2,9	2,2
Abitibi-Témiscamingue							
Nombre d'adhérents ayant au moins:							
une ordonnance active	3 133	7 033	1 293	1 817	2 143	4 913	10 166
% de l'ensemble	17,7%	37,1%	13,2%	21,2%	22,1%	56,9%	27,7%
cinq ordonnances actives	290	668	6	10	123	819	958
% de l'ensemble	1,6%	3,5%	0,1%	0,1%	1,3%	9,5%	2,6%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,4	0,8	0,2	0,3	0,4	1,7	0,6
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,3	2,2	1,3	1,3	2,0	2,9	2,2
Côte-Nord							
Nombre d'adhérents ayant au moins:							
une ordonnance active	1 674	3 890	616	1 178	1 209	2 561	5 564
% de l'ensemble	18,1%	38,3%	12,6%	22,5%	24,6%	58,8%	28,7%
cinq ordonnances actives	170	371	5	13	80	443	541
% de l'ensemble	1,8%	3,7%	0,1%	0,3%	1,6%	10,2%	2,8%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,4	0,8	0,2	0,3	0,5	1,7	0,6
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,2	2,1	1,3	1,3	2,0	2,9	2,2
Nord-du-Québec							
Nombre d'adhérents ayant au moins:							
une ordonnance active	271	660	115	156	197	463	931
% de l'ensemble	17,0%	38,2%	13,3%	18,9%	24,1%	56,6%	28,0%
cinq ordonnances actives	25	85	2	0	15	93	110
% de l'ensemble	1,6%	4,9%	0,2%	–	1,8%	11,4%	3,3%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,4	0,9	0,2	0,2	0,5	1,8	0,7
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,2	2,4	1,4	1,2	2,0	3,1	2,3

Tableau 4 (suite)

	HOMMES ET FEMMES						
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James							
Nombre d'adhérents ayant au moins :							
une ordonnance active	7	13	3	5	7	5	20
% de l'ensemble	7,9 %	11,8 %	4,4 %	8,1 %	18,4 %	16,7 %	10,1 %
cinq ordonnances actives	1	0	0	0	1	0	1
% de l'ensemble	1,1 %	–	–	–	2,6 %	–	0,5 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,2	0,2	0,0	0,1	0,6	0,4	0,2
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,4	2,0	1,0	1,0	3,1	2,6	2,2
Région indéterminée							
Nombre d'adhérents ayant au moins :							
une ordonnance active	443	1 024	147	408	291	621	1 467
% de l'ensemble	11,9 %	24,8 %	7,6 %	14,3 %	16,3 %	49,7 %	18,7 %
cinq ordonnances actives	42	72	1	3	18	92	114
% de l'ensemble	1,1 %	1,7 %	0,1 %	0,1 %	1,0 %	7,4 %	1,5 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,3	0,5	0,1	0,2	0,3	1,4	0,4
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,1	2,0	1,4	1,3	1,9	2,7	2,0

Tableau 5

**Répartition des adhérents participants
selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge,
régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000**

HOMMES ET FEMMES														
Nombre d'ordonnances actives	Hommes		Femmes		0-19 ans		20-34 ans		35-49 ans		50-64 ans		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	61 874	49,0	144 664	50,9	34 703	80,1	62 167	79,3	48 158	55,4	61 510	30,5	206 538	50,3
2	28 894	22,9	62 789	22,1	6 341	14,6	11 344	14,5	20 701	23,8	53 297	26,4	91 683	22,3
3	15 601	12,4	33 805	11,9	1 541	3,6	3 173	4,1	9 366	10,8	35 326	17,5	49 406	12,0
4	8 515	6,8	18 751	6,6	434	1,0	1 027	1,3	4 309	5,0	21 496	10,6	27 266	6,6
5	4 596	3,6	10 670	3,8	163	0,4	382	0,5	2 000	2,3	12 721	6,3	15 266	3,7
6	2 777	2,2	5 854	2,1	64	0,2	150	0,2	1 052	1,2	7 365	3,7	8 631	2,1
7	1 612	1,3	3 309	1,2	28	0,1	89	0,1	613	0,7	4 191	2,1	4 921	1,2
8	890	0,7	1 917	0,7	15	0,0	39	0,1	309	0,4	2 444	1,2	2 807	0,7
9	609	0,5	1 085	0,4	4	0,0	21	0,0	178	0,2	1 491	0,7	1 694	0,4
10 ou plus	866	0,7	1 636	0,6	10	0,0	35	0,0	269	0,3	2 188	1,1	2 502	0,6
Sous-total (1 à 4)	114 884	91,0	260 009	91,4	43 019	99,3	77 711	99,1	82 534	94,9	171 629	85,0	374 893	91,3
Sous-total (5 ou plus)	11 350	9,0	24 471	8,6	284	0,7	716	0,9	4 421	5,1	30 400	15,0	35 821	8,7
Total	126 234	100	284 480	100	43 303	100	78 427	100	86 955	100	202 029	100	410 714	100
		(30,7)		(69,3)		(10,5)		(19,1)		(21,2)		(49,2)		(100)

Tableau 6

Répartition des prestataires d'assistance-emploi participants (%) selon le nombre d'ordonnances actives et la région sociosanitaire et taux d'ordonnances actives pour 1 000 participants selon la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 9 juin 1996

Nombre d'ordonnances actives	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Bas-Saint-Laurent	Saguenay-Lac-Saint-Jean	Québec
1	47,9%	50,4%	47,9%	49,1%
2	22,8%	21,5%	21,8%	22,4%
3	12,4%	12,1%	13,0%	12,4%
4	7,1%	6,7%	7,6%	6,7%
5 ou plus	9,8%	9,3%	9,8%	9,3%
Taux d'ordonnances pour 1 000 adhérents participants	2 218	2 156	2 228	2 179

	Chaudière-Appalaches	Mauricie-Bois-Francs	Estrie	Montréal-Centre
1	49,6%	50,3%	51,2%	51,6%
2	22,7%	22,1%	22,2%	22,5%
3	12,4%	12,3%	11,7%	11,6%
4	6,6%	6,9%	6,5%	6,2%
5 ou plus	8,8%	8,6%	8,5%	8,2%
Taux d'ordonnances pour 1 000 adhérents participants	2 136	2 129	2 109	2 084

	Laval	Laurentides	Lanaudière	Montérégie
1	49,8%	51,0%	48,9%	51,1%
2	23,2%	22,8%	22,1%	22,2%
3	11,8%	11,8%	12,3%	12,0%
4	6,8%	6,2%	7,0%	6,6%
5 ou plus	8,4%	8,3%	9,7%	8,2%
Taux d'ordonnances pour 1 000 adhérents participants	2 127	2 097	2 202	2 103

Tableau 6 (suite)

Nombre d'ordonnances actives	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec
1	48,9 %	48,6 %	50,3 %	46,5 %
2	22,6 %	21,9 %	21,7 %	22,1 %
3	12,2 %	12,6 %	11,5 %	12,7 %
4	6,8 %	7,5 %	6,8 %	6,9 %
5 ou plus	9,5 %	9,4 %	9,7 %	11,8 %
Taux d'ordonnances pour 1 000 adhérents participants	2 198	2 212	2 167	2 320

	Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James	Indéterminée	
1	50,0 %	54,6 %	
2	15,0 %	20,3 %	
3	15,0 %	11,1 %	
4	15,0 %	6,3 %	
5 ou plus	5,0 %	7,8 %	
Taux d'ordonnances pour 1 000 adhérents participants	2 150	2 018	

Tableau 7

Pourcentage des adhérents assurés ayant au moins une ordonnance active selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Classes de médicaments	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Anti-infectieux	1,5%	1,9%	2,1%	1,4%	1,5%	1,9%	1,7%
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	1,4%	1,6%	1,1%	1,1%	1,3%	2,4%	1,5%
– sympathomimétiques	1,0%	1,1%	1,1%	1,0%	0,9%	1,4%	1,1%
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	0,4%	0,5%	*	0,2%	0,5%	1,2%	0,5%
Cardiovasculaires	7,1%	8,2%	0,2%	0,7%	5,2%	26,1%	7,7%
– cardiotropes	3,0%	3,6%	0,1%	0,3%	2,1%	11,6%	3,3%
– hypolipémiants	3,6%	3,2%	*	0,2%	2,1%	11,9%	3,4%
– antihypertenseurs	3,6%	3,9%	0,1%	0,3%	2,3%	13,0%	3,7%
– vasodilatateurs	0,4%	0,3%	*	*	0,1%	1,2%	0,3%
Médicaments du système nerveux central (SNC)	6,7%	9,6%	1,9%	3,2%	8,4%	20,2%	8,2%
– analgésiques et antipyrétiques	3,1%	3,3%	0,2%	0,7%	2,5%	9,9%	3,2%
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	2,9%	3,0%	0,1%	0,6%	2,3%	9,3%	3,0%
• autres analgésiques et antipyrétiques	0,3%	0,4%	0,1%	0,1%	0,4%	1,0%	0,4%
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	0,6%	0,6%	0,3%	0,4%	0,7%	1,0%	0,6%
– psychotropes	1,8%	3,9%	0,4%	1,8%	3,9%	5,6%	2,9%
• antidépresseurs	1,5%	3,6%	0,3%	1,7%	3,6%	5,1%	2,6%
• tranquillisants	0,4%	0,4%	0,1%	0,2%	0,5%	0,8%	0,4%
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	2,1%	4,2%	0,2%	0,7%	3,2%	9,2%	3,2%
• benzodiazépines	2,0%	4,1%	0,1%	0,6%	3,1%	9,0%	3,1%
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,4%	0,2%
– autres psychotropes	0,2%	0,3%	*	0,1%	0,3%	0,5%	0,2%
Électrolytes-diurétiques	1,4%	3,6%	*	0,2%	1,4%	9,0%	2,5%
– diurétiques	1,3%	2,7%	*	0,1%	1,1%	7,3%	2,0%
– autres électrolytes-diurétiques	0,2%	1,1%	*	0,1%	0,3%	2,4%	0,7%
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	0,8%	1,0%	0,6%	0,6%	0,8%	1,5%	0,9%
Gastro-intestinaux	1,5%	2,1%	0,2%	0,7%	1,7%	4,9%	1,8%
– divers gastro-intestinaux	1,5%	2,0%	0,2%	0,6%	1,6%	4,8%	1,7%
• anti-ulcéreux	1,3%	1,8%	0,1%	0,5%	1,5%	4,5%	1,6%
• agents de motilité ou prokinétiques	0,1%	0,2%	*	*	0,2%	0,5%	0,2%
– autres gastro-intestinaux	0,1%	0,1%	*	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Hormones et substituts	3,3%	22,4%	4,9%	12,7%	8,0%	28,9%	13,4%
– corticostéroïdes	0,9%	1,1%	1,0%	0,6%	0,8%	1,7%	1,0%
– anovulants	–	7,8%	3,5%	10,6%	1,7%	0,1%	4,1%
– hypoglycémiant	1,7%	1,3%	0,1%	0,3%	1,0%	4,8%	1,5%
– thyroïdiens	0,8%	4,4%	0,2%	1,0%	2,5%	7,6%	2,7%
– autres hormones et substituts	0,1%	10,4%	0,2%	0,7%	2,7%	19,6%	5,5%
Dermatologie	0,6%	0,9%	0,7%	0,6%	0,6%	1,1%	0,7%
– anti-inflammatoires	0,4%	0,6%	0,4%	0,4%	0,4%	0,7%	0,5%
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%	0,3%
Spasmolytiques	0,1%	0,2%	*	*	0,1%	0,5%	0,2%
– respiratoires	0,1%	0,1%	*	*	*	0,3%	0,1%
Classe Autres médicaments	1,1%	1,4%	0,4%	0,4%	0,6%	3,7%	1,2%
Médicaments des autres classes regroupées	1,3%	2,5%	0,6%	0,7%	1,4%	5,3%	1,9%
Ensemble des médicaments	16,5%	33,6%	10,7%	18,7%	21,2%	53,3%	25,5%

Tableau 7 (suite)

Classes de médicaments	HOMMES				FEMMES			
	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans
Anti-infectieux	2,0%	1,0%	1,3%	1,6%	2,1%	1,8%	1,7%	2,1%
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	1,2%	1,1%	1,1%	2,1%	0,9%	1,1%	1,5%	2,6%
– sympathomimétiques	1,2%	0,9%	0,8%	1,3%	0,9%	1,0%	0,9%	1,5%
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	0,1%	0,2%	0,4%	1,0%	*	0,2%	0,6%	1,3%
Cardiovasculaires	0,2%	0,7%	5,6%	25,6%	0,1%	0,6%	4,8%	26,5%
– cardiotropes	0,1%	0,3%	2,1%	11,3%	0,1%	0,3%	2,1%	11,8%
– hypolipémiantes	*	0,2%	2,8%	13,1%	*	0,2%	1,4%	10,9%
– antihypertenseurs	0,1%	0,3%	2,5%	13,3%	0,1%	0,2%	2,1%	12,8%
– vasodilatateurs	*	*	0,1%	1,6%	*	*	0,1%	0,9%
Médicaments du système nerveux central (SNC)	2,5%	2,6%	6,6%	16,9%	1,3%	3,8%	10,1%	22,6%
– analgésiques et antipyrétiques	0,2%	0,6%	2,6%	10,4%	0,3%	0,8%	2,5%	9,6%
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	0,1%	0,5%	2,3%	9,9%	0,2%	0,7%	2,2%	8,9%
• autres analgésiques et antipyrétiques	0,1%	0,1%	0,4%	0,8%	0,1%	0,1%	0,4%	1,1%
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	0,3%	0,5%	0,7%	0,9%	0,2%	0,4%	0,7%	1,0%
– psychotropes	0,4%	1,3%	2,5%	3,3%	0,4%	2,3%	5,3%	7,3%
• antidépresseurs	0,2%	1,1%	2,1%	2,9%	0,3%	2,2%	4,9%	6,7%
• tranquillisants	0,2%	0,3%	0,5%	0,6%	0,1%	0,2%	0,5%	0,9%
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	0,2%	0,6%	2,2%	6,0%	0,2%	0,8%	4,2%	11,5%
• benzodiazépines	0,1%	0,5%	2,2%	5,9%	0,1%	0,8%	4,0%	11,3%
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	0,1%	0,1%	0,2%	0,3%	0,1%	0,1%	0,3%	0,5%
– autres psychotropes	*	0,1%	0,3%	0,4%	*	0,1%	0,4%	0,5%
Électrolytes-diurétiques	*	0,1%	0,8%	5,2%	*	0,2%	1,9%	11,9%
– diurétiques	*	0,1%	0,8%	4,9%	*	0,2%	1,5%	9,0%
– autres électrolytes-diurétiques	*	*	0,1%	0,7%	*	0,1%	0,5%	3,8%
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	0,7%	0,5%	0,7%	1,3%	0,6%	0,7%	0,9%	1,7%
Gastro-intestinal	0,2%	0,6%	1,6%	4,2%	0,2%	0,8%	1,8%	5,5%
– divers gastro-intestinaux	0,1%	0,6%	1,5%	4,1%	0,2%	0,6%	1,7%	5,4%
• anti-ulcéreux	0,1%	0,5%	1,4%	3,8%	0,1%	0,5%	1,5%	5,0%
• agents de motilité ou prokinétiques	*	*	0,1%	0,4%	*	0,1%	0,2%	0,7%
– autres gastro-intestinaux	*	*	0,1%	0,1%	*	0,2%	0,1%	0,2%
Hormones et substituts	1,4%	1,2%	2,7%	9,4%	8,5%	23,3%	13,2%	43,5%
– corticostéroïdes	1,2%	0,5%	0,6%	1,4%	0,9%	0,6%	0,9%	1,8%
– anovulants	–	–	–	–	7,0%	20,4%	3,4%	0,1%
– hypoglycémiantes	0,1%	0,4%	1,3%	5,9%	0,1%	0,3%	0,8%	4,0%
– thyroïdiens	0,1%	0,3%	0,8%	2,3%	0,3%	1,6%	4,1%	11,5%
– autres hormones et substituts	0,1%	*	0,1%	0,2%	0,4%	1,2%	5,1%	34,2%
Dermatologie	0,6%	0,5%	0,6%	0,9%	0,7%	0,8%	0,7%	1,2%
– anti-inflammatoires	0,4%	0,3%	0,4%	0,7%	0,4%	0,5%	0,5%	0,8%
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	0,3%	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%
Spasmolytiques	*	*	0,1%	0,4%	*	*	0,1%	0,6%
– respiratoires	*	*	*	0,3%	*	*	0,1%	0,3%
Classe Autres médicaments	0,5%	0,3%	0,6%	3,3%	0,4%	0,4%	0,7%	4,0%
Médicaments des autres classes regroupées	0,6%	0,5%	1,0%	3,6%	0,6%	1,0%	1,8%	6,5%
Ensemble des médicaments	8,0%	7,1%	15,5%	39,9%	13,4%	29,4%	26,7%	63,3%

Tableau 8

Répartition des ordonnances actives chez les adhérents participants selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Classes de médicaments	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Anti-infectieux	5,0%	2,9%	15,7%	6,5%	4,7%	1,4%	3,5%
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	4,1%	2,4%	8,1%	4,7%	3,5%	1,9%	2,9%
– sympathomimétiques	3,1%	1,6%	7,9%	4,1%	2,3%	1,1%	2,1%
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	1,1%	0,8%	0,3%	0,6%	1,2%	0,8%	0,9%
Cardiovasculaires	32,3%	16,6%	1,2%	3,2%	17,8%	28,0%	21,5%
– cardiotropes	9,5%	5,6%	0,4%	1,3%	5,7%	8,8%	6,8%
– hypolipémiants	10,3%	4,6%	0,1%	0,8%	5,4%	8,3%	6,4%
– antihypertenseurs	11,4%	6,0%	0,6%	1,1%	6,4%	10,0%	7,7%
– vasodilatateurs	1,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,3%	0,9%	0,6%
Médicaments du système nerveux central (SNC)	26,0%	19,9%	17,0%	17,6%	31,2%	20,3%	21,8%
– analgésiques et antipyrétiques	9,4%	5,1%	1,7%	3,1%	6,9%	7,4%	6,4%
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	8,3%	4,5%	1,0%	2,5%	5,8%	6,7%	5,7%
• autres analgésiques et antipyrétiques	1,0%	0,7%	0,7%	0,5%	1,1%	0,7%	0,8%
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	2,1%	1,0%	2,3%	2,1%	2,3%	0,8%	1,4%
– psychotropes	6,0%	6,4%	3,0%	8,8%	11,7%	4,5%	6,3%
• antidépresseurs	4,7%	5,7%	2,0%	7,7%	10,2%	3,9%	5,4%
• tranquillisants	1,3%	0,7%	1,1%	1,1%	1,5%	0,6%	0,9%
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	6,4%	6,7%	1,4%	3,1%	9,1%	7,1%	6,6%
• benzodiazépines	6,0%	6,4%	0,8%	2,8%	8,6%	6,7%	6,3%
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	0,4%	0,3%	0,5%	0,3%	0,6%	0,3%	0,4%
– autres psychotropes	0,6%	0,4%	0,1%	0,5%	0,9%	0,4%	0,5%
Électrolytes-diurétiques	4,2%	5,5%	0,3%	0,7%	3,7%	6,8%	5,1%
– diurétiques	3,7%	3,9%	0,2%	0,5%	2,9%	5,1%	3,8%
– autres électrolytes-diurétiques	0,6%	1,6%	0,1%	0,2%	0,8%	1,7%	1,3%
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	2,3%	1,5%	4,9%	2,5%	2,1%	1,2%	1,7%
Gastro-intestinaux	4,6%	3,2%	1,6%	3,0%	4,6%	3,7%	3,7%
– divers gastro-intestinaux	4,4%	3,1%	1,2%	2,6%	4,4%	3,6%	3,5%
• anti-ulcéreux	3,8%	2,6%	0,8%	1,9%	3,8%	3,1%	3,0%
• agents de motilité ou prokinétiques	0,4%	0,3%	0,3%	0,2%	0,4%	0,4%	0,3%
– autres gastro-intestinaux	0,1%	0,2%	0,3%	0,4%	0,2%	0,1%	0,2%
Hormones et substituts	12,3%	41,6%	37,7%	54,5%	25,3%	29,9%	32,4%
– corticostéroïdes	2,7%	1,5%	7,8%	2,4%	2,0%	1,2%	1,9%
– anovulants	–	11,0%	25,6%	43,4%	4,4%	0,1%	7,6%
– hypoglycémiant	7,0%	2,8%	1,3%	1,9%	3,8%	4,9%	4,1%
– thyroïdiens	2,3%	6,4%	1,3%	4,1%	6,5%	5,3%	5,1%
– autres hormones et substituts	0,3%	19,9%	1,8%	2,7%	8,6%	18,5%	13,8%
Dermatologie	2,0%	1,3%	5,5%	2,8%	1,8%	0,8%	1,5%
– anti-inflammatoires	1,3%	0,8%	3,2%	1,7%	1,2%	0,6%	1,0%
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	0,7%	0,5%	2,3%	1,1%	0,6%	0,3%	0,6%
Spasmodiques	0,3%	0,3%	0,2%	0,1%	0,3%	0,3%	0,3%
– respiratoires	0,2%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%
Classe Autres médicaments	3,4%	2,0%	3,3%	1,6%	1,8%	2,7%	2,5%
Médicaments des autres classes regroupées	3,7%	2,9%	4,6%	2,9%	3,2%	3,0%	3,1%
Ensemble des médicaments	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nombre d'ordonnances actives	274 111	602 414	55 406	102 815	162 769	555 535	876 525

Tableau 8 (suite)

Classes de médicaments	HOMMES				FEMMES			
	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans
Anti-infectieux	19,2 %	11,1 %	6,5 %	1,8 %	13,3 %	5,2 %	3,7 %	1,2 %
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	11,7 %	10,4 %	3,9 %	2,4 %	5,8 %	3,1 %	3,2 %	1,7 %
– sympathomimétiques	11,2 %	9,1 %	2,7 %	1,4 %	5,7 %	2,7 %	2,0 %	0,9 %
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	0,4 %	1,4 %	1,3 %	1,0 %	0,2 %	0,4 %	1,2 %	0,8 %
Cardiovasculaires	1,7 %	8,0 %	27,0 %	41,2 %	0,8 %	1,8 %	12,5 %	22,1 %
– cardiotropes	0,4 %	2,6 %	7,5 %	12,3 %	0,4 %	0,9 %	4,7 %	7,3 %
– hypolipémiants	0,2 %	2,3 %	9,6 %	12,8 %	0,1 %	0,4 %	3,0 %	6,3 %
– antihypertenseurs	1,1 %	3,1 %	9,4 %	14,5 %	0,3 %	0,6 %	4,6 %	8,0 %
– vasodilatateurs	0,0 %	0,1 %	0,5 %	1,6 %	0,0 %	0,0 %	0,2 %	0,6 %
Médicaments du système nerveux central (SNC)	27,8 %	33,3 %	32,0 %	22,7 %	9,9 %	13,4 %	30,7 %	19,3 %
– analgésiques et antipyrétiques	1,7 %	6,2 %	9,3 %	10,8 %	1,7 %	2,2 %	5,4 %	5,9 %
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	0,9 %	5,1 %	7,9 %	9,9 %	1,1 %	1,9 %	4,6 %	5,3 %
• autres analgésiques et antipyrétiques	0,8 %	1,1 %	1,4 %	0,9 %	0,6 %	0,4 %	0,8 %	0,7 %
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	3,2 %	5,4 %	3,1 %	1,1 %	1,8 %	1,2 %	1,8 %	0,7 %
– psychotropes	3,9 %	14,5 %	10,0 %	3,7 %	2,5 %	7,2 %	12,7 %	4,9 %
• antidépresseurs	1,8 %	11,4 %	8,1 %	3,1 %	2,1 %	6,7 %	11,5 %	4,3 %
• tranquillisants	2,0 %	3,2 %	1,9 %	0,7 %	0,4 %	0,5 %	1,3 %	0,6 %
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	1,7 %	5,7 %	8,4 %	6,4 %	1,1 %	2,4 %	9,6 %	7,3 %
• benzodiazépines	0,9 %	5,2 %	7,8 %	6,1 %	0,7 %	2,2 %	9,0 %	7,0 %
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	0,8 %	0,6 %	0,6 %	0,3 %	0,4 %	0,2 %	0,6 %	0,3 %
– autres psychotropes	0,1 %	1,2 %	1,0 %	0,4 %	0,1 %	0,3 %	0,9 %	0,3 %
Électrolytes-diurétiques	0,3 %	1,1 %	3,0 %	5,6 %	0,3 %	0,6 %	4,1 %	7,3 %
– diurétiques	0,2 %	0,9 %	2,6 %	4,9 %	0,1 %	0,4 %	3,1 %	5,2 %
– autres électrolytes-diurétiques	0,1 %	0,3 %	0,4 %	0,7 %	0,2 %	0,2 %	1,0 %	2,2 %
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	6,3 %	4,6 %	2,5 %	1,4 %	3,9 %	1,9 %	1,9 %	1,0 %
Gastro-intestinaux	1,7 %	6,2 %	5,6 %	4,3 %	1,4 %	2,2 %	4,0 %	3,4 %
– divers gastro-intestinaux	1,4 %	5,9 %	5,4 %	4,2 %	1,1 %	1,7 %	3,8 %	3,3 %
• anti-ulcéreux	0,8 %	4,5 %	4,8 %	3,7 %	0,8 %	1,2 %	3,2 %	2,9 %
• agents de motilité ou prokinétiques	0,4 %	0,3 %	0,4 %	0,4 %	0,2 %	0,1 %	0,4 %	0,4 %
– autres gastro-intestinaux	0,3 %	0,3 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	0,5 %	0,2 %	0,1 %
Hormones et substituts	14,0 %	13,0 %	11,5 %	12,2 %	53,3 %	65,6 %	33,3 %	37,7 %
– corticostéroïdes	11,0 %	4,9 %	2,2 %	1,5 %	5,7 %	1,7 %	1,8 %	1,1 %
– anovulants	–	–	–	–	42,5 %	55,0 %	6,9 %	0,1 %
– hypoglycémiant	1,7 %	4,9 %	6,1 %	8,3 %	1,0 %	1,1 %	2,5 %	3,4 %
– thyroïdiens	0,8 %	2,8 %	2,8 %	2,3 %	1,6 %	4,5 %	8,7 %	6,7 %
– autres hormones et substituts	0,6 %	0,3 %	0,3 %	0,2 %	2,6 %	3,4 %	13,5 %	26,6 %
Dermatologie	6,4 %	4,8 %	2,1 %	1,0 %	4,9 %	2,3 %	1,6 %	0,7 %
– anti-inflammatoires	3,7 %	2,9 %	1,4 %	0,7 %	2,8 %	1,4 %	1,0 %	0,5 %
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	2,6 %	1,8 %	0,7 %	0,3 %	2,1 %	0,9 %	0,6 %	0,2 %
Spasmodiques	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,3 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	0,3 %
– respiratoires	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,2 %
Classe Autres médicaments	4,8 %	3,4 %	2,4 %	3,5 %	2,4 %	1,1 %	1,5 %	2,3 %
Médicaments des autres classes regroupées	5,8 %	4,1 %	3,2 %	3,6 %	3,8 %	2,5 %	3,3 %	2,8 %
Ensemble des médicaments	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Nombre d'ordonnances actives	22 064	21 745	59 997	170 305	33 342	81 070	102 772	385 230

Tableau 9

**Taux d'ordonnances actives pour 1000 adhérents assurés
selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge,
régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000**

Classes de médicaments	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Anti-infectieux	18	20	21	16	19	20	19
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	15	17	11	11	14	28	16
– sympathomimétiques	11	11	11	10	9	16	11
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	4	5	0	1	5	12	5
Cardiovasculaires	115	118	2	8	71	410	117
– cardiotropes	34	40	1	3	23	129	37
– hypolipémiants	37	33	0	2	22	121	35
– antihypertenseurs	41	43	1	3	25	146	42
– vasodilatateurs	4	3	0	0	1	13	3
Médicaments du système nerveux central (SNC)	93	142	23	43	124	298	119
– analgésiques et antipyrétiques	33	36	2	8	27	109	35
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	30	32	1	6	23	98	31
• autres analgésiques et antipyrétiques	4	5	1	1	4	11	4
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	7	7	3	5	9	12	7
– psychotropes	21	45	4	21	47	66	34
• antidépresseurs	17	40	3	19	41	57	29
• tranquillisants	4	5	1	3	6	9	5
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	23	48	2	8	36	103	36
• benzodiazépines	21	45	1	7	34	99	34
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	2	2	1	1	2	4	2
– autres psychotropes	2	3	0	1	4	5	3
Électrolytes-diurétiques	15	39	0	2	15	100	28
– diurétiques	13	28	0	1	12	75	21
– autres électrolytes-diurétiques	2	11	0	1	3	25	7
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	8	10	7	6	8	17	9
Gastro-intestinaux	16	23	2	7	18	54	20
– divers gastro-intestinaux	16	22	2	6	18	52	19
• anti-ulcéreux	13	18	1	5	15	46	16
• agents de motilité ou procinétiques	1	2	0	0	1	5	2
– autres gastro-intestinaux	1	1	0	1	1	1	1
Hormones et substituts	44	296	52	134	100	438	176
– corticostéroïdes	10	11	11	6	8	18	10
– anovulants	–	78	35	106	17	1	41
– hypoglycémiant	25	20	2	5	15	71	22
– thyroïdiens	8	46	2	10	26	78	28
– autres hormones et substituts	1	141	2	7	34	271	75
Dermatologie	7	9	8	7	7	12	8
– anti-inflammatoires	5	6	4	4	5	8	5
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	3	4	3	3	3	4	3
Spasmolytiques	1	2	0	0	1	5	1
– respiratoires	1	1	0	0	0	3	1
Classe Autres médicaments	12	14	5	4	7	39	13
Médicaments des autres classes regroupées	13	21	6	7	13	44	17
Ensemble des médicaments	358	711	137	245	397	1 465	543

Tableau 10

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 adhérents assurés selon les classes de médicaments et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Classes de médicaments	RÉGION SOCIOSANITAIRE																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	99	
Anti-infectieux	16	16	19	16	18	23	18	17	16	16	17	19	19	17	18	18	5	17	
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	17	22	19	15	13	14	17	18	17	21	22	15	14	18	17	15	0	11	
– sympathomimétiques	12	16	13	10	9	10	12	12	13	16	16	10	10	13	13	11	0	8	
– autres médicaments système nerveux (SNA)	5	6	5	5	4	4	5	6	4	5	6	5	4	5	4	4	0	4	
Cardiovasculaires	137	152	140	130	117	89	115	133	157	158	153	126	115	131	111	115	45	69	
– cardiotropes	44	52	45	40	37	28	36	41	55	49	49	40	34	42	34	37	0	24	
– hypolipémiants	45	44	45	38	34	25	31	43	46	47	45	40	34	41	33	33	15	22	
– antihypertenseurs	44	52	46	47	42	34	44	44	50	54	54	43	44	44	40	43	30	22	
– vasodilatateurs	4	3	4	4	4	2	4	5	5	7	6	4	3	4	4	3	0	1	
Médicaments du système nerveux central (SNC)	140	154	148	133	127	96	127	129	125	106	162	131	104	121	112	112	40	87	
– analgésiques et antipyrétiques	42	50	40	41	38	27	34	45	43	44	52	37	32	38	34	34	15	26	
• anti-inflammatoires non stéroïdiens	36	45	35	36	35	23	29	39	39	40	46	32	28	33	31	30	10	21	
• autres analgésiques et antipyrétiques	6	5	5	4	4	4	5	6	4	4	7	4	4	4	4	4	5	5	
– anticonvulsivants (sauf benzodiazépines)	8	9	9	7	8	7	7	6	8	7	8	8	7	7	6	7	0	4	
– psychotropes	37	42	43	37	38	31	42	33	29	28	38	33	30	33	31	32	20	25	
• antidépresseurs	33	38	37	32	34	25	37	29	26	27	35	28	25	28	28	27	20	20	
• tranquillisants	4	4	6	5	4	6	5	3	3	1	3	5	5	5	3	4	0	5	
– anxiolytiques, sédatifs, hypnotiques	47	44	49	43	35	27	37	38	39	23	57	46	30	36	34	33	5	29	
• benzodiazépines	44	42	46	41	33	25	35	37	36	23	55	43	28	35	32	32	5	28	
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	2	2	3	2	2	2	3	2	2	0	2	2	2	2	2	2	0	1	
– autres psychotropes	3	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	0	1	
Électrolytes diurétiques	28	30	30	28	25	25	27	28	25	35	30	30	32	34	27	27	10	15	
– diurétiques	22	21	24	20	18	19	23	19	21	20	24	23	23	23	20	21	5	11	
– autres électrolytes-diurétiques	6	8	7	8	7	6	4	10	4	15	6	7	9	10	7	6	5	5	
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	8	7	12	9	8	10	8	8	9	11	11	11	8	9	8	9	0	12	
Gastro-intestinal	24	27	23	19	22	16	25	28	29	28	38	19	18	20	20	17	10	12	
– divers gastro-intestinaux	23	26	22	19	21	15	24	27	28	26	37	18	17	19	19	17	10	12	
• antiulcéreux	19	22	18	16	18	13	20	23	24	23	30	15	14	16	16	14	10	10	
• agents de motilité ou prokinétiques	3	3	2	2	2	1	3	3	3	3	5	2	1	2	2	2	0	1	
– autres gastro-intestinaux	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	
Hormones et substituts	211	227	216	197	183	134	158	209	207	232	229	208	159	189	173	175	75	122	
– corticostéroïdes	12	12	12	11	9	9	10	12	11	14	15	11	9	12	10	10	10	9	
– anovulants	53	51	51	49	44	30	35	48	55	53	54	47	31	42	42	41	20	40	
– hypoglycémiant	18	16	22	23	21	24	25	20	25	22	30	18	24	22	20	23	0	11	
– thyroïdiens	37	31	31	28	29	22	26	31	34	41	30	40	29	31	27	27	10	17	
– autres hormones et substituts	92	116	100	86	80	49	62	98	82	103	102	93	66	81	74	73	35	45	

Tableau 10 (suite)

Classes de médicaments	RÉGION SOCIO SANITAIRE																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	99
Dermatologie	8	9	9	7	8	10	8	7	7	8	9	7	8	7	8	8	0	7
– anti-inflammatoires	5	6	6	4	5	6	5	4	5	4	6	4	6	4	5	5	0	5
– autres médicaments peau et muqueuses	3	3	3	2	3	4	3	2	2	4	3	3	3	3	3	3	0	2
Spasmolytiques	2	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	0	1
– respiratoires	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Classe Autres médicaments	11	11	14	12	13	15	11	13	11	15	13	13	14	13	12	13	15	8
Médicaments des autres classes regroupées	18	16	18	19	17	17	14	21	17	18	21	17	17	17	14	16	15	15
Ensemble des médicaments	619	672	651	588	552	451	529	614	621	650	707	596	510	576	520	527	216	378

Légende des régions sociosanitaires

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Bas-St-Laurent | 10. Nord-du-Québec |
| 2. Saguenay–Lac-St-Jean | 11. Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine |
| 3. Québec | 12. Chaudière–Appalaches |
| 4. Mauricie–Bois-Francs | 13. Laval |
| 5. Estrie | 14. Lanaudière |
| 6. Montréal-Centre | 15. Laurentides |
| 7. Outaouais | 16. Montérégie |
| 8. Abitibi-Témiscamingue | 20. Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James |
| 9. Côte-Nord | 99. Indéterminée |

Tableau 11

Répartition des adhérents participants ¹ selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de prescripteurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Nombre d'ordonnances actives	NOMBRE DE PRESCRIPTEURS									
	1		2		3		4 ou plus		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	206 538	100,0	—	—	—	—	—	—	206 538	50,3
2	70 158	76,7	21 293	23,3	—	—	—	—	91 451	22,3
3	31 917	64,7	15 357	31,1	2 046	4,2	—	—	49 320	12,0
4	15 544	57,1	9 092	33,4	2 334	8,6	238	0,9	27 208	6,6
5	7 737	50,8	5 373	35,3	1 780	11,7	347	2,3	15 237	3,7
6	3 883	45,1	3 074	35,7	1 298	15,1	363	4,2	8 618	2,1
7 à 9	3 384	36,0	3 477	37,0	1 744	18,5	799	8,5	9 404	2,3
10 ou plus	610	24,4	806	32,2	558	22,3	526	21,0	2 500	0,6
Sous-total 1 à 4	324 157	86,6	45 742	12,2	4 380	1,2	238	0,1	374 517	91,3
Sous-total 5 ou plus	15 614	43,7	12 730	35,6	5 380	15,1	2 035	5,7	35 759	8,7
Total	339 771	82,8	58 472	14,3	9 760	2,4	2 273	0,6	410 276¹	100

¹ La répartition selon le nombre de prescripteurs n'a pu être faite pour 438 adhérents participants, aucune donnée relativement aux prescripteurs n'étant disponible parce qu'ils exercent à l'extérieur du Québec et ne sont pas inscrits à la RAMQ. Ainsi, la répartition n'a pu être réalisée pour 232 adhérents qui ont deux ordonnances actives, 86 qui en ont trois, 58 qui en ont quatre, 29 qui en ont cinq, 13 qui en ont six, 18 qui en ont de sept à neuf et 2 qui en ont dix ou plus.

Tableau 12

Répartition des adhérents participants selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de pharmaciens, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Nombre d'ordonnances actives	NOMBRE DE PHARMACIENS									
	1		2		3		4 ou plus		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	206 538	100,0	—	—	—	—	—	—	206 538	50,3
2	86 666	94,5	5 017	5,5	—	—	—	—	91 683	22,3
3	46 087	93,3	3 208	6,5	111	0,2	—	—	49 406	12,0
4	25 221	92,5	1 933	7,1	108	0,4	4	*	27 266	6,6
5	14 162	92,8	1 032	6,8	67	0,4	5	*	15 266	3,7
6	7 982	92,5	602	7,0	41	0,5	6	0,1	8 631	2,1
7 à 9	8 670	92,0	695	7,4	51	0,5	6	0,1	9 422	2,3
10 ou plus	2 247	89,8	231	9,2	20	0,8	4	0,2	2 502	0,6
Sous-total 1 à 4	364 512	97,2	10 158	2,7	219	0,1	4	*	374 893	91,3
Sous-total 5 ou plus	33 061	92,3	2 560	7,2	179	0,5	21	0,1	35 821	8,7
Total	397 573	96,8	12 718	3,1	398	0,1	25	*	410 714	100

Tableaux relatifs à la consommation médicamenteuse des adhérents inscrits au régime d'assurance médicaments administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), 7 juin 1998

Tableau 1

Répartition des adhérents assurés selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 2

Répartition des adhérents assurés selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 3

Répartition des ordonnances actives chez les adhérents selon le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 4

Principales caractéristiques de la consommation médicamenteuse des adhérents assurés selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 5

Répartition des adhérents participants selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 6

Répartition des adhérents participants (%) selon le nombre d'ordonnances actives et la région sociosanitaire et taux d'ordonnances actives pour 1 000 participants selon la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 7

Pourcentage des adhérents assurés ayant au moins une ordonnance active selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 8

Répartition des ordonnances actives chez les adhérents participants selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 9

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 adhérents assurés selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 10

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 adhérents assurés selon les classes de médicaments et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 11

Répartition des adhérents participants selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de prescripteurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 12

Répartition des adhérents participants selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de pharmaciens, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 1
Répartition des adhérents assurés selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Région sociosanitaire	HOMMES		HOMMES ET FEMMES				Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine	14 079	14 614	7 186	6 152	8 460	6 895	28 693 2,0%
Bas-Saint-Laurent	24 720	25 952	13 303	11 664	13 454	12 251	50 672 3,6%
Saguenay-Lac-Saint-Jean	26 590	28 645	14 538	14 062	13 394	13 241	55 235 3,9%
Québec	52 333	59 978	22 565	33 151	25 499	31 096	112 311 7,9%
Chaudière-Appalaches	40 939	44 134	22 333	20 553	20 262	21 925	85 073 6,0%
Mauricie-Bois-Francs	47 959	51 797	24 818	22 868	24 830	27 240	99 756 7,0%
Estrie	26 547	29 333	14 695	13 286	13 317	14 582	55 880 3,9%
Montréal-Centre	155 188	174 278	75 842	97 539	79 258	76 827	329 466 23,1%
Laval	32 555	35 898	17 353	17 694	16 216	17 190	68 453 4,8%
Laurentides	46 446	50 473	25 557	23 715	25 000	22 647	96 919 6,8%
Lanaudière	38 071	40 395	20 888	18 567	19 791	19 220	78 466 5,5%
Montérégie	112 747	123 109	61 139	58 813	58 208	57 696	235 856 16,5%
Outaouais	24 883	26 862	13 596	14 066	12 762	11 321	51 745 3,6%
Abitibi-Témiscamingue	15 627	16 519	8 456	7 541	8 215	7 934	32 146 2,3%
Côte-Nord	8 068	8 695	4 031	4 746	4 062	3 924	16 763 1,2%
Nord-du-Québec	1 317	1 388	710	762	596	637	2 705 0,2%
Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James	80	90	55	62	32	21	170 *
Région indéterminée	12 226	13 067	6 237	10 102	5 509	3 445	25 293 1,8%
Ensemble du Québec	680 375 47,7%	745 227 52,3%	353 302 24,8%	375 343 26,3%	348 865 24,5%	348 092 24,4%	1 425 602 100%

Tableau 2

Répartition des adhérents assurés selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

	HOMMES (ANS)					FEMMES (ANS)					HOMMES ET FEMMES (ANS)				
	0-19	20-34	35-49	50-64	Total	0-19	20-34	35-49	50-64	Total	0-19	20-34	35-49	50-64	Total
Aucune ordonnance active	164 877 92,6%	173 187 93,5%	145 948 85,9%	92 933 63,3%	576 945 84,8%	152 241 87,0%	135 135 71,1%	133 293 74,5%	81 352 40,4%	502 121 67,4%	317 218 89,8%	308 322 82,1%	279 241 80,0%	174 285 50,1%	1 079 066 75,7%
Au moins une ordonnance active	13 261 7,4%	12 140 6,6%	24 042 14,1%	53 987 36,8%	103 430 15,2%	22 823 13,0%	54 881 28,9%	45 582 25,5%	119 820 59,6%	243 106 32,6%	36 084 10,2%	67 021 17,9%	69 624 20,0%	173 807 49,9%	346 536 24,3%
Total	178 138 100% (26,2%)	185 327 100% (27,2%)	169 990 100% (25,0%)	146 920 100% (21,6%)	680 375 100% (100%)	175 164 100% (23,5%)	190 016 100% (25,5%)	178 875 100% (24,0%)	201 172 100% (27,0%)	745 227 100% (100%)	353 302 100% (24,8%)	375 343 100% (26,3%)	348 865 100% (24,5%)	348 093 100% (24,4%)	1 425 602 100% (100%)
Au moins cinq ordonnances actives	89 0,1%	190 0,1%	1 148 0,7%	5 844 4,0%	7 271 1,1%	99 0,1%	307 0,2%	1 666 0,9%	13 518 6,7%	15 590 2,1%	188 0,1%	497 0,1%	2 814 0,8%	19 362 5,6%	22 861 1,6%

Tableau 3
**Répartition des ordonnances actives chez les adhérents selon le sexe et l'âge,
régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998**
Ordonnances actives
HOMMES

	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Total	17 473	18 047	44 555	129 952	210 027 30,5%
Moyenne par prestataire assuré	0,1	0,1	0,3	0,9	0,3
Moyenne par prestataire participant	1,3	1,5	1,9	2,4	2,0

FEMMES

	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Total	27 720	67 711	80 471	302 673	478 575 69,5%
Moyenne par prestataire assuré	0,2	0,4	0,5	1,5	0,6
Moyenne par prestataire participant	1,2	1,2	1,8	2,5	2,0

HOMMES ET FEMMES

	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Total	45 193 6,6%	85 758 12,5%	125 026 18,2%	432 625 62,8%	688 602 100%
Moyenne par prestataire assuré	0,1	0,2	0,4	1,2	0,5
Moyenne par prestataire participant	1,3	1,3	1,8	2,5	2,0

Tableau 4

Principales caractéristiques de la consommation médicamenteuse des adhérents assurés selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

	HOMMES ET FEMMES						
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine							
Nombre d'adhérents ayant au moins :							
une ordonnance active	2 540	5 648	934	1 353	2 105	3 796	8 188
% de l'ensemble	18,0 %	38,7 %	13,0 %	22,0 %	24,9 %	55,1 %	28,5 %
cinq ordonnances active	161	380	3	8	78	452	541
% de l'ensemble	1,1 %	2,6 %	*	0,1 %	0,9 %	6,6 %	1,9 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,4	0,8	0,2	0,3	0,5	1,4	0,6
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,0	2,0	1,3	1,3	1,8	2,6	2,0
Bas-Saint-Laurent							
Nombre d'adhérents ayant au moins :							
une ordonnance active	3 859	9 600	1 464	2 382	2 976	6 637	13 459
% de l'ensemble	15,6 %	37,0 %	11,0 %	20,4 %	22,1 %	54,2 %	26,6 %
cinq ordonnances actives	251	620	6	20	110	735	871
% de l'ensemble	1,0 %	2,4 %	0,1 %	0,2 %	0,8 %	6,0 %	1,7 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,3	0,7	0,1	0,3	0,4	1,4	0,5
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,0	2,0	1,2	1,3	1,8	2,5	2,0
Saguenay-Lac-Saint-Jean							
Nombre d'adhérents ayant au moins :							
une ordonnance active	4 438	11 167	1 747	2 703	3 153	8 002	15 605
% de l'ensemble	16,7 %	39,0 %	12,0 %	19,2 %	23,5 %	60,4 %	28,3 %
cinq ordonnances actives	264	892	15	24	114	1 003	1 156
% de l'ensemble	1,0 %	3,1 %	0,1 %	0,2 %	0,9 %	7,6 %	2,1 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,3	0,8	0,2	0,3	0,4	1,6	0,6
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,0	2,1	1,3	1,3	1,8	2,6	2,1
Québec							
Nombre d'adhérents ayant au moins :							
une ordonnance active	9 202	23 194	2 746	6 613	5 801	17 236	32 396
% de l'ensemble	17,6 %	38,7 %	12,2 %	20,0 %	22,8 %	55,4 %	28,8 %
cinq ordonnances actives	679	1 606	13	58	233	1 981	2 285
% de l'ensemble	1,3 %	2,7 %	0,1 %	0,2 %	0,9 %	6,4 %	2,0 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,4	0,8	0,2	0,3	0,4	1,4	0,6
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,1	2,0	1,3	1,3	1,8	2,5	2,0

Tableau 4 (suite)

	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Chaudière-Appalaches							
Nombre d'adhérents ayant au moins:							
une ordonnance active	6 377	15 971	2 368	4 138	4 323	11 519	22 348
% de l'ensemble	15,6%	36,2%	10,6%	20,1%	21,3%	52,5%	26,3%
cinq ordonnances actives	413	1 039	3	26	176	1 247	1 452
% de l'ensemble	1,0%	2,4%	*	0,1%	0,9%	5,7%	1,7%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,3	0,7	0,1	0,3	0,4	1,3	0,5
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,0	2,0	1,2	1,3	1,8	2,5	2,0
Mauricie-Bois-Francs							
Nombre d'adhérents ayant au moins:							
une ordonnance active	7 647	18 225	2 584	4 468	4 904	13 916	25 872
% de l'ensemble	15,9%	35,2%	10,4%	19,5%	19,8%	51,1%	25,9%
cinq ordonnances actives	522	1 156	10	26	170	1 472	1 678
% de l'ensemble	1,1%	2,2%	*	0,1%	0,7%	5,4%	1,7%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,3	0,7	0,1	0,2	0,3	1,3	0,5
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,0	2,0	1,2	1,3	1,7	2,5	2,0
Estrie							
Nombre d'adhérents ayant au moins:							
une ordonnance active	4 096	9 919	1 587	2 565	2 622	7 241	14 015
% de l'ensemble	15,4%	33,8%	10,8%	19,3%	19,7%	49,7%	25,1%
cinq ordonnances actives	271	542	7	15	78	713	813
% de l'ensemble	1,0%	1,9%	0,1%	0,1%	0,6%	4,9%	1,5%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,3	0,7	0,1	0,2	0,3	1,2	0,5
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,0	1,9	1,2	1,3	1,7	2,4	1,9
Montréal-Centre							
Nombre d'adhérents ayant au moins:							
une ordonnance active	22 168	48 472	6 644	14 737	14 621	34 638	70 640
% de l'ensemble	14,3%	27,8%	8,8%	15,1%	18,5%	45,1%	21,4%
cinq ordonnances actives	1 622	3 050	45	138	676	3 813	4 672
% de l'ensemble	1,1%	1,8%	0,1%	0,1%	0,9%	5,0%	1,4%
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,3	0,5	0,1	0,2	0,3	1,1	0,4
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,0	2,0	1,3	1,3	1,8	2,5	2,0

Tableau 4 (suite)

	HOMMES ET FEMMES						
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Laval							
Nombre d'adhérents ayant au moins :							
une ordonnance active	4 838	10 642	1 497	2 768	3 080	8 135	15 480
% de l'ensemble	14,9 %	29,7 %	8,6 %	15,6 %	19,0 %	47,3 %	22,6 %
cinq ordonnances actives	350	635	7	24	121	833	985
% de l'ensemble	1,1 %	1,8 %	*	0,1 %	0,8 %	4,9 %	1,4 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,3	0,6	0,1	0,2	0,3	1,1	0,5
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,0	2,0	1,2	1,3	1,8	2,4	2,0
Laurentides							
Nombre d'adhérents ayant au moins :							
une ordonnance active	6 896	16 020	2 676	4 402	4 699	11 139	22 916
% de l'ensemble	14,9 %	31,7 %	10,5 %	18,6 %	18,8 %	49,2	23,6 %
cinq ordonnances actives	439	985	11	25	147	1 241	1 424
% de l'ensemble	1,0 %	2,0 %	*	0,1 %	0,6 %	5,5 %	1,5 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,3	0,6	0,1	0,2	0,3	1,2	0,5
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,0	1,9	1,3	1,3	1,7	2,5	1,9
Lanaudière							
Nombre d'adhérents ayant au moins :							
une ordonnance active	5 849	13 543	2 226	3 544	3 957	9 665	19 392
% de l'ensemble	15,4 %	33,5 %	10,7 %	19,1 %	20,0 %	50,3 %	24,7 %
cinq ordonnances actives	458	925	23	20	171	1 169	1 383
% de l'ensemble	1,2 %	2,3 %	0,1 %	0,1 %	0,9 %	6,1 %	1,8 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,3	0,7	0,1	0,2	0,4	1,3	0,5
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,1	2,0	1,3	1,3	1,8	2,6	2,0
Montérégie							
Nombre d'adhérents ayant au moins :							
une ordonnance active	16 472	39 479	6 186	10 829	11 100	27 836	55 951
% de l'ensemble ²	14,6 %	32,1 %	10,1 %	18,4 %	19,1 %	48,3 %	23,7 %
cinq ordonnances actives	1 159	2 291	27	67	427	2 929	3 450
% de l'ensemble	1,0 %	1,9 %	*	0,1 %	0,7 %	5,1 %	1,5 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,3	0,6	0,1	0,2	0,3	1,2	0,5
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,0	1,9	1,2	1,3	1,8	2,5	2,0

Tableau 4 (suite)

	HOMMES ET FEMMES						
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Outaouais							
Nombre d'adhérents ayant au moins :							
une ordonnance active	3 746	8 497	1 352	2 440	2 636	5 815	12 243
% de l'ensemble	15,1 %	31,6 %	9,9 %	17,4 %	20,7 %	51,4 %	23,7 %
cinq ordonnances actives	286	620	8	17	144	144	906
% de l'ensemble	1,2 %	2,3 %	0,1 %	0,1 %	1,1 %	6,5 %	1,8 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,3	0,6	0,1	0,2	0,4	1,3	0,5
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,0	2,0	1,3	1,3	1,9	2,6	2,0
Abitibi-Témiscamingue							
Nombre d'adhérents ayant au moins :							
une ordonnance active	2 583	5 878	1 001	1 430	1 749	4 281	8 461
% de l'ensemble	16,5 %	35,6 %	11,8 %	19,0 %	21,3 %	54,0 %	26,3 %
cinq ordonnances actives	205	456	6	11	87	557	661
% de l'ensemble	1,3 %	2,8 %	0,1 %	0,2 %	1,1 %	7,0 %	2,1 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,4	0,7	0,1	0,2	0,4	1,4	0,5
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,1	2,1	1,2	1,3	1,9	2,6	2,1
Côte-Nord							
Nombre d'adhérents ayant au moins :							
une ordonnance active	1 266	3 155	435	975	915	2 096	4 421
% de l'ensemble	15,7 %	36,3 %	10,8 %	20,5 %	22,5 %	53,4 %	26,4 %
cinq ordonnances actives	108	220	1	6	49	272	328
% de l'ensemble	1,3 %	2,5 %	*	0,1 %	1,2 %	6,9 %	2,0 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,3	0,7	0,1	0,3	0,4	1,4	0,6
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,2	2,0	1,3	1,3	1,9	2,7	2,1
Nord-du-Québec							
Nombre d'adhérents ayant au moins :							
une ordonnance active	173	515	85	147	100	356	688
% de l'ensemble	13,1 %	37,1 %	12,0 %	19,3 %	16,8 %	55,9 %	25,4 %
cinq ordonnances actives	11	50	1	1	2	57	61
% de l'ensemble	0,8 %	3,6 %	0,1 %	0,1 %	0,3 %	9,0 %	2,3 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,3	0,8	0,2	0,2	0,3	1,6	0,6
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	2,2	2,1	1,3	1,2	1,8	2,8	2,2

Tableau 4 (suite)

	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James							
Nombre d'adhérents ayant au moins:							
une ordonnance active	13	13	2	11	5	8	26
% de l'ensemble	16,3 %	14,4 %	3,6 %	17,7 %	15,6 %	38,1 %	15,3 %
cinq ordonnances actives	1	0	0	0	1	0	1
% de l'ensemble	1,3 %	—	—	—	3,1 %	—	0,6 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,3	0,3	*	0,2	0,4	0,8	0,3
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	1,9	1,8	1,0	1,4	2,8	2,0	1,8
Région indéterminée							
Nombre d'adhérents ayant au moins:							
une ordonnance active	1 267	3 168	550	1 516	878	1 491	4 435
% de l'ensemble	10,4 %	24,2 %	8,8 %	15,0 %	15,9 %	43,3 %	17,5 %
cinq ordonnances actives	71	123	2	11	30	151	194
% de l'ensemble	0,6 %	0,9 %	*	0,1 %	0,5 %	4,4 %	0,8 %
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne assurée	0,2	0,4	0,1	0,2	0,3	1,1	0,3
Nombre moyen d'ordonnances actives par personne participante	1,9	1,7	1,3	1,3	1,7	2,4	1,8

Tableau 5

**Répartition des adhérents participants
selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge,
régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998**

HOMMES ET FEMMES														
Nombre d'ordonnances actives	Hommes		Femmes		0-19 ans		20-34 ans		35-49 ans		50-64 ans		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	53 224	51,5	128 814	53,0	29 539	81,9	54 182	80,8	39 347	56,5	58 970	33,9	182 038	52,5
2	24 152	23,4	56 532	23,3	4 861	13,5	9 141	13,6	17 161	24,7	49 521	28,5	80 684	23,3
3	12 277	11,9	27 813	11,4	1 151	3,2	2 444	3,7	7 085	10,2	29 410	16,9	40 090	11,6
4	6 506	6,3	14 357	5,9	345	1,0	757	1,1	3 217	4,6	16 544	9,5	20 863	6,0
5	3 287	3,2	7 466	3,1	111	0,3	273	0,4	1 384	2,0	8 985	5,2	10 753	3,1
6	1 722	1,7	3 790	1,6	37	0,1	113	0,2	649	0,9	4 713	2,7	5 512	1,6
7	963	0,9	1 976	0,8	19	0,1	58	0,1	345	0,5	2 517	1,5	2 939	0,9
8	552	0,5	1 025	0,4	9	*	31	0,1	210	0,3	1 327	0,8	1 577	0,5
9	315	0,3	582	0,2	8	*	8	*	107	0,2	774	0,5	897	0,3
10 ou plus	432	0,4	751	0,3	4	*	14	*	119	0,2	1 046	0,6	1 183	0,3
Sous-total (1 à 4)	96 159	93,0	227 516	93,6	35 896	99,5	66 524	99,3	66 810	96,0	154 445	88,9	323 675	93,4
Sous-total (5 ou plus)	7 271	7,0	15 590	6,4	188	0,5	497	0,7	2 814	4,0	19 362	11,1	22 861	6,6
Total	103 430	100	243 106	100	36 084	100	67 021	100	69 624	100	173 807	100	346 536	100
		(29,8)		(70,2)		(10,4)		(19,3)		(20,1)		(50,2)		

Tableau 6

Répartition des adhérents participants (%) selon le nombre d'ordonnances actives et la région sociosanitaire et taux d'ordonnances actives pour 1 000 participants selon la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Nombre d'ordonnances actives	Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine	Bas-Saint-Laurent	Saguenay–Lac-Saint-Jean	Québec
1	51,3 %	52,5 %	49,3 %	50,4 %
2	24,2 %	22,7 %	23,6 %	23,9 %
3	11,5 %	12,0 %	12,8 %	12,2 %
4	6,4 %	6,3 %	6,8 %	6,5 %
5 ou plus	6,6 %	6,5 %	7,4 %	7,1 %
Taux d'ordonnances pour 1 000 adhérents participants	2 007	1 995	2 074	2 043

	Chaudière-Appalaches	Mauricie-Bois-Francs	Etrie	Montréal-Centre
1	52,6 %	52,4 %	53,6 %	52,8 %
2	23,2 %	23,1 %	23,5 %	23,3 %
3	11,7 %	12,3 %	11,3 %	11,4 %
4	6,2 %	5,8 %	6,0 %	5,9 %
5 ou plus	6,5 %	6,5 %	5,8 %	6,6 %
Taux d'ordonnances pour 1 000 adhérents participants	1 982	1 984	1 936	1 982

	Laval	Laurentides	Lanaudière	Montérégie
1	52,4 %	53,9 %	52,0 %	53,7 %
2	24,1 %	23,2 %	23,2 %	23,2 %
3	11,5 %	11,3 %	11,5 %	11,1 %
4	5,6 %	5,4 %	6,1 %	5,9 %
5 ou plus	6,4 %	6,2 %	7,1 %	6,2 %
Taux d'ordonnances pour 1 000 adhérents participants	1 972	1 943	2 019	1 950

Tableau 6 (suite)

Nombre d'ordonnances actives	Outaouais	Abitibi-Témiscamingue	Côte-Nord	Nord-du-Québec
1	52,4 %	50,8 %	50,3 %	50,4 %
2	22,7 %	23,0 %	22,7 %	21,4 %
3	11,1 %	12,0 %	12,7 %	11,5 %
4	6,2 %	6,4 %	6,8 %	7,9 %
5 ou plus	7,4 %	7,8 %	7,4 %	8,9 %
Taux d'ordonnances pour 1 000 adhérents participants	2 023	2 065	2 076	2 148

	Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James	Indéterminée		
1	57,7 %	61,0 %		
2	23,1 %	21,2 %		
3	3,9 %	9,2 %		
4	11,5 %	4,3 %		
5 ou plus	3,9 %	4,4 %		
Taux d'ordonnances pour 1 000 adhérents participants	1 808	1 752		

Tableau 7

Pourcentage des adhérents assurés ayant au moins une ordonnance active selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Classes de médicaments	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Anti-infectieux	1,4%	1,8%	2,1%	1,4%	1,4%	1,7%	1,6%
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	1,3%	1,5%	1,0%	1,1%	1,3%	2,3%	1,4%
– sympathomimétiques	1,0%	1,1%	1,0%	1,0%	0,8%	1,4%	1,0%
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	0,4%	0,5%	*	0,2%	0,5%	1,2%	0,5%
Cardiovasculaires	6,3%	7,6%	0,1%	0,6%	4,7%	23,1%	7,0%
– cardiotropes	3,0%	3,7%	0,1%	0,3%	2,1%	11,3%	3,4%
– hypolipémiants	2,8%	2,7%	*	0,2%	1,7%	9,2%	2,7%
– antihypertenseurs	2,8%	3,1%	0,1%	0,2%	1,8%	10,0%	3,0%
– vasodilatateurs	0,4%	0,3%	*	*	0,1%	1,2%	0,3%
Médicaments du système nerveux central (SNC)	5,7%	8,5%	1,7%	2,7%	7,3%	17,3%	7,2%
– analgésiques et antipyrétiques	2,4%	2,4%	0,2%	0,6%	1,8%	7,1%	2,4%
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	2,2%	2,1%	0,1%	0,5%	1,6%	6,5%	2,1%
• autres analgésiques et antipyrétiques	0,3%	0,4%	0,1%	0,1%	0,3%	0,9%	0,3%
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	0,5%	0,5%	0,3%	0,4%	0,6%	0,8%	0,5%
– psychotropes	1,3%	3,1%	0,2%	1,3%	3,1%	4,4%	2,2%
• antidépresseurs	1,1%	2,8%	0,1%	1,2%	2,7%	3,9%	2,0%
• tranquillisants	0,3%	0,4%	0,1%	0,2%	0,5%	0,7%	0,4%
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	2,1%	4,5%	0,2%	0,7%	3,4%	9,3%	3,3%
• benzodiazépines	2,0%	4,3%	0,1%	0,7%	3,2%	9,1%	3,2%
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	0,1%	0,2%	0,1%	0,1%	0,2%	0,4%	0,2%
– autres psychotropes	0,2%	0,3%	*	0,2%	0,4%	0,5%	0,3%
Électrolytes-diurétiques	1,2%	2,9%	*	0,2%	1,2%	7,1%	2,1%
– diurétiques	1,2%	2,8%	*	0,1%	1,2%	7,0%	2,0%
– autres électrolytes-diurétiques	0,1%	0,2%	*	*	0,1%	0,6%	0,2%
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	0,7%	0,9%	0,6%	0,6%	0,7%	1,4%	0,8%
Gastro-intestinaux	1,2%	1,8%	0,2%	0,6%	1,4%	3,9%	1,5%
– divers gastro-intestinaux	1,2%	1,7%	0,1%	0,5%	1,4%	3,8%	1,5%
• anti-ulcéreux	1,0%	1,4%	0,1%	0,4%	1,2%	3,4%	1,3%
• agents de motilité ou prokinétiques	0,2%	0,3%	*	0,1%	0,2%	0,6%	0,2%
– autres gastro-intestinaux	*	0,1%	*	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Hormones et substituts	3,0%	21,7%	4,7%	12,1%	7,8%	26,6%	12,8%
– corticostéroïdes	0,8%	1,0%	0,9%	0,5%	0,7%	1,6%	0,9%
– anovulants	–	7,6%	3,5%	10,5%	2,7%	0,1%	4,5%
– hypoglycémiant	1,6%	1,3%	0,1%	0,3%	1,0%	4,4%	1,4%
– thyroïdiens	0,7%	4,2%	0,2%	0,9%	2,4%	6,8%	2,5%
– autres hormones et substituts	0,1%	9,8%	0,1%	0,3%	2,9%	17,8%	5,2%
Dermatologie	0,6%	0,9%	0,7%	0,6%	0,7%	1,1%	0,8%
– anti-inflammatoires	0,4%	0,6%	0,4%	0,4%	0,4%	0,8%	0,5%
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	0,4%	0,3%
Spasmolytiques	0,1%	0,2%	*	*	0,1%	0,5%	0,2%
– respiratoires	0,1%	0,1%	*	*	0,1%	0,4%	0,1%
Classe Autres médicaments	0,7%	0,8%	0,3%	0,3%	0,5%	2,1%	0,8%
Médicaments des autres classes regroupées	1,1%	2,0%	0,5%	0,7%	1,2%	4,0%	1,6%
Ensemble des médicaments	15,2%	32,6%	10,2%	17,9%	20,0%	49,9%	24,3%

Tableau 7 (suite)

Classes de médicaments	HOMMES				FEMMES			
	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans
Anti-infectieux	2,1 %	1,0 %	1,2 %	1,5 %	2,2 %	1,8 %	1,5 %	1,9 %
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	1,1 %	1,1 %	1,1 %	2,1 %	0,9 %	1,2 %	1,5 %	2,5 %
– sympathomimétiques	1,1 %	0,9 %	0,7 %	1,3 %	0,9 %	1,0 %	0,9 %	1,4 %
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	0,1 %	0,2 %	0,4 %	1,1 %	*	0,2 %	0,6 %	1,2 %
Cardiovasculaires	0,2 %	0,6 %	5,0 %	22,6 %	0,1 %	0,6 %	4,4 %	23,5 %
– cardiotropes	0,1 %	0,3 %	2,1 %	11,0 %	0,1 %	0,3 %	2,2 %	11,5 %
– hypolipémiantes	*	0,2 %	2,3 %	9,9 %	*	0,1 %	1,2 %	8,8 %
– antihypertenseurs	0,1 %	0,3 %	2,0 %	10,3 %	*	0,2 %	1,7 %	9,7 %
– vasodilatateurs	*	*	0,2 %	1,6 %	*	*	0,1 %	0,9 %
Médicaments du système nerveux central (SNC)	2,3 %	2,2 %	5,6 %	14,4 %	1,1 %	3,1 %	8,9 %	19,5 %
– analgésiques et antipyrétiques	0,2 %	0,5 %	1,9 %	7,9 %	0,3 %	0,6 %	1,8 %	6,4 %
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	0,1 %	0,4 %	1,7 %	7,4 %	0,2 %	0,5 %	1,5 %	5,7 %
• autres analgésiques et antipyrétiques	0,1 %	0,1 %	0,3 %	0,7 %	0,1 %	0,1 %	0,3 %	1,0 %
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	0,3 %	0,4 %	0,6 %	0,8 %	0,3 %	0,3 %	0,6 %	0,8 %
– psychotropes	0,2 %	1,0 %	1,9 %	2,5 %	0,2 %	1,7 %	4,2 %	5,8 %
• antidépresseurs	0,1 %	0,8 %	1,6 %	2,1 %	0,2 %	1,6 %	3,8 %	5,2 %
• tranquillisants	0,1 %	0,2 %	0,5 %	0,6 %	*	0,2 %	0,6 %	0,9 %
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	0,2 %	0,6 %	2,3 %	6,0 %	0,2 %	0,9 %	4,4 %	11,7 %
• benzodiazépines	0,1 %	0,5 %	2,2 %	5,9 %	0,1 %	0,8 %	4,2 %	11,4 %
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,5 %
– autres psychotropes	*	0,2 %	0,3 %	0,4 %	*	0,2 %	0,5 %	0,5 %
Électrolytes-diurétiques	*	0,1 %	0,8 %	4,7 %	*	0,2 %	1,6 %	8,9 %
– diurétiques	*	0,1 %	0,7 %	4,6 %	*	0,2 %	1,6 %	8,7 %
– autres électrolytes-diurétiques	*	*	0,1 %	0,5 %	*	*	0,1 %	0,6 %
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	0,6 %	0,5 %	0,6 %	1,2 %	0,6 %	0,7 %	0,8 %	1,5 %
Gastro-intestinal	0,1 %	0,5 %	1,3 %	3,4 %	0,2 %	0,7 %	1,6 %	4,3 %
– divers gastro-intestinaux	0,1 %	0,5 %	1,3 %	3,3 %	0,2 %	0,6 %	1,5 %	4,2 %
• anti-ulcéreux	0,1 %	0,4 %	1,1 %	3,0 %	0,1 %	0,4 %	1,3 %	3,7 %
• agents de motilité ou prokinétiques	*	*	0,1 %	0,4 %	*	0,1 %	0,2 %	0,8 %
– autres gastro-intestinaux	*	*	0,1 %	0,1 %	*	0,2 %	0,1 %	0,1 %
Hormones et substituts	1,2 %	1,1 %	2,5 %	8,3 %	8,2 %	23,0 %	12,9 %	40,0 %
– corticostéroïdes	1,0 %	0,5 %	0,6 %	1,4 %	0,8 %	0,6 %	0,8 %	1,7 %
– anovulants	–	–	–	–	7,1 %	20,7 %	2,7 %	0,1 %
– hypoglycémiantes	0,1 %	0,4 %	1,2 %	5,4 %	0,1 %	0,3 %	0,8 %	3,7 %
– thyroïdiens	0,1 %	0,2 %	0,7 %	1,9 %	0,2 %	1,5 %	4,0 %	10,3 %
– autres hormones et substituts	0,1 %	*	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,5 %	5,6 %	30,7 %
Dermatologie	0,6 %	0,4 %	0,5 %	1,0 %	0,8 %	0,8 %	0,8 %	1,2 %
– anti-inflammatoires	0,4 %	0,3 %	0,4 %	0,7 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,8 %
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	0,3 %	0,2 %	0,2 %	0,4 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,4 %
Spasmolytiques	*	*	0,1 %	0,4 %	*	*	0,1 %	0,6 %
– respiratoires	*	*	0,1 %	0,4 %	*	*	0,1 %	0,4 %
Classe Autres médicaments	0,3 %	0,2 %	0,5 %	2,2 %	0,3 %	0,4 %	0,5 %	2,1 %
Médicaments des autres classes regroupées	0,5 %	0,4 %	0,9 %	3,0 %	0,5 %	0,9 %	1,5 %	4,7 %
Ensemble des médicaments	7,4 %	6,6 %	14,1 %	36,8 %	13,0 %	28,9 %	25,5 %	59,6 %

Tableau 8

Répartition des ordonnances actives chez les adhérents assurés selon les classes de médicaments, l'âge et le sexe, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Classes de médicaments	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Anti-infectieux	5,6 %	3,0 %	17,3 %	6,8 %	4,9 %	1,5 %	3,8 %
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	4,7 %	2,6 %	8,3 %	5,0 %	3,8 %	2,1 %	3,2 %
– sympathomimétiques	3,4 %	1,7 %	7,9 %	4,3 %	2,3 %	1,2 %	2,2 %
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	1,3 %	0,9 %	0,3 %	0,7 %	1,5 %	1,0 %	1,0 %
Cardiovasculaires	31,5 %	16,2 %	1,1 %	3,1 %	17,2 %	27,5 %	20,9 %
– cardiotropes	10,9 %	6,3 %	0,6 %	1,4 %	6,4 %	10,1 %	7,7 %
– hypolipémiants	9,1 %	4,2 %	0,1 %	0,7 %	4,9 %	7,5 %	5,7 %
– antihypertenseurs	10,1 %	5,2 %	0,5 %	1,0 %	5,5 %	8,8 %	6,7 %
– vasodilatateurs	1,4 %	0,5 %	*	*	0,4 %	1,1 %	0,8 %
Médicaments du système nerveux central (SNC)	25,2 %	18,9 %	15,5 %	15,6 %	29,5 %	19,9 %	20,8 %
– analgésiques et antipyrétiques	8,2 %	4,0 %	1,6 %	2,7 %	5,5 %	6,1 %	5,3 %
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	7,2 %	3,3 %	1,0 %	2,0 %	4,5 %	5,4 %	4,5 %
• autres analgésiques et antipyrétiques	1,0 %	0,7 %	0,7 %	0,6 %	1,0 %	0,8 %	0,8 %
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	2,1 %	1,0 %	2,5 %	2,1 %	2,3 %	0,8 %	1,4 %
– psychotropes	5,1 %	5,4 %	2,0 %	6,6 %	9,9 %	4,1 %	5,3 %
• antidépresseurs	3,8 %	4,7 %	1,2 %	5,6 %	8,3 %	3,4 %	4,4 %
• tranquillisants	1,2 %	0,7 %	0,7 %	1,0 %	1,6 %	0,7 %	0,9 %
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	7,5 %	7,8 %	1,4 %	3,5 %	10,6 %	8,4 %	7,8 %
• benzodiazépines	7,1 %	7,5 %	0,8 %	3,2 %	10,0 %	8,1 %	7,4 %
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	0,5 %	0,4 %	0,7 %	0,3 %	0,6 %	0,3 %	0,4 %
– autres psychotropes	0,7 %	0,5 %	0,1 %	0,7 %	1,2 %	0,4 %	0,6 %
Électrolytes-diurétiques	4,4 %	4,8 %	0,3 %	0,7 %	3,6 %	6,2 %	4,7 %
– diurétiques	4,0 %	4,4 %	0,2 %	0,6 %	3,3 %	5,7 %	4,3 %
– autres électrolytes-diurétiques	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,1 %	0,3 %	0,5 %	0,4 %
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	2,4 %	1,5 %	5,1 %	2,6 %	2,1 %	1,2 %	1,8 %
Gastro-intestinaux	4,4 %	3,1 %	1,5 %	2,9 %	4,4 %	3,5 %	3,5 %
– divers gastro-intestinaux	4,2 %	2,9 %	1,2 %	2,5 %	4,2 %	3,4 %	3,3 %
• anti-ulcéreux	3,4 %	2,3 %	0,7 %	1,7 %	3,4 %	2,8 %	2,6 %
• agents de motilité ou prokinétiques	0,5 %	0,5 %	0,3 %	0,2 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
– autres gastro-intestinaux	0,2 %	0,2 %	0,3 %	0,4 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %
Hormones et substituts	12,6 %	44,0 %	38,2 %	55,9 %	27,5 %	31,8 %	34,4 %
– corticostéroïdes	2,8 %	1,6 %	7,3 %	2,4 %	2,0 %	1,3 %	2,0 %
– anovulants	–	11,9 %	27,5 %	46,0 %	6,1 %	0,1 %	8,9 %
– hypoglycémiant	7,3 %	3,0 %	1,3 %	2,1 %	4,0 %	5,1 %	4,3 %
– thyroïdiens	2,3 %	6,7 %	1,3 %	4,0 %	6,9 %	5,6 %	5,4 %
– autres hormones et substituts	0,2 %	20,8 %	0,8 %	1,4 %	10,6 %	19,7 %	14,5 %
Dermatologie	2,4 %	1,5 %	6,2 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	1,8 %
– anti-inflammatoires	1,5 %	1,0 %	3,5 %	1,8 %	1,4 %	0,7 %	1,1 %
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	0,9 %	0,5 %	2,5 %	1,2 %	0,7 %	0,3 %	0,6 %
Spasmodiques	0,4 %	0,3 %	0,2 %	0,2 %	0,3 %	0,4 %	0,3 %
– respiratoires	0,3 %	0,2 %	*	0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,2 %
Classe Autres médicaments	2,8 %	1,4 %	2,3 %	1,5 %	1,6 %	1,9 %	1,8 %
Médicaments des autres classes non retenues	4,2 %	3,5 %	4,6 %	3,3 %	3,8 %	3,7 %	3,7 %
Ensemble des médicaments	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Nombre d'ordonnances actives	210 027	478 575	45 193	85 758	125 026	432 625	688 602

Tableau 8 (suite)

Classes de médicaments	HOMMES				FEMMES			
	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans
Anti-infectieux	21,7 %	12,5 %	7,1 %	2,0 %	14,4 %	5,3 %	3,7 %	1,3 %
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	11,7 %	11,3 %	4,5 %	2,8 %	6,1 %	3,4 %	3,5 %	1,8 %
- sympathomimétiques	11,2 %	9,7 %	2,9 %	1,6 %	5,8 %	2,9 %	2,0 %	1,0 %
- autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	0,6 %	1,6 %	1,6 %	1,2 %	0,2 %	0,4 %	1,4 %	0,9 %
Cardiovasculaires	1,7 %	7,9 %	26,4 %	40,5 %	0,8 %	1,8 %	12,1 %	22,0 %
- cardiotropes	0,7 %	3,0 %	8,7 %	14,1 %	0,5 %	1,0 %	5,2 %	8,4 %
- hypolipémiants	0,1 %	2,0 %	8,9 %	11,3 %	0,1 %	0,4 %	2,7 %	5,9 %
- antihypertenseurs	0,9 %	2,9 %	8,2 %	13,0 %	0,2 %	0,5 %	4,0 %	7,0 %
- vasodilatateurs	*	0,1 %	0,6 %	2,0 %	*	*	0,2 %	0,7 %
Médicaments du système nerveux central (SNC)	26,5 %	31,1 %	30,7 %	22,2 %	8,6 %	11,5 %	28,9 %	18,9 %
- analgésiques et antipyrétiques	1,6 %	5,8 %	7,7 %	9,6 %	1,7 %	1,8 %	4,3 %	4,6 %
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	0,8 %	4,4 %	6,5 %	8,7 %	1,1 %	1,4 %	3,4 %	3,9 %
• autres analgésiques et antipyrétiques	0,8 %	1,4 %	1,2 %	0,9 %	0,6 %	0,4 %	0,9 %	0,7 %
- anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	3,3 %	5,7 %	3,2 %	1,1 %	1,9 %	1,1 %	1,8 %	0,7 %
- psychotropes	2,5 %	11,3 %	8,5 %	3,3 %	1,6 %	5,3 %	10,7 %	4,4 %
• antidépresseurs	1,2 %	8,4 %	6,5 %	2,6 %	1,3 %	4,9 %	9,3 %	3,8 %
• tranquillisants	1,3 %	2,9 %	2,0 %	0,7 %	0,3 %	0,5 %	1,4 %	0,6 %
- anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	1,8 %	6,4 %	10,0 %	7,6 %	1,2 %	2,7 %	10,9 %	8,8 %
• benzodiazépines	0,9 %	5,9 %	9,3 %	7,3 %	0,7 %	2,5 %	10,4 %	8,4 %
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	0,9 %	0,5 %	0,7 %	0,3 %	0,5 %	0,3 %	0,6 %	0,4 %
- autres psychotropes	0,1 %	1,8 %	1,3 %	0,5 %	0,1 %	0,5 %	1,1 %	0,4 %
Électrolytes-diurétiques	0,3 %	1,1 %	3,1 %	5,9 %	0,3 %	0,6 %	3,8 %	6,3 %
- diurétiques	0,2 %	1,0 %	2,8 %	5,4 %	0,2 %	0,5 %	3,5 %	5,9 %
- autres électrolytes-diurétiques	0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,6 %	0,1 %	0,1 %	0,3 %	0,4 %
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	6,6 %	4,9 %	2,4 %	1,5 %	4,1 %	2,0 %	1,9 %	1,1 %
Gastro-intestinal	1,6 %	5,8 %	5,4 %	4,2 %	1,5 %	2,2 %	3,8 %	3,2 %
- divers gastro-intestinaux	1,2 %	5,6 %	5,2 %	4,1 %	1,2 %	1,7 %	3,7 %	3,1 %
• anti-ulcéreux	0,6 %	3,9 %	4,3 %	3,5 %	0,7 %	1,2 %	2,9 %	2,5 %
• agents de motilité ou prokinétiques	0,4 %	0,4 %	0,5 %	0,5 %	0,3 %	0,2 %	0,5 %	0,5 %
- autres gastro-intestinaux	0,4 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	0,4 %	0,1 %	0,1 %
Hormones et substituts	13,7 %	13,4 %	12,0 %	12,6 %	53,7 %	67,2 %	36,1 %	40,0 %
- corticostéroïdes	10,4 %	4,9 %	2,4 %	1,7 %	5,3 %	1,8 %	1,8 %	1,2 %
- anovulants	-	-	-	-	44,9 %	58,2 %	6,1 %	0,1 %
- hypoglycémiant	1,8 %	5,6 %	6,5 %	8,6 %	1,0 %	1,2 %	2,7 %	3,6 %
- thyroïdiens	0,9 %	2,5 %	2,9 %	2,2 %	1,6 %	4,4 %	9,2 %	7,1 %
- autres hormones et substituts	0,5 %	0,4 %	0,2 %	0,1 %	1,0 %	1,6 %	16,4 %	28,1 %
Dermatologie	7,3 %	5,1 %	2,4 %	1,3 %	5,4 %	2,4 %	1,8 %	0,9 %
- anti-inflammatoires	4,2 %	3,1 %	1,6 %	0,9 %	3,2 %	1,5 %	1,2 %	0,6 %
- autres médicaments pour la peau et les muqueuses	3,0 %	2,0 %	0,8 %	0,4 %	2,2 %	0,9 %	0,6 %	0,3 %
Spasmodiques	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,5 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	0,4 %
- respiratoires	0,1 %	0,2 %	0,2 %	0,4 %	*	0,1 %	0,2 %	0,2 %
Classe Autres médicaments	3,3 %	2,8 %	2,3 %	2,8 %	1,7 %	1,1 %	1,2 %	1,5 %
Médicaments des autres classes non retenues	6,0 %	5,0 %	4,0 %	4,0 %	3,7 %	2,8 %	3,7 %	3,5 %
Ensemble des médicaments	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Nombre d'ordonnances actives	17 473	18 047	44 555	129 952	27 720	67 711	80 471	302 673

Tableau 9

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 adhérents assurés selon les classes de médicaments, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Classes de médicaments	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Anti-infectieux	17	19	22	16	17	19	18
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	14	16	11	11	14	26	15
– sympathomimétiques	10	11	10	10	8	15	11
– autres médicaments du système nerveux autonome (SNA)	4	5	0	2	5	12	5
Cardiovasculaires	97	104	1	7	62	342	101
– cardiotropes	33	40	1	3	23	126	37
– hypolipémiants	28	27	0	2	17	94	28
– antihypertenseurs	31	33	1	2	20	109	32
– vasodilatateurs	4	3	0	0	1	13	4
Médicaments du système nerveux central (SNC)	77	121	20	36	106	247	101
– analgésiques et antipyrétiques	25	25	2	6	20	76	25
• anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)	22	21	1	5	16	66	22
• autres analgésiques et antipyrétiques	3	4	1	1	4	10	4
– anticonvulsivants (sauf les benzodiazépines)	7	6	3	5	8	10	7
– psychotropes	16	35	2	15	36	51	26
• antidépresseurs	12	30	2	13	30	42	21
• tranquillisants	4	5	1	2	6	8	4
– anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	23	50	2	8	38	105	37
• benzodiazépines	22	48	1	7	36	101	35
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	1	2	1	1	2	4	2
– autres psychotropes	2	3	0	2	4	5	3
Électrolytes-diurétiques	14	30	0	2	13	77	22
– diurétiques	12	28	0	1	12	71	21
– autres électrolytes-diurétiques	1	2	0	0	1	6	2
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	7	10	6	6	7	15	9
Gastro-intestinaux	13	20	2	7	16	44	17
– divers gastro-intestinaux	13	18	2	6	15	42	16
• anti-ulcéreux	11	15	1	4	12	35	13
• agents de motilité ou prokinétiques	1	3	0	1	2	6	2
– autres gastro-intestinaux	0	1	0	1	1	1	1
Hormones et substituts	39	281	49	128	99	395	166
– corticostéroïdes	9	10	9	6	7	16	9
– anovulants	–	76	35	105	14	1	40
– hypoglycémiant	23	19	2	5	14	64	21
– thyroïdiens	7	43	2	9	25	70	26
– autres hormones et substituts	1	133	1	3	38	245	70
Dermatologie	7	10	8	7	7	12	9
– anti-inflammatoires	5	6	5	4	5	8	5
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	3	3	3	3	2	4	3
Spasmolytiques	1	2	0	0	1	5	2
– respiratoires	1	1	0	0	1	4	1
Classe Autres médicaments	8	9	3	3	6	23	9
Médicaments des autres classes non retenues	11	17	5	6	11	36	14
Ensemble des médicaments	307	638	128	228	358	1 243	483

Tableau 10

Taux d'ordonnances actives pour 1 000 adhérents assurés selon les classes de médicaments et la région sociosanitaire, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Classes de médicaments	RÉGION SOCIOSANITAIRE																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	99
Anti-infectieux	15	18	18	15	19	23	18	18	14	13	17	16	18	17	16	18	6	17
Médicaments du système nerveux autonome (SNA)	17	21	18	14	12	14	16	17	17	20	18	14	13	18	15	15	*	11
– sympathomimétiques	11	15	13	10	9	9	12	11	12	15	13	9	9	12	12	10	*	9
– autres médicaments système nerveux (SNA)	5	6	5	5	3	5	5	6	5	5	5	5	4	6	4	5	*	2
Cardiovasculaires	113	130	126	114	99	82	98	114	134	133	118	106	98	109	93	97	52	50
– cardiotropes	40	52	47	42	36	30	35	41	55	47	44	39	35	41	33	37	*	19
– hypolipémiants	37	37	38	31	27	20	23	32	39	37	32	31	27	33	26	25	17	13
– antihypertenseurs	33	38	36	36	32	29	35	37	35	44	37	32	33	31	31	32	35	16
– vasodilatateurs	4	4	5	5	3	3	5	4	6	6	6	4	3	4	4	3	*	2
Médicaments du système nerveux central (SNC)	112	122	126	113	106	88	108	114	99	90	123	109	85	100	93	92	87	59
– analgésiques et antipyrétiques	28	33	28	29	28	20	26	35	31	31	33	25	22	28	26	24	17	14
• anti-inflammatoires non stéroïdiens	23	29	24	25	24	17	21	30	28	27	28	22	19	24	22	21	17	11
• autres analgésiques et antipyrétiques	5	4	4	4	4	3	4	6	3	4	5	4	4	4	4	3	*	3
– anticonvulsifs (sauf les benzodiazépines)	7	8	8	6	7	7	6	5	6	7	7	7	7	6	5	6	*	3
– psychotropes	25	30	31	26	29	26	33	26	20	23	25	25	22	23	22	23	35	17
• antidépresseurs	21	27	26	22	26	21	29	23	17	21	22	21	18	19	20	19	35	14
• tranquillisants	4	4	6	4	3	6	4	3	3	1	2	4	4	4	2	4	*	3
– anxiolytiques, sédatifs, hypnotiques	46	44	52	46	36	30	39	40	39	27	53	46	29	37	34	33	23	22
• benzodiazépines	44	42	48	44	34	28	36	38	37	25	51	43	28	35	33	32	23	20
• divers anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques	2	2	3	2	2	2	3	2	1	1	2	2	1	2	1	2	*	1
– autres psychotropes	3	4	4	2	2	3	2	2	1	2	2	4	2	3	2	3	6	2
Électrolytes diurétiques	21	22	24	22	19	22	26	21	22	18	25	22	25	25	22	22	6	11
– diurétiques	20	21	23	21	17	20	24	19	20	16	23	22	22	23	20	20	6	10
– autres électrolytes-diurétiques	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	3	2	2	2	*	1
Oto-rhino-laryngologie (ORLO)	7	7	12	8	8	9	7	7	8	6	9	9	8	8	8	8	6	7
Gastro-intestinaux	20	22	19	16	19	15	20	23	25	22	28	16	14	16	16	14	6	11
– divers gastro-intestinaux	18	20	17	15	18	13	19	21	22	19	25	14	12	14	14	13	6	9
• anti-ulcéreux	15	17	14	12	15	11	16	18	19	15	20	12	11	12	12	11	6	8
• agents de motilité ou prokinétique	3	4	2	2	3	2	3	3	3	4	5	3	2	2	2	2	*	1
– autres gastro-intestinaux	1	2	2	1	1	2	1	2	3	2	3	1	2	2	2	1	*	1
Hormones et substituts	190	207	205	177	170	133	150	194	188	213	197	194	149	172	165	163	87	113
– corticostéroïdes	10	11	11	9	8	8	9	10	12	11	12	9	8	11	10	10	12	7
– anovulants	46	41	49	44	41	31	38	44	49	55	46	46	31	41	42	41	41	45
– hypoglycémiant	16	14	21	21	19	23	23	20	22	23	24	16	22	21	19	21	6	11
– thyroïdiens	32	28	30	27	26	22	23	32	30	36	25	35	27	25	25	25	12	14
– autres hormones, substituts	86	112	95	76	76	49	56	88	75	88	90	87	61	73	69	66	17	35

Tableau 10 (suite)

Classes de médicaments	RÉGION SOCIOSANITAIRE																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	99
Dermatologie	7	9	9	8	7	10	9	6	11	8	9	7	9	8	7	8	6	9
– anti-inflammatoires	5	6	6	5	4	6	6	4	8	7	6	4	6	5	5	5	6	6
– autres médicaments pour la peau et les muqueuses	2	3	3	3	3	4	3	2	3	2	3	3	3	3	2	3	*	3
Spasmolytiques	2	2	2	2	1	2	2	2	1	3	2	2	1	2	2	2	*	1
– respiratoires	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	*	1
Classe Autres médicaments	7	6	10	8	9	10	8	9	7	6	7	8	9	8	7	9	6	6
Médicaments des autres classes non retenues	16	14	16	15	14	15	13	17	17	15	16	14	14	14	12	14	12	10

Légende des régions sociosanitaires

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Bas-St-Laurent | 10. Nord-du-Québec |
| 2. Saguenay–Lac-St-Jean | 11. Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine |
| 3. Québec | 12. Chaudière–Appalaches |
| 4. Mauricie–Bois-Francs | 13. Laval |
| 5. Estrie | 14. Lanaudière |
| 6. Montréal-Centre | 15. Laurentides |
| 7. Outaouais | 16. Montérégie |
| 8. Abitibi-Témiscamingue | 20. Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James |
| 9. Côte-Nord | 99. Indéterminée |

Tableau 11

Répartition des adhérents participants¹ selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de prescripteurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Nombre d'ordonnances actives	NOMBRE DE PRESCRIPTEURS									
	1		2		3		4 ou plus		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	182 038	100,0	—	—	—	—	—	—	182 038	52,6
2	61 462	76,2	19 020	23,6	—	—	—	—	80 482	23,2
3	24 712	61,6	13 377	33,4	1 925	4,8	—	—	40 014	11,6
4	11 315	54,2	7 354	35,3	1 967	9,4	189	0,9	20 825	6,0
5	5 147	47,9	3 939	36,6	1 375	12,8	273	2,5	10 734	3,1
6	2 259	41,0	2 058	37,3	894	16,2	292	5,3	5 503	1,6
7 à 9	1 804	33,3	2 001	37,0	1 074	19,8	523	9,7	5 402	1,6
10 ou plus	256	21,6	375	31,7	280	23,7	271	22,9	1 182	0,3
Sous-total 1 à 4	279 527	86,4	39 751	12,3	3 892	1,2	189	0,1	323 359	93,4
Sous-total 5 ou plus	9 466	41,4	8 373	36,6	3 623	15,9	1 359	5,9	22 821	6,6
Total	288 993	83,4	48 124	13,9	7 515	2,2	1 548	0,5	346 180 ¹	100

¹ La répartition selon le nombre de prescripteurs n'a pu être faite pour 356 adhérents participants, aucune donnée relativement aux prescripteurs n'étant disponible parce qu'ils exercent à l'extérieur du Québec et ne sont pas inscrits à la RAMQ, soit pour 202 adhérents qui ont deux ordonnances actives, 76 qui en ont trois, 38 qui en ont quatre, 19 qui en ont cinq, 9 qui en ont six, 11 qui en ont de sept à neuf et 1 qui en ont dix ou plus.

Tableau 12

Répartition des adhérents participants selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de pharmaciens, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Nombre d'ordonnances actives	NOMBRE DE PHARMACIENS									
	1		2		3		4 ou plus		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	182 038	100,0	—	—	—	—	—	—	182 038	52,5
2	76 089	94,3	4 595	5,7	—	—	—	—	80 684	23,3
3	37 229	92,9	2 749	6,9	112	0,3	—	—	40 090	11,6
4	19 245	92,2	1 504	7,2	109	0,5	5	*	20 863	6,0
5	9 893	92,0	814	7,6	43	0,4	3	*	10 753	3,1
6	5 025	91,2	448	8,1	32	0,6	7	0,1	5 512	1,6
7 à 9	4 841	89,4	510	9,4	58	1,1	4	0,1	5 413	1,6
10 ou plus	1 042	88,1	126	10,7	12	1,0	3	0,3	1 183	0,3
Sous-total 1 à 4	314 601	97,2	8 848	2,7	221	0,1	5	*	323 675	93,4
Sous-total 5 ou plus	20 801	91,0	1 898	8,3	145	0,6	17	0,1	22 861	6,6
Total	335 402	96,8	10 746	3,1	366	0,1	22	*	346 536	100

ANNEXE 6

Tableaux relatifs à la consommation médicamenteuse des personnes de 64 ans ou moins inscrites au régime d'assurance médicaments administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), 11 juin 2000

Tableau 1

Répartition des personnes assurées de 64 ans ou moins selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 2

Répartition des personnes assurées de 64 ans ou moins selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 3

Répartition des ordonnances actives chez les personnes assurées de 64 ans ou moins selon le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 5

Répartition des personnes participantes de 64 ans ou moins selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 11

Répartition des personnes participantes de 64 ans ou moins selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de prescripteurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 12

Répartition des personnes participantes de 64 ans ou moins selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de pharmaciens, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Tableau 1

**Répartition des personnes assurées de 64 ans ou moins
selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge,
régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000**

Région sociosanitaire	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine	21 726	22 666	11 585	8 845	13 283	10 679	44 392 2,0%
Bas-St-Laurent	35 531	37 530	18 821	16 064	20 096	18 080	73 061 3,3%
Saguenay-Lac-St-Jean	39 755	43 857	21 678	20 496	21 963	19 475	83 612 3,8%
Québec	81 701	91 220	36 812	47 851	43 599	44 659	172 921 7,9%
Chaudière-Appalaches	52 784	57 363	28 380	25 682	27 641	28 444	110 147 5,0%
Mauricie-Bois-Francs	72 465	79 515	39 019	34 187	39 621	39 153	151 980 7,0%
Estrie	40 313	44 165	22 709	19 691	21 167	20 911	84 478 3,9%
Montréal-Centre	286 455	311 174	158 167	161 122	155 078	123 262	597 629 27,4%
Laval	43 061	48 835	24 619	22 396	23 228	21 653	91 896 4,2%
Laurentides	67 178	73 980	39 741	31 509	37 992	31 916	141 158 6,5%
Lanaudière	54 445	59 592	32 261	24 913	30 003	26 860	114 037 5,2%
Montérégie	160 549	179 027	92 156	80 853	86 564	79 998	339 576 15,5%
Outaouais	42 194	45 856	25 514	21 856	23 194	17 486	88 050 4,0%
Abitibi-Témiscamingue	23 899	25 278	13 555	11 451	13 079	11 092	49 177 2,3%
Côte-Nord	12 689	13 815	7 012	6 963	6 861	5 668	26 504 1,2%
Nord-du-Québec	1 959	2 141	1 110	1 006	1 023	961	4 100 0,2%
Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James	979	1 039	986	638	249	145	2 018 0,1%
Région indéterminée	4 773	5 137	2 679	3 323	2 351	1 557	9 910 0,5%
Ensemble du Québec	1 042 456 47,7%	1 142 190 52,3%	576 804 26,4%	538 851 24,7%	566 992 26,0%	501 999 23,0%	2 184 646 100%

Tableau 2

Répartition des personnes assurées de 64 ans ou moins selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

	HOMMES (ANS)					FEMMES (ANS)					HOMMES ET FEMMES (ANS)				
	0-19	20-34	35-49	50-64	Total	0-19	20-34	35-49	50-64	Total	0-19	20-34	35-49	50-64	Total
Aucune ordonnance active	264 269	230 396	222 509	126 824	843 998	248 933	198 976	196 819	98 680	743 408	513 202	429 372	419 328	225 504	1 587 406
	91,3 %	90,6 %	79,9 %	57,7 %	81,0 %	86,7 %	70,0 %	68,2 %	35,0 %	65,1 %	89,0 %	79,7 %	74,0 %	44,9 %	72,7 %
Au moins une ordonnance active	25 271	24 017	56 017	93 153	198 458	38 331	85 462	91 647	183 342	398 782	63 602	109 479	147 664	276 495	597 240
	8,7 %	9,4 %	20,1 %	42,3 %	19,0 %	13,3 %	30,0 %	31,8 %	65,0 %	34,9 %	11,0 %	20,3 %	26,0 %	55,1 %	27,3 %
Total	289 540	254 413	278 526	219 977	1 042 456	287 264	284 438	288 466	282 022	1 142 190	576 804	538 851	566 992	501 999	2 184 646
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	27,8 %	24,4 %	26,7 %	21,1 %	100 %	25,2 %	24,9 %	25,3 %	24,7 %	100 %	26,4 %	24,7 %	26,0 %	23,0 %	100 %
Au moins cinq ordonnances actives	274	1 618	7 628	18 715	28 235	265	1 899	10 524	38 711	51 399	539	3 517	18 152	57 426	79 634
	0,1 %	0,6 %	2,7 %	8,5 %	2,7 %	0,1 %	0,7 %	3,6 %	13,7 %	4,5 %	0,1 %	0,7 %	3,2 %	11,4 %	3,6 %

Tableau 3

Répartition des ordonnances actives chez les personnes assurées de 64 ans ou moins selon le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Ordonnances actives

HOMMES

	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Total	35 299	46 659	141 354	283 456	506 768 34,4%
Moyenne par personne assurée	0,1	0,2	0,5	1,3	0,5
Moyenne par personne participante	1,4	1,9	2,5	3,0	2,6

FEMMES

	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Total	48 722	121 161	215 023	582 531	967 437 65,6%
Moyenne par personne assurée	0,2	0,4	0,7	2,1	0,8
Moyenne par personne participante	1,3	1,4	2,3	3,2	2,4

HOMMES ET FEMMES

	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Total	84 021 5,7%	167 820 11,4%	356 377 24,2%	865 987 58,7%	1 474 205 100%
Moyenne par personne assurée	0,1	0,3	0,6	1,7	0,7
Moyenne par personne participante	1,3	1,5	2,4	3,1	2,5

Tableau 5

Répartition des personnes participantes de 64 ans ou moins selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Nombre d'ordonnances actives	HOMMES ET FEMMES													
	Hommes		Femmes		0-19 ans		20-34 ans		35-49 ans		50-64 ans		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	84 508	42,6	185 255	46,5	49 547	77,9	78 846	72,0	66 493	45,0	74 877	27,1	269 763	45,2
2	43 418	21,9	83 996	21,1	10 085	15,9	17 613	16,1	33 405	22,6	66 311	24,0	127 414	21,3
3	26 083	13,1	48 538	12,2	2 642	4,2	6 613	6,0	18 621	12,6	46 745	16,9	74 621	12,5
4	16 214	8,2	29 594	7,4	789	1,2	2 890	2,6	10 993	7,4	31 136	11,3	45 808	7,7
5	9 908	5,0	18 717	4,7	290	0,5	1 562	1,4	6 626	4,5	20 147	7,3	28 625	4,8
6	6 655	3,4	11 680	2,9	124	0,2	842	0,8	4 191	2,8	12 578	4,5	18 335	3,1
7	4 221	2,1	7 322	1,8	55	0,1	494	0,5	2 625	1,8	8 369	3,0	11 543	1,9
8	2 570	1,3	4 796	1,2	33	0,1	236	0,2	1 618	1,1	5 479	2,0	7 366	1,2
9	1 776	0,9	3 067	0,8	18	0,0	139	0,1	1 128	0,8	3 558	1,3	4 843	0,8
10 ou plus	3 105	1,6	5 817	1,5	19	0,0	244	0,2	1 964	1,3	6 695	2,4	8 922	1,5
Sous-total (1 à 4)	170 223	85,8	347 383	87,1	63 063	99,2	105 962	96,8	129 512	87,7	219 069	79,2	517 606	86,7
Sous-total (5 ou plus)	28 235	14,2	51 399	12,9	539	0,8	3 517	3,2	18 152	12,3	57 426	20,8	79 634	13,3
Total	198 458	100	398 782	100	63 602	100	109 479	100	147 664	100	276 495	100	597 240	100
		(33,2)		(66,8)		(10,6)		(18,3)		(24,7)		(46,3)		

Tableau 11

Répartition des personnes participantes de 64 ans ou moins¹ selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de prescripteurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Nombre d'ordonnances actives	NOMBRE DE PRESCRIPTEURS									
	1		2		3		4 ou plus		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	269 763	100,0	—	—	—	—	—	—	269 763	45,2
2	97 807	76,9	29 374	23,1	—	—	—	—	127 181	21,3
3	48 911	65,6	22 546	30,3	3 078	4,1	—	—	74 535	12,5
4	26 888	58,8	14 811	32,4	3 681	8,0	370	0,8	45 750	7,7
5	15 110	52,8	9 808	34,3	3 071	10,7	607	2,1	28 596	4,8
6	8 639	47,2	6 443	35,2	2 549	13,9	691	3,8	18 322	3,1
7 à 9	9 175	38,7	8 671	36,5	4 089	17,2	1 799	7,6	23 734	4,0
10 ou plus	2 411	27,0	2 934	32,9	1 926	21,6	1 649	18,5	8 920	1,5
Sous-total 1 à 4	443 369	85,7	66 731	12,9	6 759	1,3	370	0,1	517 229	86,7
Sous-total 5 ou plus	35 335	44,4	27 856	35,0	11 635	14,6	4 746	6,0	79 572	13,3
Total	478 704	80,2	94 587	15,8	18 394	3,1	5 116	0,9	596 801¹	100

1. La répartition ne peut être effectuée pour 1 prestataire d'assurance-emploi et 438 adhérents, pour lesquels aucune donnée n'est disponible relativement à leurs prescripteurs parce que ces derniers pratiquent hors Québec et ne sont pas inscrits à la RAMQ.

Tableau 12

Répartition des personnes participantes de 64 ans ou moins selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de pharmaciens, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 11 juin 2000

Nombre d'ordonnances actives	NOMBRE DE PHARMACIENS									
	1		2		3		4 ou plus		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	269 763	100,0	—	—	—	—	—	—	269 763	45,2
2	120 386	94,5	7 028	5,5	—	—	—	—	127 414	21,3
3	69 554	93,2	4 901	6,6	166	0,2	—	—	74 621	12,5
4	42 325	92,4	3 286	7,2	189	0,4	8	0,0	45 808	7,7
5	26 404	92,2	2 077	7,3	135	0,5	9	0,0	28 625	4,8
6	16 738	91,3	1 460	8,0	124	0,7	13	0,1	18 335	3,1
7 à 9	21 403	90,1	2 133	9,0	192	0,8	24	0,1	23 752	4,0
10 ou plus	7 776	87,2	1 031	11,6	95	1,1	20	0,2	8 922	1,5
Sous-total 1 à 4	502 028	97,0	15 215	2,9	355	0,1	8	0,0	517 606	86,7
Sous-total 5 ou plus	72 321	90,8	6 701	8,4	546	0,7	66	0,1	79 634	13,3
Total	574 349	96,2	21 916	3,7	901	0,2	74	0,0	597 240	100

ANNEXE 7

Tableaux relatifs à la consommation médicamenteuse des personnes de 64 ans ou moins inscrites au régime d'assurance médicaments administré par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), 7 juin 1998

Tableau 1

Répartition des personnes assurées de 64 ans ou moins selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 2

Répartition des personnes assurées de 64 ans ou moins selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 3

Répartition des ordonnances actives chez les personnes assurées de 64 ans ou moins selon le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 5

Répartition des personnes participantes de 64 ans ou moins selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 11

Répartition des personnes participantes de 64 ans ou moins selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de prescripteurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 12

Répartition des personnes participantes de 64 ans ou moins selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de pharmaciens, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Tableau 1

**Répartition des personnes assurés de 64 ans ou moins
selon la région sociosanitaire, le sexe et l'âge,
régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998**

Région sociosanitaire	HOMMES ET FEMMES						Total
	Hommes	Femmes	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	
Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine	20 948	21 596	11 196	9 163	12 295	9 890	42 544 2,0%
Bas-St-Laurent	34 202	35 650	18 648	15 594	18 926	16 684	69 852 3,3%
Saguenay-Lac-St-Jean	38 694	41 869	21 805	19 772	20 579	18 407	80 563 3,8%
Québec	78 207	86 377	36 635	45 488	40 283	42 178	164 584 7,8%
Chaudière-Appalaches	51 416	55 636	28 596	25 245	26 254	26 957	107 052 5,1%
Mauricie-Bois-Francs	70 508	76 320	38 814	32 999	37 573	37 442	146 828 7,0%
Estrie	38 503	41 847	22 359	18 763	19 801	19 427	80 350 3,8%
Montréal-Centre	265 629	288 958	152 161	149 532	138 950	113 944	554 587 26,4%
Laval	42 082	47 240	24 913	22 501	21 339	20 569	89 322 4,3%
Laurentides	64 150	70 047	38 044	32 126	34 622	29 405	134 197 6,4%
Lanaudière	53 097	57 399	31 997	25 794	27 727	24 978	110 496 5,3%
Montérégie	154 759	170 921	91 929	79 719	80 566	73 466	325 680 15,5%
Outaouais	39 985	43 059	24 685	22 006	20 460	15 893	83 044 4,0%
Abitibi-Témiscamingue	21 797	23 007	12 543	10 495	11 532	10 234	44 804 2,1%
Côte-Nord	12 088	13 161	6 806	6 993	6 155	5 295	25 249 1,2%
Nord-du-Québec	1 738	1 842	1 004	964	831	781	3 580 0,2%
Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James	1 146	1 308	1 261	773	254	166	2 454 *
Région indéterminée	17 893	18 862	10 987	13 200	8 187	4 381	36 755 1,8%
Ensemble du Québec	1 006 842 47,9%	1 095 099 52,1%	574 383 27,3%	531 127 25,3%	526 334 25,0%	470 097 22,4%	2 101 941 100%

Tableau 2

Répartition des personnes assurées de 64 ans ou moins selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

	HOMMES (ANS)					FEMMES (ANS)					HOMMES ET FEMMES (ANS)				
	0-19	20-34	35-49	50-64	Total	0-19	20-34	35-49	50-64	Total	0-19	20-34	35-49	50-64	Total
Aucune ordonnance active	266 988 92,1 %	232 964 91,3 %	210 280 81,7 %	125 293 61,3 %	835 525 83,0 %	248 533 87,4 %	197 547 71,6 %	188 680 70,1 %	103 729 39,0 %	738 589 67,4 %	515 621 89,8 %	430 511 81,1 %	398 960 75,8 %	229 022 48,7 %	1 574 114 74,9 %
Au moins une ordonnance active	23 004 7,9 %	22 272 8,7 %	47 040 18,3 %	79 001 38,7 %	171 317 17,0 %	35 758 12,6 %	78 344 28,4 %	80 334 29,9 %	162 074 61,0 %	356 510 32,6 %	58 762 10,2 %	100 616 18,9 %	127 374 24,2 %	241 075 51,3 %	527 827 25,1 %
Total	289 992 100 % (28,8 %)	255 236 100 % (25,4 %)	257 320 100 % (25,6 %)	204 294 100 % (20,3 %)	1 006 842 100 % (100 %)	284 391 100 % (26,0 %)	275 891 100 % (25,2 %)	269 014 100 % (24,6 %)	265 803 100 % (24,3 %)	1 095 099 100 % (100 %)	574 383 100 % (27,3 %)	531 127 100 % (25,3 %)	526 334 100 % (25,0 %)	470 098 100 % (22,4 %)	2 101 941 100 % (100 %)
Au moins cinq ordonnances actives	214 0,1 %	1 270 0,5 %	5 372 2,1 %	12 876 6,3 %	19 732 2,0 %	202 0,1 %	1 473 0,5 %	7 700 2,9 %	26 280 9,9 %	35 655 3,3 %	416 0,1 %	2 743 0,5 %	13 072 2,5 %	39 156 8,3 %	55 387 2,6 %

Tableau 3

Répartition des ordonnances actives chez les personnes assurées de 64 ans ou moins selon le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Ordonnances actives

HOMMES

	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Total	31 172	42 162	111 406	219 428	404 168 33,8%
Moyenne par personne assurée	0,1	0,2	0,4	1,1	0,4
Moyenne par personne participante	1,4	1,9	2,4	2,8	2,4

FEMMES

	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Total	44 718	108 159	177 610	460 071	790 558 66,2%
Moyenne par personne assurée	0,2	0,4	0,7	1,7	0,7
Moyenne par personne participante	1,3	1,4	2,2	2,8	2,2

HOMMES ET FEMMES

	0-19 ans	20-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	Total
Total	75 890 6,4%	150 321 12,6%	289 016 24,2%	679 499 56,9%	1 194 726 100%
Moyenne par personne assurée	0,1	0,3	0,6	1,4	0,6
Moyenne par personne participante	1,3	1,5	2,3	2,8	2,3

Tableau 5

Répartition des personnes participantes de 64 ans ou moins selon le nombre d'ordonnances actives, le sexe et l'âge, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Nombre d'ordonnances actives	HOMMES ET FEMMES													
	Hommes		Femmes		0-19 ans		20-34 ans		35-49 ans		50-64 ans		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	77 467	45,2	175 528	49,2	46 775	79,6	73 624	73,2	59 247	46,5	73 349	30,4	252 995	47,9
2	38 370	22,4	78 994	22,2	8 679	14,8	15 649	15,6	30 037	23,6	62 999	26,1	117 364	22,2
3	22 311	13,0	42 357	11,9	2 229	3,8	5 920	5,9	15 950	12,5	40 569	16,8	64 668	12,3
4	13 437	7,8	23 976	6,7	663	1,1	2 680	2,7	9 068	7,1	25 002	10,4	37 413	7,1
5	7 900	4,6	14 298	4,0	235	0,4	1 322	1,3	5 293	4,2	15 348	6,4	22 198	4,2
6	4 615	2,7	8 361	2,3	102	0,2	640	0,6	3 093	2,4	9 141	3,8	12 976	2,5
7	2 785	1,6	5 030	1,4	39	0,1	361	0,4	1 772	1,4	5 643	2,3	7 815	1,5
8	1 712	1,0	3 023	0,8	20	*	180	0,2	1 177	0,9	3 358	1,4	4 735	0,9
9	1 026	0,6	1 921	0,5	10	*	105	0,1	665	0,5	1 851	0,8	2 947	0,6
10 ou plus	1 694	1,0	3 022	0,8	10	*	135	0,1	1 072	0,8	3 499	1,5	4 716	0,9
Sous-total (1 à 4)	151 585	88,5	320 855	90,0	58 346	99,3	97 873	97,3	114 302	89,7	201 919	83,8	472 440	89,5
Sous-total (5 ou plus)	19 732	11,5	35 655	10,0	416	0,7	2 743	2,7	13 072	10,3	39 156	16,2	55 387	10,5
Total	171 317	100 (32,5)	356 510	100 (67,5)	58 762	100 (11,1)	100 616	100 (19,1)	127 374	100 (24,1)	241 075	100 (45,7)	527 827	100 (100)

Tableau 11

Répartition des personnes participantes de 64 ans ou moins selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de prescripteurs, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Nombre d'ordonnances actives	NOMBRE DE PRESCRIPTEURS									
	1		2		3		4 ou plus		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	252 995	100,0	—	—	—	—	—	—	252 995	48,0
2	90 188	77,0	26 889	23,0	—	—	—	—	117 077	22,2
3	41 403	64,1	20 294	31,4	2 844	4,4	—	—	64 541	12,2
4	21 586	57,8	12 295	32,9	3 163	8,5	302	0,8	37 346	7,1
5	11 521	52,0	7 675	34,6	2 468	11,1	490	2,2	22 154	4,2
6	5 913	45,6	4 644	35,8	1 843	14,2	558	4,3	12 958	2,5
7 à 9	5 890	38,1	5 613	36,3	2 712	17,5	1 257	8,1	15 472	2,9
10 ou plus	1 319	28,0	1 480	31,4	1 020	21,6	893	19,0	4 712	0,9
Sous-total 1 à 4	406 172	86,1	59 478	12,6	6 007	1,3	302	0,1	471 959	89,5
Sous-total 5 ou plus	24 643	44,6	19 412	35,1	8 043	14,5	3 198	5,8	55 296	10,5
Total	430 815	81,7	78 890	15,0	14 050	2,7	3 500	0,7	527 255¹	100

1. La répartition ne peut être effectuée pour 572 personnes, soit 216 prestataires d'assistance-emploi et 356 adhérents, pour lesquels aucune donnée n'est disponible relativement à leurs prescripteurs parce que ces derniers pratiquent hors Québec et ne sont pas inscrits à la RAMQ.


Tableau 12

Répartition des personnes participantes de 64 ans ou moins selon le nombre d'ordonnances actives et le nombre de pharmaciens, régime d'assurance médicaments administré par la RAMQ, 7 juin 1998

Nombre d'ordonnances actives	NOMBRE DE PHARMACIENS									
	1		2		3		4 ou plus		Total	
	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%	nb	%
1	252 995	100,0	--	--	--	--	--	--	252 995	47,9
2	111 042	94,6	6 322	5,4	--	--	--	--	117 364	22,2
3	60 400	93,4	4 110	6,4	158	0,2	--	--	64 668	12,3
4	34 774	92,9	2 460	6,6	169	0,5	10	*	37 413	7,1
5	20 683	93,2	1 422	6,4	84	0,4	9	*	22 198	4,2
6	12 006	92,5	902	7,0	59	0,5	9	0,1	12 976	2,5
7 à 9	14 186	91,5	1 193	7,7	106	0,7	12	0,1	15 497	2,9
10 ou plus	4 269	90,5	412	8,7	29	0,6	6	0,1	4 716	0,9
Sous-total 1 à 4	459 211	97,2	12 892	2,7	327	0,1	10	*	472 440	89,5
Sous-total 5 ou plus	51 144	92,3	3 929	7,1	278	0,5	36	0,1	55 387	10,5
Total	510 355	96,7	16 821	3,2	605	0,1	46	*	527 827	100

ANNEXE 8

Régions sociosanitaires du Québec, 2002



Source – MSSS, Service du développement de l'information.

PRINCIPALES INDICATIONS CLINIQUES DES CLASSES DE MÉDICAMENTS

La présente annexe se résume en une brève description des indications thérapeutiques liées aux principales classes et sous-classes de médicaments retrouvées dans les tableaux 7, 8, 9 et 10 des annexes 1 à 7.

Les anti-infectieux regroupent principalement les antibiotiques, les antifongiques et des médicaments utilisés dans le traitement du VIH.

La classe des médicaments du système nerveux autonome (SNA) en comporte un grand nombre d'usage varié: les sympathomimétiques (asthme et autres affections pulmonaires); les parasymphomimétiques (problèmes urinaires et affections rares); les antiparkinsonniens (maladie de Parkinson et autres symptômes extra-pyramidaux); les antispasmodiques (maladies pulmonaires obstructives chroniques telles que l'emphysème et la bronchite chronique); les sympatholytiques (migraine); les relaxants musculaires (certaines affections du système locomoteur et maladies dégénératives).

La classe des médicaments cardiovasculaires comprend les sous-classes des cardiotropes, des hypolipémiants, des antihypertenseurs et des vasodilatateurs. La sous-classe des cardiotropes inclut des β -bloquants, des bloqueurs des canaux calciques (BCC), des antiarythmiques et des cardiotoniques. Ces médicaments servent à traiter l'hypertension artérielle, l'angine, l'insuffisance cardiaque et certains troubles du rythme cardiaque. Les médicaments de la sous-classe des hypolipémiants sont utilisés dans le traitement des maladies lipidiques (dyslipidémies). La sous-classe des antihypertenseurs regroupe certains autres β -bloquants et BCC indiqués également dans le traitement de l'hypertension artérielle et de l'angine. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IECA) et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine

II (ARA) font aussi partie de cette sous-classe. Non seulement utilisés comme agents antihypertenseurs, les IECA servent en outre à traiter l'insuffisance cardiaque et à prévenir les maladies cardiovasculaires chez les patients à haut risque. Les ARA représentent une nouvelle famille de médicaments indiquée dans les cas d'hypertension artérielle. La sous-classe des vasodilatateurs inclut des médicaments utilisés surtout dans le traitement de l'angine. Les médicaments de la classe des électrolytes-diurétiques sont traités avec ceux de la sous-classe des antihypertenseurs, puisqu'ils sont principalement utilisés dans les cas d'hypertension artérielle.

La classe des médicaments du système nerveux central (SNC) comporte les sous-classes suivantes: analgésiques et antipyrétiques; anticonvulsivants; psychotropes; anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques. La sous-classe des analgésiques et antipyrétiques comprend les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), y compris l'acide acétylsalicylique (AAS), l'acétaminophène et les dérivés de la morphine. Les AINS soulagent, entre autres, les douleurs causées par diverses pathologies articulaires telles que l'arthrite et l'arthrose. L'AAS est indiqué pour contrôler la fièvre et pour soulager la douleur et sert couramment dans la prévention des événements cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux chez les patients à haut risque. L'acétaminophène contrôle pour sa part la fièvre et la douleur. Les dérivés de la morphine sont généralement employés pour soulager la douleur intense ou chronique en soins palliatifs. Les médicaments de la sous-classe des anticonvulsivants servent surtout à traiter l'épilepsie. La sous-classe des psychotropes comprend les antidépresseurs (dépression et certains troubles d'anxiété) et les tranquillisants (psychose et schizophrénie). La sous-classe des anxiolytiques, sédatifs et hypnotiques inclut, entre autres, la sous-sous-classe des benzodiazépines (anxiété et insomnie).

La classe oto-rhino-laryngologie (ORLO) inclut les médicaments utilisés dans les affections des yeux, des oreilles et de la gorge.

Les médicaments de la classe des gastro-intestinaux comportent principalement la sous-sous-classe des anti-ulcéreux, y compris les antagonistes des récepteurs H₂ et les inhibiteurs de la pompe à protons (ulcère peptique et reflux gastro-œsophagien). Les agents de motilité et les autres gastro-intestinaux (troubles de motilité gastro-intestinale et maladies inflammatoires de l'intestin) font également partie de cette classe de médicaments.

La classe des hormones et substituts inclut la sous-classe des corticostéroïdes (asthme et maladies inflammatoires), des anovulants (contraception),

des hypoglycémiantes (diabète), des thyroïdiens (hypothyroïdie surtout) et des «Autres hormones et substituts». Cette dernière appellation inclut les œstrogènes et les progestatifs qui servent en hormonothérapie de substitution pour traiter les symptômes vasomoteurs liés à la ménopause ainsi qu'en prévention de l'ostéoporose chez les femmes postménopausées. Les androgènes, les parathyroïdiens et les hormones hypophysaires (cancer et pathologies endocriniennes rares) complètent ce dernier regroupement.

La classe dermatologie inclut divers médicaments utilisés dans les affections de la peau et des muqueuses.