

**FRÉQUENCE DE SURVEILLANCE MINIMALE POUR LES ESSAIS DE RECHERCHE  
AU CHAMP EN CONDITIONS CONFINÉES**

Culture	Fréquence de surveillance	
	Période d'essai	Période post-récolte
<i>Agrostis palustris</i> Huds. (agrostide stolonifère)	chaque semaine, chaque jour, puis tous les trois jours*	toutes les deux semaines
<i>Beta vulgaris</i> L. (betterave à sucre)	chaque semaine	toutes les deux semaines
<i>Brassica carinata</i> A. Braun (moutarde d'Abyssinie)	chaque semaine	toutes les deux semaines
<i>Brassica juncea</i> L. (moutarde d'Inde)	chaque semaine	toutes les deux semaines
<i>Brassica napus</i> L. (canola colza)	chaque semaine	toutes les deux semaines
<i>Brassica rapa</i> L. (canola navette)	chaque semaine	toutes les deux semaines
<i>Capsicum annuum</i> L. (piment ou poivron)	toutes les deux semaines	toutes les deux semaines
<i>Carthamus tinctorius</i> L. (carthame)	chaque semaine	toutes les deux semaines
<i>Cucurbita pepo</i> L. (courge)	chaque semaine	toutes les deux semaines
<i>Glycine max</i> (L.) Merr. (soja)	toutes les deux semaines	toutes les deux semaines
<i>Helianthus annuus</i> L. (tournesol)	chaque semaine	toutes les deux semaines
<i>Hordeum vulgare</i> L. (orge)	toutes les deux semaines	toutes les deux semaines
<i>Lens culinaris</i> Medik. (lentille)	toutes les deux semaines	toutes les deux semaines
<i>Linum usitatissimum</i> L. (lin)	chaque semaine	chaque semaine
<i>Lolium perenne</i> L. (ray-grass vivace, ou ivraie vivace)	chaque semaine, chaque jour, puis tous les trois jours*	toutes les deux semaines
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. (tomate)	chaque semaine	toutes les deux semaines

Culture	Fréquence de surveillance	
	Période d'essai	Période post-récolte
<i>Medicago sativa</i> L. (luzerne)	chaque semaine, chaque jour, puis tous les trois jours*	toutes les deux semaines
<i>Nicotiana tabacum</i> L. (tabac)	chaque semaine	toutes les deux semaines
<i>Phalaris canariensis</i> L. (alpiste des Canaries)	toutes les deux semaines	toutes les deux semaines
<i>Picea</i> spp. (épinette)	chaque mois, mais deux fois par semaines pendant la formation des cônes	chaque mois
<i>Pisum sativum</i> L. (pois)	toutes les deux semaines	toutes les deux semaines
<i>Populus</i> spp. (peuplier)	chaque mois, mais deux fois par semaines pendant la floraison et le débourement	chaque mois
<i>Sinapis alba</i> L. (moutarde blanche)	chaque semaine	toutes les deux semaines
<i>Solanum tuberosum</i> L. (pomme de terre)	chaque semaine	toutes les deux semaines
<i>Trifolium repens</i> L. (trèfle blanc)	chaque semaine, chaque jour, puis tous les trois jours*	toutes les deux semaines
<i>Triticum aestivum</i> L. (blé)	toutes les deux semaines	toutes les deux semaines
<i>Vitis</i> spp. (vigne)	chaque mois, mais chaque semaine pendant la libération du pollen	chaque mois
<i>Zea mays</i> L. (maïs)	chaque semaine	toutes les deux semaines

\* Ces trois fréquences de surveillance, pendant la saison de culture, s'appliquent respectivement aux périodes avant, pendant et après le stade du bouton.