

Programme de la lutte au tabagisme, Santé Canada
Tableaux supplémentaires, Enquête de 2004-05 sur le tabagisme chez les jeunes

Tableau 1. Catégories de tabagisme, tous les niveaux de scolarité, Canada, 2004-05

Tableau 2. Prévalence du tabagisme, selon le produit du tabac et le sexe, Canada, 2004-05

Tableau 3. Jeunes ayant déjà essayé un produit du tabac selon le sexe et regroupements de niveaux de scolarité, tous les niveaux de scolarité, Canada, 2004-05

Tableau 4. Catégories de tabagisme, par province, tous les niveaux de scolarité, Canada, 2004-05

Tableau 5. Jeunes ayant déjà essayé de fumer la cigarette, selon la province et le sexe, tous les niveaux de scolarité, Canada, 2004-05

Tableau 6. Jeunes ayant déjà essayé de fumer la cigarette, selon la province et les regroupements de scolarité, tous les niveaux de scolarité, Canada, 2004-05

Tableau 7. Nombre moyen de cigarettes fumées par jour (fumeurs quotidiens), Canada, 2004-05

Tableau 8. Sources d'approvisionnement en cigarettes, selon le sexe, selon le niveau de scolarité et la catégorie de tabagisme, tous les niveaux de scolarité, Canada, 2004-05 - **(Revisé, le 03 Février, 2007)**

Tableau 9. Catégories de tabagisme des jeunes, d'après la catégorie de tabagisme des parents, tous les niveaux de scolarité, Canada, 2004-05

Tableau 10. Raisons perçues pour lesquelles les jeunes commencent à fumer, selon la catégorie de tabagisme, tous les niveaux de scolarité, Canada 2004-05

Tableau 11. Raisons perçues pour lesquelles les jeunes commencent à fumer, selon le sexe, tous les niveaux de scolarité, Canada 2004-05

Tableau 12. Raisons perçues pour lesquelles les jeunes commencent à fumer, selon le niveau de scolarité, Canada 2004-05

Tableau 13. Croyances et attitudes en matière de santé, selon la catégorie de tabagisme, tous les niveaux de scolarité, Canada 2004-05

Tableau 14. Croyances et attitudes en matière de santé, selon le sexe, tous les niveaux de scolarité, Canada 2004-05

Tableau 15. Croyance et attitudes en matière de santé, selon le niveau de scolarité, Canada 2004-05

Tableau 16. Catégories de tabagisme, selon l'argent de poche obtenu hebdomadairement, tous les niveaux de scolarité, Canada, 2004-05

Tableau 17. Taux d'utilisation à vie et âge moyen de la première consommation d'alcool et de drogues illicites, selon le sexe, (7^e - 9^e années), Canada, 2004-05

Tableau 18. Taux d'utilisation à vie d'alcool et de cannabis, par province (7^e - 9^e années), Canada 2004-05

Tableau 19. Taux d'utilisation à vie d'alcool et de drogues illicite, selon le niveau de scolarité (7^e - 9^e années), Canada 2004-05

Tableau 20. Consommation de cannabis, d'après la catégorie de tabagisme (7^e - 9^e années), Canada 2004-05

Tableau 21. Consommation d'alcool, d'après la catégorie de tabagisme (7^e - 9^e années), Canada 2004-05

Tableau 22. Consommation occasionnelle excessive d'alcool, d'après la catégorie de tabagisme (7^e - 9^e années), Canada 2004-05

Tableau 23. Taille de l'échantillon, selon la province et les regroupements de scolarité, tous les niveaux de scolarité, Canada, 2004-05

Tableau 1. Catégories de tabagisme, tous les niveaux de scolarité, Canada, 2004-05

	Pop. estimée (en milliers)	Fumeurs quotidiens (%)	Fumeurs occasionnels (%)	Anciens fumeurs ou anciens fumeurs à titre expérimental (%)	Fumeurs a titre expérimentale (%)	Bouffées seulement (%)	N'ont jamais fumé (%)
Total	2 011	0,8 [0,5 - 1,0]	0,9 [0,7 - 1,1]	4,7 [3,9 - 5,4]	2,3 [1,9 - 2,7]	10,2 [9,4 - 11,1]	81,1 [79,6 - 82,7]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance de 95 %]

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Il se peut que les estimations ne totalisent pas 100 pour 100 en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2004-05

Tableau 2. Catégories de tabagisme, selon le sexe et regroupements de niveaux de scolarité, tous les niveaux de scolarité, Canada, 2004-05

	Pop. estimée (en milliers)	Fumeurs actuels ¹ (%)	Anciens fumeurs ou anciens fumeurs à titre expérimental (%)	Fumeurs à titre expérimental (%)	Bouffées seulement (%)	N'ont jamais fumé (%)
Garçons	1 034	1,5* [1,0 - 2,1]	4,3 [3,5 - 5,1]	1,9 [1,4 - 2,5]	11,3 [10,2 - 12,5]	80,9 [79,1 - 82,7]
Filles	977	1,8* [1,2 - 2,4]	5,1 [4,0 - 6,2]	2,7 [2,1 - 3,3]	9,1 [8,1 - 10,1]	81,3 [79,3 - 83,4]
5 ^e -6 ^e années	783	#	1,4* [0,1 - 2,0]	0,7* [0,04 - 1,0]	5,2 [4,3 - 6,1]	92,6 [91,1 - 94,1]
7 ^e -9 ^e années	1 228	2,7 [2,0 - 3,3]	6,8 [5,7 - 7,9]	3,3 [2,8 - 3,8]	13,5[†] [12,2 - 14,7]	73,8 [71,5 - 76,1]
Total	2 011	1,7 [1,3 - 2,1]	4,7 [3,9 - 5,4]	2,3 [1,9 - 2,7]	10,2 [9,4 - 11,1]	81,1 [79,6 - 82,7]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance de 95 %]

¹Les fumeurs actuels englobent les fumeurs quotidiens et les fumeurs occasionnels.

*Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

[†]Veillez prendre note que ce nombre ne devrait pas être arrondi.

Il se peut que les estimations ne totalisent pas 100 pour 100 en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2004-05

Tableau 3. Jeunes ayant déjà essayé un produit du tabac selon le sexe et regroupements de niveaux de scolarité, tous les niveaux de scolarité, Canada, 2004-05

	Pop. estimée (en milliers)	Cigarettes ¹ (%)	Cigares ou pipes (%)	Bidis (%)	Tabac à mâcher (%)	Tabac à priser (%)	Tout genre de produit du tabac (%)
Garçons	1 034	19,1 [17,3 - 20,9]	11,6 [10,6 - 12,6]	1,1 [0,8 - 1,3]	3,1 [2,2 - 3,9]	0,8 [0,4 - 1,2]	20,0 [18,0 - 22,0]
Filles	977	18,7 [16,6 - 20,7]	7,2 [6,4 - 8,0]	0,5* [0,3 - 0,8]	0,9* [0,5 - 1,3]	0,4* [0,2 - 0,5]	22,8 [21,1 - 24,7]
5 ^e -6 ^e années	783	7,4 [5,9 - 8,9]	3,2 [2,6 - 3,9]	#	0,5[†]* [0,2 - 0,7]	0,3* [0,1 - 0,5]	9,0 [7,3 - 10,6]
7 ^e -9 ^e années	1 228	26,2 [23,9 - 28,5]	13,3 [12,3 - 14,2]	1,2 [0,9 - 1,5]	2,9 [2,0 - 3,9]	0,8* [0,4 - 1,1]	29,4 [27,3 - 31,6]
Total	2 011	18,9 [17,3 - 20,4]	9,4 [8,8 - 10,0]	0,8 [0,6 - 1,0]	2,0 [1,4 - 2,6]	0,6* [0,4 - 0,8]	21,5[†] [20,0 - 23,0]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance de 95 %]

¹Ont déjà essayé, même seulement quelques bouffées.

*Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

#Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

[†]Veuillez prendre note que ce nombre ne devrait pas être arrondi.

Source : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2004-05

Tableau 4. Catégories de tabagisme, par province, tous les niveaux de scolarité, Canada, 2004-05

	Pop. estimée (en milliers)	Fumeurs actuels ¹ (%)	Anciens fumeurs ou anciens fumeurs à titre expérimental (%)	Fumeurs à titre expérimental (%)	Bouffées seulement (%)	N'ont jamais fumé (%)
Canada	2 011	1,7 [1,3 - 2,1]	4,7 [3,9 - 5,4]	2,3 [1,9 - 2,7]	10,2 [9,4 - 11,1]	81,1 [79,6 - 82,7]
T,-N,-L,	32	3,2* [1,6 - 4,7]	6,4* [4,3 - 8,5]	2,1 [1,7 - 2,5]	10,1 [7,8 - 12,3]	78,3 [72,7 - 83,9]
Î,-P,-É,,	10	#	3,8* [2,5 - 5,1]	2,0 [1,6 - 2,4]	8,7 [6,9 - 10,4]	84,4 [80,9 - 87,8]
N,-É,,	58	2,4 [1,7 - 3,1]	4,3 [3,5 - 5,1]	3,8 [2,9 - 4,6]	9,6 [8,7 - 10,6]	79,9 [77,8 - 82,0]
N,-B,	47	#	4,8 [3,9 - 5,8]	1,4 [0,5 - 2,3]	8,6 [6,2 - 11,0]	82,4 [78,0 - 86,9]
Qc	488	3,5 [1,9 - 5,0]	8,6 [6,5 - 10,7]	3,6 [2,5 - 4,6]	15,4 [13,4 - 17,3]	69,0 [64,3 - 73,6]
Ont,	778	0,8 [0,4 - 1,2]	3,1* [1,9 - 4,3]	1,6* [1,1 - 2,2]	8,1 [6,5 - 9,7]	86,4 [84,0 - 88,9]
Man,	72	#	4,1 [2,8 - 5,4]	#	9,2* [5,4 - 13,1]	83,4 [76,9 - 89,9]
Sask,	66	#	3,7* [1,6 - 5,8]	3,0 [1,3 - 4,6]	11,4* [7,4 - 15,5]	80,1 [73,1 - 87,1]
Alb,	225	#	4,1 [3,1 - 5,1]	2,4 [1,7 - 3,0]	10,2 [8,4 - 12,0]	81,9 [79,4 - 84,4]
C,-B,	233	#	#	1,6 [0,7 - 2,6]	7,2 [5,5 - 8,9]	87,9 [84,7 - 91,2]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance de 95 %]

¹Les fumeurs actuels englobent les fumeurs quotidiens et les fumeurs occasionnels.

*Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

#Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Il se peut que les estimations ne totalisent pas 100 pour 100 en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2004-05

Tableau 5. Jeunes ayant déjà essayé de fumer la cigarette, selon la province et le sexe, tous les niveaux de scolarité, Canada, 2004-05

	Garçons (%)	Filles (%)	Total (%)
Canada	19,1 [17,2 - 20,1]	18,7 [16,6 - 20,7]	18,9 [17,3 - 20,4]
T,-N,-L,	22,0 [17,6 - 26,5]	21,3* [14,3 - 28,4]	21,7 [16,1 - 27,3]
Î,-P,-É,	15,1 [10,7 - 19,5]	16,2 [13,0 - 19,5]	15,6 [12,2 - 19,1]
N,-É,	20,4 [18,0 - 22,9]	19,7 [17,5 - 22,0]	20,1 [18,0 - 22,2]
N,-B,	17,7* [11,2 - 24,2]	17,5[†] [14,4 - 20,6]	17,6 [13,1 - 22,0]
Qc	29,9 [24,2 - 35,6]	32,2 [26,6 - 37,9]	31,0 [26,4 - 35,7]
Ont,	14,2 [11,5 - 17,0]	12,8 [9,4 - 16,3]	13,6 [11,1 - 16,0]
Man,	16,7 [11,9 - 21,6]	16,5* [7,5 - 25,5]	16,6* [10,1 - 23,1]
Sask,	21,6* [14,0 - 29,2]	18,1* [10,0 - 26,3]	19,9* [12,9 - 26,9]
Alb	18,3 [15,8 - 20,7]	17,9 [14,4 - 21,4]	18,1 [15,6 - 20,6]
C,-B,	12,9 [9,5 - 16,3]	11,2* [6,5 - 15,8]	12,1 [8,8 - 15,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance de 95 %]

*Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

#Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2004-05

Tableau 6. Jeunes ayant déjà essayé de fumer la cigarette, selon la province et les regroupements de scolarité, tous les niveaux de scolarité, Canada, 2004-05

	5 ^e années (%)	6 ^e années (%)	7 ^e années (%)	8 ^e années (%)	9 ^e années (%)
Canada	5,8* [3,4 - 8,3]	8,9 [7,2 - 10,5]	17,8 [14,3 - 21,3]	26,6 [24,0 - 29,3]	34,3 [30,6 - 38,0]
T,-N,-L,	6,9* [4,5 - 9,4]	6,8 [5,0 - 8,7]	16,1 [11,1 - 21,1]	29,6 [21,3 - 37,9]	43,1* [28,7 - 57,5]
Î,-P,-É,	3,3* [1,6 - 5,0]	7,1* [4,8 - 9,4]	13,5[†] [10,9 - 16,1]	22,6 [18,2 - 27,0]	28,8* [17,3 - 40,3]
NS	3,6* [2,1 - 5,2]	9,7 [7,4 - 11,9]	19,4 [16,2 - 22,6]	28,4 [24,1 - 32,8]	36,4 [29,7 - 43,1]
NB	#	#	15,2* [6,8 - 23,7]	21,9 [18,0 - 25,8]	34,5 [27,0 - 42,0]
Qc	8,6* [4,1 - 13,1]	17,1 [12,6 - 21,5]	36,2 [26,3 - 46,1]	45,6 [39,8 - 51,4]	48,9 [39,4 - 58,5]
Ont,	#	#	10,1* [4,4 - 15,7]	19,5[†] [14,4 - 24,6]	27,9 [21,5 - 34,3]
Man,	#	8,6 [3,4 - 13,9]	#	18,3* [8,1 - 28,4]	37,0* [22,3 - 51,7]
Sask,	6,5* [2,5 - 10,6]	#	13,0* [6,0 - 19,9]	25,5^{†*} [12,9 - 38,0]	40,0* [21,3 - 58,8]
Alb.	#	10,5^{†*} [7,3 - 13,7]	13,4* [8,3 - 18,5]	28,1 [22,9 - 33,2]	32,3 [26,7 - 37,9]
C,-B	3,3* [12,7 - 52,6]	5,7* [3,2 - 8,2]	7,4* [4,3 - 10,6]	13,8 [9,9 - 17,7]	27,9* [15,8 - 40,0]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance de 95 %]

*Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

#Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

[†]Veillez prendre note que ce nombre ne devrait pas être arrondi.

Source : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2004-05

Tableau 7. Nombre moyen de cigarettes fumées par jour (fumeurs quotidiens), Canada, 2004-05			
	Garçons (%)	Filles (%)	Total (%)
7e années	7,2 [5,6 - 8,8]	8,7 [6,8 - 10,5]	8,0 [6,1 - 9,9]
8e années	9,5 [7,3 - 11,8]	8,0 [5,6 - 10,3]	8,6 [7,1 - 10,1]
9e années	10,7 [7,5 - 13,9]	9,7 [8,0 - 11,5]	10,1 [7,5 - 13,9]
Total (7e-9e années)	10,1 [8,0 - 12,2]	9,2 [8,0 - 10,3]	9,6 [8,4 - 11,8]
Total (5e-6e années)	10,1 [8,0 - 12,2]	9,2 [8,0 - 10,3]	9,6 [8,5 - 10,6]
[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance de 95 %]			
En raison de la variabilité élevée, le nombre moyen de cigarettes fumées par jour a été retiré pour la 5 ^e et la 6 ^e année.			
Source : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2004-05			

Tableau 8. Sources d'approvisionnement en cigarettes, selon le sexe, selon le niveau de scolarité et la catégorie de tabagisme, tous les niveaux de scolarité, Canada, 2004-05¹ - (Revisé, le 03 Février, 2007)

	Les achètent ² (%)	Les obtiennent de leur réseau social ³ (%)
Garçons	13.1 ^{†*} [7,0 - 19,2]	86.9 [80,8 - 93,0]
Filles	6.2 [*] [2,1 - 10,3]	93.8 [80,8 - 93,0]
5e-6e années	#	91.9 [85,4 - 98,4]
7e-9e années	9.2 [*] [5,5 - 13,0]	90.8 [87,0 - 94,5]
Fumeurs quotidiens	18,9 [*] [9,6 - 28,3]	81,1 [71,7 - 90,4]
Fumeurs occasionnels	#	83,9 [72,3 - 95,5]
Fumeurs à titre expérimental	#	95,9 [92,7 - 99,1]
Total	9.2 [*] [5,5 - 12,8]	90.8 [87,2 - 94,5]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance de 95 %]

¹ Inclus les individus qui ont fumé dans les derniers 30 jours

² Les achètent: les achètent au magasin/dans des distributeurs/sur Internet.

³ Les obtiennent de leur réseau social: leur frère/sœur/mère/père leur en donnent ou ils les prennent d'un membre de leur famille ou les achètent d'une autre personne.

*Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

[†] Veuillez prendre note que ce nombre ne devrait pas être arrondi.

Il se peut que les estimations ne totalisent pas 100 pour 100 en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2004-05

Tableau 9. Catégories de tabagisme des jeunes, d'après la catégorie de tabagisme des parents, tous les niveaux de scolarité, Canada, 2004-05

	Garçons		Fille		Total	
	Ont déjà essayé la cigarette (%)	N'ont jamais essayé la cigarette (%)	Ont déjà essayé la cigarette (%)	N'ont jamais essayé la cigarette (%)	Ont déjà essayé la cigarette (%)	N'ont jamais essayé la cigarette (%)
Parent fumeur(s)	29,9 [26,9 - 32,9]	70,1 [67,1 - 73,1]	29,6 [25,9 - 33,3]	70,4 [66,7 - 74,1]	29,8 [27,1 - 32,5]	70,2 [67,5 - 72,9]
Aucun parent fumeur	14,3 [12,8 - 15,9]	85,7 [84,1 - 87,2]	13,2 [11,4 - 14,9]	86,8 [85,1 - 88,6]	13,8 [12,6 - 14,9]	86,2 [85,1 - 87,4]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance de 95 %]

Il se peut que les estimations ne totalisent pas 100 pour 100 en raison de l'arrondissement.

Source : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2004-05

Tableau 10. Raisons perçues pour lesquelles les jeunes commencent à fumer, selon la catégorie de tabagisme, tous les niveaux de scolarité, Canada 2004-05

	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs ou anciens fumeurs à titre expérimental (%)	Fumeurs à titre expérimental (%)	Bouffées seulement (%)	Ont déjà essayé la cigarette (%)	N'ont jamais fumé la cigarette (%)
Amis qui fument / pression exercée par les camarades	50,0 [39,8 - 60,2]	56,9 [51,7 - 62,0]	51,5[†] [42,8 - 60,2]	59,8 [55,6 - 64,0]	57,2 [53,6 - 60,8]	56,6 [54,7 - 58,5]
Mère ou père qui fume	40,8 [29,4 - 52,1]	31,7 [26,3 - 37,0]	30,6 [23,5 - 37,7]	28,8 [25,6 - 32,0]	30,8 [28,4 - 33,3]	29,7 [27,9 - 31,4]
Frères ou soeurs qui fument	30,0* [17,4 - 42,6]	18,9 [15,6 - 22,2]	16,7* [9,7 - 23,7]	19,8 [16,9 - 22,8]	20,1 [18,1 - 22,1]	20,8 [19,4 - 22,2]
Les jeunes populaires fument	30,8 [23,9 - 37,7]	28,9 [23,4 - 34,4]	20,5 [15,4 - 25,6]	30,4 [26,5 - 34,3]	28,9 [26,0 - 31,7]	36,1 [34,5 - 37,6]
Curiosité	44,2 [33,9 - 54,4]	45,5[†] [37,2 - 53,7]	47,2 [37,1 - 57,2]	46,5[†] [42,3 - 50,6]	46,1 [41,5 - 50,7]	41,1 [39,1 - 43,1]
C'est < cool > de fumer!	48,0 [39,4 - 56,6]	53,3 [47,0 - 59,6]	41,0 [34,2 - 47,7]	57,1 [53,5 - 60,6]	53,4 [50,1 - 56,6]	61,0 [59,2 - 62,8]
Quelque chose à faire	30,6* [19,5 - 41,6]	18,3 [14,2 - 22,4]	18,8 [11,4 - 26,2]	12,2 [10,0 - 14,3]	16,1 [14,0 - 18,2]	11,8 [10,6 - 13,0]
C'est interdit	18,3* [10,0 - 26,7]	15,3 [10,8 - 19,7]	13,3 [9,9 - 16,7]	12,3 [10,1 - 14,4]	13,7 [11,7 - 15,6]	11,1 [10,0 - 12,2]
Ça détend	43,1 [31,5 - 54,6]	22,8 [17,9 - 27,7]	20,7 [14,6 - 26,7]	19,9 [17,0 - 22,7]	22,8 [20,0 - 25,5]	15,2 [13,8 - 16,6]
Contrôle du poids	15,6* [9,8 - 21,4]	11,5 [8,1 - 15,0]	8,1 [4,4 - 11,8]	10,8 [8,1 - 13,4]	11,1 [9,2 - 13,0]	11,2 [9,9 - 12,5]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance de 95 %]

*Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

[†]Veillez prendre note que ce nombre ne devrait pas être arrondi.

Source : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2004-05

Tableau 11. Raisons perçues pour lesquelles les jeunes commencent à fumer, selon le sexe, tous les niveaux de scolarité, Canada 2004-05

	Garçons (%)	Filles (%)	Total (%)
Amis qui fument / pression exercée par	53,1 [50,8 - 55,4]	60,6 [57,9 - 63,3]	56,7 [55,0 - 58,5]
Mère ou père qui fume	26,5 [24,8 - 28,2]	33,4 [31,1 - 35,7]	29,9 [28,2 - 31,5]
Frères ou soeurs qui fument	18,3 [16,9 - 19,7]	23,2 [21,2 - 25,1]	20,7 [19,4 - 22,0]
Les jeunes populaires fument	30,5[†] [28,5 - 32,3]	39,2 [37,0 - 41,3]	34,7 [33,4 - 36,0]
Curiosité	35,8 [33,9 - 37,7]	48,6 [45,7 - 51,4]	42,0 [40,0 - 44,1]
C'est < cool >!	54,8 [52,6 - 57,1]	64,5 [62,6 - 66,4]	59,6 [58,0 - 61,1]
Quelque chose à faire	10,3 [9,3 - 11,4]	15,0 [13,3 - 16,8]	12,6 [11,5 - 13,7]
C'est interdit	10,2 [8,9 - 11,5]	13,1 [11,3 - 14,8]	11,6 [10,6 - 12,6]
Ça détend	15,6 [14,1 - 17,1]	17,7 [15,9 - 19,4]	16,6 [15,2 - 18,0]
Contrôle du poids	7,8 [6,6 - 9,0]	14,7 [13,1 - 16,4]	11,2 [10,0 - 12,4]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance de 95 %]

[†]Veillez prendre note que ce nombre ne devrait pas être arrondi.

Source : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2004-05

Tableau 12. Raisons perçues pour lesquelles les jeunes commencent à fumer, selon le niveau de scolarité, Canada 2004-05

	5 ^e années (%)	6 ^e années (%)	7 ^e années (%)	8 ^e années (%)	9 ^e années (%)
Amis qui fument / pression exercée	38,3 [35,2 - 41,4]	52,2 [48,9 - 55,4]	62,6 [59,1 - 66,1]	64,4 [61,1 - 67,7]	64,8 [61,2 - 68,3]
Mère ou père qui fume	25,7 [23,4 - 28,0]	29,8 [26,4 - 33,2]	30,4 [27,8 - 33,0]	33,6 [30,7 - 36,4]	29,6 [25,1 - 34,1]
Frères ou soeurs qui fument	15,3 [13,4 - 17,2]	18,1 [15,4 - 20,8]	22,3 [20,4 - 24,2]	24,9 [22,2 - 27,5]	29,6 [25,1 - 34,1]
Les jeunes populaires fument	30,6 [28,4 - 32,7]	35,8 [32,0 - 39,5]	39,3 [36,5 - 42,1]	38,5 [35,8 - 41,3]	29,0 [26,2 - 31,9]
Curiosité	28,9 [25,6 - 32,1]	38,6 [34,6 - 42,6]	45,0 [41,5 - 48,6]	49,4 [45,8 - 53,1]	47,2 [43,8 - 50,6]
C'est < cool >!	54,9 [50,9 - 58,8]	59,7 [57,0 - 62,4]	62,4 [59,8 - 64,9]	63,1 [59,8 - 66,4]	57,5[†] [54,1 - 60,8]
Quelque chose à faire	7,4 [5,6 - 9,1]	9,2 [7,6 - 10,8]	10,0 [8,2 - 11,8]	16,1 [14,2 - 17,9]	20,1 [17,0 - 23,2]
C'est interdit	6,5* [4,3 - 8,8]	7,9 [6,3 - 9,4]	11,6 [9,7 - 13,5]	15,6 [13,5 - 17,7]	16,0 [13,4 - 18,7]
Ça détend	8,8 [6,5 - 11,1]	12,1 [10,6 - 13,5]	15,1 [12,5 - 17,6]	20,3 [17,2 - 23,4]	26,2 [22,8 - 29,6]
Contrôle du poids	9,5* [5,9 - 13,1]	9,8 [7,9 - 11,7]	14,1 [11,0 - 17,2]	11,6 [9,7 - 13,5]	10,8 [9,4 - 12,2]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance de 95 %]

*Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

[†]Veillez prendre note que ce nombre ne devrait pas être arrondi.

Source : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2004-05

Tableau 13. Croyances et attitudes en matière de santé, selon la catégorie de tabagisme, tous les niveaux de scolarité, Canada 2004-05

	Fumeurs actuels (%)	Anciens fumeurs ou anciens fumeurs à titre expérimental (%)	Fumeurs à titre expérimental (%)	Bouffées seulement (%)	Ont déjà essayé la cigarette (%)	N'ont jamais fumé la cigarette (%)
Croyances						
Il faut attendre de nombreuses années avant que la fumée nuise à la santé.	27,2 [19,1 - 35,3]	21,8 [15,8 - 27,8]	22,5* [14,9 - 30,2]	18,9 [16,3 - 21,5]	21,0 [18,8 - 22,8]	13,4 [12,3 - 14,5]
Les fait de fumer occasionnellement compromet la santé,	46,4 [39,5 - 53,4]	54,3 [48,6 - 59,9]	46,8 [39,0 - 54,7]	54,9 [50,7 - 59,0]	52,3 [49,6 - 56,4]	68,2 [67,0 - 69,5]
Le fait d'arrêter de fumer diminue les risques pour la santé,	56,8 [48,1 - 65,4]	49,5 [43,5 - 55,6]	47,5 [40,2 - 54,9]	46,2 [42,9 - 49,4]	45,1 [43,9 - 50,7]	41,0 [39,5 - 42,5]
Fumer aide à rester mince,	32,0 [25,3 - 38,6]	24,4 [19,2 - 29,7]	25,1* [16,1 - 34,1]	23,2 [19,9 - 26,4]	24,5 [21,7 - 27,3]	16,2 [14,5 - 17,9]
Les produits du tabac entraîne une dépendance,	85,5[†] [80,0 - 91,0]	88,6 [83,9 - 93,2]	89,5 [85,1 - 93,9]	89,4 [86,9 - 91,9]	88,8 [86,4 - 91,3]	88,2 [86,9 - 89,5]
La fumée peut nuire à la santé des non-fumeurs,	86,4 [80,3 - 92,4]	92,4 [89,0 - 95,7]	91,3 [87,9 - 94,6]	90,8 [88,7 - 92,9]	90,8 [88,8 - 92,9]	86,6 [85,4 - 87,9]
Attitudes						
Il est plus agréable de sortir avec des non-fumeurs.	41,6 [36,8 - 46,5]	77,3 [72,2 - 82,4]	58,6 [50,7 - 66,5]	82,1 [79,5 - 84,7]	74,5 [71,6 - 77,4]	81,8 [80,6 - 83,1]
Fumer aide à se désennuyer,	46,5[†] [39,6 - 53,3]	22,7 [16,5 - 28,9]	30,1 [22,9 - 37,4]	15,3 [12,0 - 18,5]	21,7 [18,8 - 24,5]	10,4 [9,1 - 11,7]
Fumer aide à se détendre,	75,7 [66,9 - 84,4]	45,1 [39,8 - 50,5]	65,7 [56,8 - 74,6]	39,6 [34,6 - 44,5]	47,3 [45,6 - 50,6]	25,7 [34,6 - 44,5]
C'est <cool> de fumer,	18,0* [10,1 - 26,0]	7,7* [3,0 - 12,3]	12,3* [7,1 - 17,6]	4,0* [2,0 - 6,0]	7,2 [4,7 - 9,6]	1,1 [0,8 - 1,4]
Les fumeurs peuvent cesser de fumer n'importe quand,	27,0 [18,8 - 35,1]	20,5 [17,4 - 23,7]	23,9 [18,1 - 29,7]	20,1 [17,1 - 23,2]	21,3 [19,0 - 23,6]	28,8 [26,8 - 30,9]
Il devrait être permis de fumer en présence d'enfants à la maison	21,2* [13,0 - 29,3]	9,1* [4,2 - 14,0]	8,8* [3,8 - 13,7]	3,8* [2,4 - 5,1]	7,7 [6,3 - 9,2]	1,5 [1,2 - 1,8]
Il devrait être permis de fumer en présence d'enfants dans la voiture	23,5^{†*} [14,9 - 32,1]	9,6 [4,8 - 14,3]	13,8 [9,6 - 17,9]	4,5^{†*} [2,9 - 6,1]	8,6 [7,0 - 10,2]	1,4 [1,2 - 1,7]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance de 95 %]

*Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

[†]Veuillez prendre note que ce nombre ne devrait pas être arrondi.

Source : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2004-05

Tableau 14. Croyances et attitudes en matière de santé, selon le sexe, tous les niveaux de scolarité, Canada 2004-05

	Garçons (%)	Filles (%)	Total (%)
Croyances			
Il faut attendre de nombreuses années avant que la fumée nuise à la santé.	16,4 [15,4 - 17,5]	13,1 [11,6 - 14,5]	14,8 [13,7 - 15,9]
Le fait de fumer occasionnellement compromet la santé,	66,5[†] [64,9 - 68,1]	64,2 [62,7 - 65,6]	65,4 [64,2 - 66,5]
Le fait d'arrêter de fumer diminue les risques pour la santé,	44,4 [42,6 - 46,2]	40,1 [38,1 - 42,1]	42,3 [41,1 - 43,6]
Fumer aide à rester mince,	16,6 [14,8 - 18,4]	19,0 [17,1 - 20,9]	17,8 [16,2 - 19,3]
Les produits du tabac entraînent une dépendance,	87,4 [86,0 - 88,9]	89,2 [87,6 - 90,9]	88,3 [87,1 - 89,5]
La fumée peut nuire à la santé des non-fumeurs,	88,0 [86,4 - 89,5]	86,8 [85,0 - 88,6]	87,4 [86,2 - 88,6]
Attitudes			
Il est plus agréable de sortir avec des non-fumeurs.	79,1 [77,1 - 81,1]	81,9 [80,2 - 83,5]	80,5[†] [79,1 - 81,8]
Fumer aide à se désennuyer,	13,7 [11,7 - 15,8]	11,2 [10,1 - 12,3]	12,5 [11,1 - 13,9]
Fumer aide à se détendre,	31,1 [28,4 - 33,9]	28,3 [25,8 - 30,1]	29,8 [27,3 - 32,2]
C'est <cool> de fumer,	2,5 [1,9 - 3,2]	1,9 [1,3 - 2,5]	2,2 [1,7 - 2,8]
Les fumeurs peuvent cesser de fumer n'importe quand,	24,5[†] [22,7 - 26,2]	30,5 [28,0 - 33,1]	27,4 [25,7 - 29,2]
Il devrait être permis de fumer en présence d'enfants à la maison	2,2 [1,8 - 2,7]	3,1 [2,5 - 3,7]	2,7 [2,3 - 3,0]
Il devrait être permis de fumer en présence d'enfants dans la voiture	3,2 [2,6 - 3,8]	2,3 [1,8 - 2,8]	2,8 [2,4 - 3,1]
[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance de 95 %]			
†Veuillez prendre note que ce nombre ne devrait pas être arrondi.			
Source : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2004-05			

Tableau 15. Croyance et attitudes en matière de santé, selon le niveau de scolarité, Canada 2004-05

	5 ^e années (%)	6 ^e années (%)	7 ^e années (%)	8 ^e années (%)	9 ^e années (%)
Croyances					
Il faut attendre de nombreuses années avant que la fumée nuise à la	18,1 [14,6 - 21,5]	15,5[†] [13,6 - 17,3]	15,5 [13,7 - 17,3]	12,8 [10,8 - 14,8]	12,3 [10,3 - 14,3]
Le fait de fumer occasionnellement compromet la santé,	62,4 [59,7 - 65,0]	66,8 [64,4 - 69,3]	63,8 [61,3 - 66,3]	64,6 [60,6 - 68,6]	69,0 [65,6 - 72,4]
Le fait d'arrêter de fumer diminue les risques pour la santé,	37,9 [33,2 - 42,7]	35,5 [32,3 - 38,8]	42,0 [39,1 - 44,9]	44,8 [42,5 - 47,1]	50,8 [47,8 - 53,9]
Fumer aide à rester mince,	13,2 [10,8 - 15,5]	13,9 [10,9 - 16,9]	20,1 [16,9 - 23,4]	20,2 [17,3 - 23,1]	21,1 [18,0 - 24,2]
Les produits du tabac entraînent une dépendance,	82,5 [80,1 - 84,9]	88,5[†] [86,5 - 90,5]	88,8 [86,9 - 90,8]	90,6 [88,9 - 92,3]	90,7 [87,8 - 93,7]
La fumée peut nuire à la santé des non-fumeurs,	78,0 [74,7 - 81,2]	85,4 [83,0 - 87,9]	89,2 [87,6 - 90,8]	90,9 [88,8 - 92,9]	93,0 [91,8 - 94,2]
Attitudes					
Il est plus agréable de sortir avec des non-fumeurs,	76,9 [74,0 - 79,8]	79,8 [77,7 - 81,9]	79,8 [77,2 - 82,4]	83,4 [81,3 - 85,4]	82,2 [79,5 - 84,9]
Fumer aide à se désennuyer,	7,8 [6,7 - 8,9]	9,1 [7,7 - 10,5]	11,9 [9,3 - 14,4]	15,7 [12,1 - 19,3]	17,7 [15,0 - 20,3]
Fumer aide à se détendre,	18,2 [14,4 - 22,1]	21,6 [19,1 - 24,1]	28,5 [23,6 - 33,4]	37,8 [32,5 - 43,1]	41,8 [38,7 - 44,8]
C'est <cool> de fumer,	#	1,7* [1,1 - 2,3]	1,7* [1,2 - 2,2]	2,4* [1,4 - 3,4]	3,0* [1,8 - 4,1]
Les fumeurs peuvent cesser de fumer n'importe quand,	33,7 [30,1 - 37,3]	30,9 [28,3 - 33,6]	25,2 [22,4 - 28,1]	24,1 [21,3 - 26,9]	23,7 [20,9 - 26,6]
Il devrait être permis de fumer en présence d'enfants à la maison	2,0* [0,9 - 3,2]	1,5 [1,1 - 2,0]	3,2 [2,5 - 3,9]	3,4 [2,5 - 4,3]	3,2 [2,3 - 4,0]
Il devrait être permis de fumer en présence d'enfants dans la voiture	2,0* [0,9 - 3,2]	1,6 [1,1 - 2,1]	3,2 [2,4 - 4,0]	3,4 [2,4 - 4,5]	3,5 [2,4 - 4,5]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance de 95 %]

*Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

#Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

[†]Veuillez prendre note que ce nombre ne devrait pas être arrondi.

Source : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2004-05

Tableau 16. Catégories de tabagisme, selon l'argent de poche obtenu hebdomadairement, tous les niveaux de scolarité, Canada, 2004-05

	Ont déjà fumé la cigarette (%)	N'ont jamais fumé la cigarette (%)
\$10 ou moins	14,5 [12,9 - 16,1]	85,5[†] [83,7 - 87,3]
\$11 - \$20	22,9 [19,2 - 26,6]	77,1 [73,4 - 80,8]
\$21 plus	30,0 [27,1 - 32,9]	70,0 [67,1 - 72,9]
Total	20,2 [18,3 - 22,0]	79,8 [78,0 - 81,7]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance de 95 %]

[†]Veillez prendre note que ce nombre ne devrait pas être arrondi.

Source : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2004-05

Tableau 17. Taux d'utilisation à vie et âge moyen de la première consommation d'alcool et de drogues illicites, selon le sexe, (7^e - 9^e années), Canada, 2004-05

	Garçons		Filles		Total	
	%	âge moyen	%	âge moyen	%	âge moyen
Alcool	65,6 [62,7 - 68,4]	10,9 [10,8 - 11,1]	60,0 [56,8 - 63,1]	11,4 [11,1 - 11,6]	62,9 [60,5 - 65,3]	11,1 [11,0 - 11,3]
Consommation occasionnelle excessive d'alcool ¹	36,5 [32,6 - 40,5]	12,4 [12,2 - 12,7]	36,6 [32,1 - 41,0]	13,1 [13,0 - 13,2]	36,6 [33,1 - 40,0]	13,0 [12,9 - 13,1]
Cannabis	17,5[†] [15,6 - 19,4]	12,4 [12,2 - 12,7]	15,9 [13,3 - 18,6]	12,8 [12,6 - 12,9]	16,7 [15,1 - 18,4]	12,6 [12,4 - 12,8]
Autres drogues+	11,7 [10,0 - 13,4]	S/O	13,3 [10,9 - 15,8]	S/O	12,5[†] [10,7 - 14,2]	S/O
Amphétamines	2,2 [1,5 - 2,9]	13,2 [12,9 - 13,5]	3,1 [2,3 - 4,0]	13,5 [13,3 - 13,8]	2,7 [2,1 - 3,2]	13,4 [13,2 - 13,6]
MDMA (Ecstasy)	2,0* [1,4 - 2,7]	13,5[†] [13,2 - 13,8]	2,7* [1,6 - 3,7]	13,7 [13,5 - 13,9]	2,3 [1,7 - 3,0]	13,6 [13,5 - 13,8]
Hallucinogènes	3,2 [2,4 - 4,1]	13,4 [13,2 - 13,6]	3,3 [2,3 - 4,3]	13,6 [13,3 - 13,9]	3,3 [2,5 - 4,0]	13,5[†] [13,3 - 13,6]
Héroïne	1,0* [0,5 - 1,5]	13,0 [12,7 - 13,3]	0,9* [0,5 - 1,2]	13,1 [12,8 - 13,3]	0,9* [0,6 - 1,2]	13,0 [12,8 - 13,2]
Cocaïne	2,1 [1,4 - 2,7]	13,0 [12,7 - 13,4]	2,9 [2,1 - 3,7]	13,1 [12,8 - 13,4]	2,5[†] [2,0 - 2,9]	13,1 [12,8 - 13,3]
Stéroïdes	1,8 [1,2 - 2,3]	12,9 [12,6 - 13,1]	0,7* [0,4 - 1,1]	13,0 [12,6 - 13,4]	1,3 [0,9 - 1,6]	12,9 [12,7 - 13,1]
Inhalation de colle/ essence et autres produits	7,4 [6,1 - 8,8]	12,4 [12,3 - 12,5]	7,6 [6,0 - 9,3]	12,6 [12,4 - 12,7]	7,5 [6,3 - 8,8]	12,5 [12,4 - 12,6]
Médicaments (i.e, Ritalin)	2,8* [1,7 - 3,8]	12,9 [12,7 - 13,1]	3,2 [2,2 - 4,2]	13,1 [12,8 - 13,4]	3,0 [2,2 - 3,8]	13,0 [12,8 - 13,2]
Analgésiques	1,3 [0,9 - 1,7]	12,7 [12,4 - 13,0]	2,3* [1,5 - 3,1]	13,3 [13,0 - 13,7]	1,8 [1,3 - 2,3]	13,1 [12,8 - 13,4]
Produits de santé naturels ou autres médicaments	1,9* [1,2 - 2,5]	12,9 [12,6 - 13,1]	3,3 [2,4 - 4,2]	13,2 [12,9 - 13,4]	2,6 [2,0 - 3,2]	13,1 [12,8 - 13,3]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance de 95 %]

¹Cinq verres ou plus d'alcool. Note: Parmi les répondants ayant déjà consommé de l'alcool.

S/O - Ne peut être déterminé étant donné le nombre de drogues comprises dans cette catégorie.

* Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

+Autres drogues comprises : amphétamines (<speed>, <Ice>, <meth>); MDMA (ecstasy, E, X); hallucinogènes (LSD, PCP, acide, champignons magiques, mescaline); héroïne (héro, H, schnoufe, crank); cocaïne (coke, crack, neige); colle, essence ou autres produits (solvants).

[†] Veuillez prendre note que ce nombre ne devrait pas être arrondi.

Source : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2004-05

Tableau 18. Taux d'utilisation à vie d'alcool et de cannabis, par province (7^e - 9^e années), Canada 2004-05

	Pop. estimée (en milliers)	Alcool (%)	Consommation occasionnelle excessive d'alcool ¹ (%)	Cannabis (%)
CANADA	1 228	62.9 [60.5 - 65.3]	36.6 [33.1 - 40.0]	16,7 [15,1 - 18,4]
T,-N,-L,	20	55.0 [51.5 - 58.5]	41.1 [36.4 - 45.8]	17,6 [13,0 - 22,2]
Î,-P,-É,	6	48.7 [42.7 - 54.7]	44.0 [37.7 - 50.3]	8,0 [5,7 - 10,4]
N,-É,	36	53.9 [51.4 - 56.3]	43.5 [40.6 - 46.5]	20,8 [18,8 - 22,9]
N,-B,	30	50.3 [41.1 - 59.6]	43.2 [33.6 - 52.7]	15,0* [8,6 - 21,3]
Qc	294	76.4 [72.1 - 80.8]	42.7 [34.8 - 50.6]	27,9 [24,2 - 31,7]
Ont,	474	58.7 [53.4 - 64.1]	30.7 [24.8 - 36.6]	12,0 [8,9 - 15,0]
Man,	44	49.4 [44.1 - 54.7]	25.3* [18.2 - 32.5]	#
Sask,	41	61.8 [52.9 - 70.7]	37.3 [29.5 - 45.1]	14,0* [10,3 - 15,6]
Alb,	138	67.2 [62.7 - 71.7]	41.4 [36.2 - 46.7]	12,9 [8,8 - 20,2]
C,-B	145	54.2 [47.5 - 60.9]	32.2* [21.8 - 42.6]	14,5* [8,8 - 20,2]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance de 95 %]

¹Cinq verres ou plus d'alcool. Note: Parmi les répondants ayant déjà consommé de l'alcool.

*Variabilité modérée de l'échantillonnage; interpréter avec prudence.

Forte variabilité de l'échantillonnage - même si une estimation peut être déterminée à partir du tableau, les données devraient être supprimées.

Source : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2004-05

Tableau 19. Taux d'utilisation à vie d'alcool et de drogues illicite, selon le niveau de scolarité (7^e - 9^e années), Canada 2004-05

	Pop. estimée (en milliers)	Alcool (%)	Consommation occasionnelle excessive d'alcool ¹ (%)	Cannabis (%)
7 ^e années	414	49,0 [45,6 - 52,4]	22,3 [17,9 - 26,8]	7,4 [5,7 - 9,1]
8 ^e années	407	63,6 [59,4 - 67,7]	33,8 [30,1 - 37,6]	14,6 [11,9 - 17,3]
9 ^e années	407	75,2 [71,9 - 78,6]	47,6 [42,0 - 53,2]	27,7 [24,0 - 31,4]
Total	1 228	62,9 [60,5 - 65,3]	36,6 [33,1 - 40,0]	16,7 [15,1 - 18,4]

[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance de 95 %]

¹Cinq verres ou plus d'alcool. Note: Parmi les répondants ayant déjà consommé de l'alcool.

Source : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2004-05

Tableau 20. Consommation de cannabis, d'après la catégorie de tabagisme (7^e - 9^e années), Canada 2004-05		
	Ont essayé le cannabis (%)	N'ont jamais essayé le cannabis (%)
Ont déjà fumé la cigarette	50,3 [46,9 - 53,7]	49,7 [46,3 - 53,1]
N'ont jamais fumé la cigarette	4,7 [3,8 - 5,5]	95,3 [94,5 - 96,2]
[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance de 95 %]		
Source : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2004-05		

Tableau 21. Consommation d'alcool, d'après la catégorie de tabagisme (7^e - 9^e années), Canada 2004-05		
	Ont essayé l'alcool (%)	N'ont jamais essayé l'alcool (%)
Ont déjà fumé la cigarette	91,2 [89,3 - 93,1]	8,8 [6,9 - 10,7]
N'ont jamais fumé la cigarette	52,6 [49,9 - 55,3]	47,4 [44,7 - 50,1]
[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance de 95 %]		
Source : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2004-05		

Tableau 22. Consommation occasionnelle excessive d'alcool¹, d'après la catégorie de tabagisme (7^e - 9^e années), Canada 2004-05		
	Ont déjà consommé excessivement de l'alcool (%)	N'ont jamais consommé excessivement de l'alcool (%)
Ont déjà fumé la cigarette	58,5[†] [54,0 - 62,9]	41,5 [37,1 - 46,0]
N'ont jamais fumé la cigarette	22,8 [19,8 - 25,8]	77,2 [74,2 - 80,2]
[Valeurs entre crochets : intervalle de confiance de 95 %]		
¹ Cinq verres ou plus d'alcool. Note: Parmi les répondants ayant déjà consommé de l'alcool.		
[†] Veuillez prendre note que ce nombre ne devrait pas être arrondi.		
Source : Enquête sur le tabagisme chez les jeunes, 2004-05		

Tableau 23. Taille de l'échantillon, selon la province et les regroupements de scolarité, tous les niveaux de scolarité, Canada, 2004-05

	5 ^e années	6 ^e années	7 ^e années	8 ^e années	9 ^e années	Total
Canada	5881	6657	5894	5864	4947	29243
T,-N,-L,	544	601	519	731	423	2518
Î,-P,-É,	517	622	590	530	523	2782
NS	656	781	394	360	294	2485
NB	420	588	603	580	390	2581
Qc	851	915	731	743	404	3644
Ont,	784	817	834	800	915	4150
Man,	619	706	610	638	437	3010
Sask,	379	378	397	330	562	2046
Alb.	606	604	620	464	331	2625
C,-B	505	645	596	988	668	3402