

# Immunization Schedule

## Routine Immunization Schedule for Infants and Children

AGE	VACCINE
2 months	<b>DTaP-IPV-Hib</b> (Diphtheria, Tetanus, Acellular Pertussis, Inactivated Polio Vaccine, Haemophilus Influenza Type B) <b>HB</b> (Hepatitis B) <b>Pneum C</b> (Pneumococcal 7 Valent Conjugate) <b>Men C alpha</b> (Meningococcal C Conjugate)
4 months	<b>DTaP-IPV-Hib</b> (Diphtheria, Tetanus, Acellular Pertussis, Inactivated Polio Vaccine, Haemophilus Influenza Type B) <b>Pneum C</b> (Pneumococcal 7 Valent Conjugate) <b>HB</b> (Hepatitis B)
6 months	<b>DTaP-IPV-Hib</b> (Diphtheria, Tetanus, Acellular Pertussis, Inactivated Polio Vaccine, Haemophilus Influenza Type B) <b>Pneum C</b> (Pneumococcal 7 Valent Conjugate) <b>Men C alpha</b> (Meningococcal C Conjugate)
12 months	<b>Measles, Mumps Rubella (MMR)</b> <b>HB</b> (Hepatitis B) <b>VAR</b> (Varicella)
18 months	<b>DTaP-IPV-Hib</b> (Diphtheria, Tetanus, Acellular Pertussis, Inactivated Polio Vaccine, Haemophilus Influenza Type B) <b>Pneum C</b> (Pneumococcal 7 Valent Conjugate) <b>Measles, Mumps Rubella (MMR)</b>
4–6 years	<b>DTaP-IPV</b> (Diphtheria, Tetanus, Acellular Pertussis, Inactivated Polio Vaccine)
14–16 years	<b>dTap</b> (Diphtheria Tetanus acellular Pertussis $\beta$ ) ( <i>usually administered in school</i> ) <b>Men C alpha</b> (Meningococcal C Conjugate)

Common side effects of immunizations include soreness and redness at the site of the injection, irritability/fussiness, and/or mild fever. If your child experiences anything more severe, please contact your physician and report all severe reactions to one of the Community Health Nurses at the Whitehorse Health Center. If you are in a Yukon community outside of Whitehorse, please report the reaction to the local Community Nurse Practitioner.

### WHITEHORSE HEALTH CENTRE

9010 Quartz Road • (867) 667-8864

#### APPOINTMENTS

Tuesdays and Thursdays: 9:00 – 11:15 a.m.  
Mondays, Thursdays and Fridays: 1:00 – 3:15 p.m.

#### FOREIGN TRAVEL CLINICS

By appointment only — call for an appointment six to eight weeks before departure.

#### ADULT HEALTH CLINICS

Immunization Clinics — Monday to Friday: 8:00 – 8:30 a.m. and 3:00 – 4:00 p.m.  
Recommended for follow-up on foreign travel vaccines, influenza vaccine, adult Tetanus Diphtheria, and TB screening (Mondays, Tuesdays and Wednesdays).

#### DROP IN

Saturdays (except long weekends): 10:00 a.m. – noon  
Catch-up immunization for infants and children only.

#### WEIGHT AND MEASURE DROP IN

Immunizations are not given at this time.  
Wednesdays: 1:00 – 3:00 p.m.

**Consult your health care provider if side effects persist over 48 hours.  
For more information on vaccinations, visit: <http://www.hss.gov.yk.ca/>**

March 2007 — Program implemented January 1, 2007.

# Calendrier de vaccination

## Vaccination systématique pour les nourrissons et les enfants

ÂGE	VACCIN
2 mois	<b>DCaT-VPTI-Hib</b> (Diphthérie, téтанos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite, <i>Haemophilus influenzae</i> de type B) <b>Hép. B</b> (Hépatite B) <b>PC</b> (Pneumocoque conjugué) <b>MC</b> (Méningocoque C conjugué)
4 mois	<b>DCaT-VPTI-Hib</b> (Diphthérie, téтанos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite, <i>Haemophilus influenzae</i> de type B) <b>PC</b> (Pneumocoque conjugué) <b>Hép. B</b> (Hépatite B)
6 mois	<b>DCaT-VPTI-Hib</b> (Diphthérie, téтанos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite, <i>Haemophilus influenzae</i> de type B) <b>PC</b> (Pneumocoque conjugué) <b>MC</b> (Méningocoque C conjugué)
12 mois	<b>RRO</b> (Rougeole, rubéole, oreillons) <b>Hép. B</b> (Hépatite B) <b>VAR</b> (Varicelle)
18 mois	<b>DCaT-VPTI-Hib</b> (Diphthérie, téтанos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite, <i>Haemophilus influenzae</i> de type B) <b>PC</b> (Pneumocoque conjugué) <b>RRO</b> (Rougeole, rubéole, oreillons)
4–6 ans	<b>DCaT-VPTI</b> (Diphthérie, téтанos, coqueluche (acellulaire), poliomyélite)
14–16 ans	<b>DCaT</b> (Diphthérie, téтанos, coqueluche (acellulaire)) <b>MC</b> (Méningocoque C conjugué)

Les effets indésirables fréquemment associés à la vaccination sont notamment : sensibilité accrue et rougeurs au site d'injection, humeur maussade, légère fièvre. Si votre enfant présente des symptômes plus graves, veuillez consulter votre médecin et signaler toute réaction grave aux infirmières en santé communautaire du Centre de santé de Whitehorse. Si vous habitez à l'extérieur de Whitehorse, veuillez signaler toute réaction grave à l'infirmière praticienne de votre localité.

### CENTRE DE SANTÉ DE WHITEHORSE

9010 Quartz Road • 867-667-8864

#### SUR RENDEZ-VOUS

mardi et jeudi : de 9 h à 11 h 15

lundi, jeudi et vendredi : de 13 h à 15 h 15

#### CLINIQUE DES VOYAGEURS

Sur rendez-vous seulement — veuillez prendre rendez-vous de 6 à 8 semaines avant la date de départ.

#### CLINIQUE DE SANTÉ DES ADULTES

Clinique de vaccination — du lundi au vendredi : de 8 h à 8 h 30 et de 15 h à 16 h

Recommandée pour : vaccination de rappel pour les voyageurs, vaccin contre l'influenza, vaccin contre la diphtérie et le téтанos, dépistage de la tuberculose (lundi, mardi et mercredi).

Consultez votre fournisseur de soins de santé si les effets indésirables persistent après 48 heures.

Pour de plus amples renseignements sur les vaccins, visitez le site : <http://www.hss.gov.yk.ca/>

Mars 2007 — Programme mis sur pied le 1<sup>er</sup> janvier 2007.