

肺炎球菌多醣疫苗

Pneumococcal Polysaccharide Vaccine

過去五十年來，防疫注射在加拿大挽救的生命，多於任何其他醫療措施。

甚麼是肺炎球菌多醣疫苗？

肺炎球菌多醣疫苗可預防二十三種的肺炎球菌。該疫苗獲加拿大衛生部核准。

肺炎球菌多醣疫苗並非兒童時期需接種的例行性防疫注射。想了解更多有關兒童的例行性肺炎球菌疫苗注射，請參閱卑詩健康檔案（BC HealthFile）[#62a肺炎球菌（PCV 7）疫苗](#)。

甚麼人應該接種此疫苗？

有些人較容易因肺炎球菌感染而致病，因此可免費接種疫苗；這些人包括：

- 六十五歲及以上的長者
- 居住在療養院、護理院或其他群體設施內的任何年齡人士。

患有某些健康問題的兩歲及以上人士，也可免費接種該疫苗。有下列情況的人士應接受一劑或一針該疫苗，這些人士包括：

- 沒有脾臟，或脾臟功能不正常*
- 患上鎌狀細胞疾病*
- 因疾病或藥物治療導致免疫系統減弱*
- 患上慢性肝病，包括肝硬化、慢性乙型肝炎或丙型肝炎*
- 患上慢性腎病*

- 患上慢性心臟或肺部疾病
- 接受過胰島細胞或器官移植，或人工耳蝸（內耳）植入，或正在等候進行這些手術
- 接受過幹細胞移植
- 糖尿病、囊泡性纖維症或慢性腦脊液漏
- 有依賴酒精的情況。

*這幾類人士應於接受第一劑疫苗後的幾年，再接種第二劑。請與您的公眾健康護士或醫生商量，應何時接受第二劑疫苗。

您必須將所有防疫注射記錄下來。

接種該疫苗的益處

這種疫苗是保護您免受肺炎球菌感染的最佳方法；肺炎球菌感染是一種嚴重疾病，有時甚至可以致命。

當您接種疫苗時，也同時保護了其他人。

接種疫苗後可能出現的反應

疫苗是很安全的。接種疫苗，遠比患上肺炎球菌感染來得安全。

對疫苗的一般反應可以包括注射部位出現疼痛、發紅及發腫，也可能出現頭痛及輕微的發燒。這些反應都很輕微，通常維持一至二日。

如有發燒或疼痛，可服用醋氨酚 (Acetaminophen) 或 Tylenol®。水楊酸 (ASA) 或 Aspirin®，不應給任何二十歲以下人士服用，因為有造成雷伊氏綜合症的風險。

接種任何疫苗後，必須在診所內逗留十五分鐘，因為在非常罕見的情況下，會出現稱為全身性過敏反應 (anaphylaxis) 的可致命過敏反應。病徵可能包括蕁麻疹、呼吸困難，或喉嚨、舌頭、嘴唇腫脹。萬一您在離開診所後發生這種情況，請致電 911 或當地的緊急求助電話。這種反應是可以治療的，而且在接種疫苗的人士當中，發生率低於百萬分之一。

如有任何嚴重或未可預料的反應，請告訴您的公眾健康護士或醫生。

甚麼人不可以接種該疫苗？

如果您曾對以往接種的肺炎球菌疫苗，或其中所含的任何成分如酚 (phenol) 或膠乳，出現危及生命的反應，請與公眾健康護士或醫生商量。

兩歲以下的幼童不應接種此疫苗。

肺炎球菌感染是甚麼？

肺炎球菌感染由病菌 (或細菌) 引起，可以導致嚴重與危及生命的感染，包括稱為腦膜炎的腦部薄膜感染，及稱為敗血病的血液感染。每二十名染病的患者中，有多至五名會因而死亡；感染所造成的永久性併發症包括腦部損傷及耳聾。

肺炎球菌感染可經由咳嗽、打噴嚏或近距離的面對面接觸而在人與人之間傳播。病

菌也能經由唾液或痰涎傳播。透過接吻，或是共享食物、飲品、香煙、唇膏、水樽、運動口罩及吹奏樂器，細菌即可傳播。

思想成熟未成年人士自決權

為兒童接種防疫注射之前，當局會先盡量取得其家長或監護人的同意。不過無論家長或監護人的意願為何，年齡未滿十九歲的人士，只要能夠了解接種防疫注射的好處與風險，就可以自行決定是否接種。在接種防疫注射之前，我們建議家長／監護人與未成年的孩子先討論防疫注射的問題，並向護士或醫生提問。

欲知更多有關卑詩省健康檔案論題，請瀏覽 www.bchealthguide.org/healthfiles/index.stm，或約見您區內的公共衛生機構。

- 欲向註冊護士查詢，請致電每天 24 小時卑詩省護士熱線：
- 在大溫地區，請致電 604-215-4700
 - 卑詩省內免費長途電話為 1-866-215-4700
 - 聾人及有聽覺障礙人士，請致電 1-866-889-4700
 - 藥劑師於每天下午 5 時至上午 9 時當值
 - 如有要求，可提供超過 130 種語言的翻譯服務。

請登入 www.bchealthguide.org 瀏覽卑詩省健康指南網上資料 – 您可信賴的健康資訊世界