

Vacuna de la hepatitis B Hepatitis B Vaccine

**Mantenga seguro a su niño.
Vea que reciba todas sus vacunas a tiempo.**

Al recibir sus vacunas a tiempo, su niño puede quedar protegido durante toda la vida contra muchas enfermedades.

Las vacunas han salvado más vidas en Canadá en los últimos 50 años que cualquiera otra medida sanitaria.

¿Qué es la vacuna de la hepatitis B?

La vacuna contra la hepatitis B protege contra el virus de la hepatitis B. La vacuna está aprobada por Health Canada.

¿Quiénes deberían recibir la vacuna?

La vacuna contra la hepatitis B se otorga gratuitamente como parte de las vacunas rutinarias de su hijo. Se da la vacuna en el 6º grado en dos dosis o inyecciones, con un intervalo de 4 a 6 meses entre ellas.

También se suministra gratuitamente la vacuna de la hepatitis B a los bebés, como parte de su programa normal de vacunación. Para mayor información, vea el BC HealthFile [#25c Vacuna infantil contra la hepatitis B](#).

Los adultos y aquellos de 16 o más años de edad requieren tres dosis de la vacuna. También se suministra gratuitamente la vacuna a los niños y adultos con alto riesgo de contraer la infección de la hepatitis B, como ser:

- Los niños menores de 7 años que viven con personas con alto riesgo de infectarse con el virus de la hepatitis B. Por ejemplo, los usuarios de drogas intravenosas, hombres que tienen sexo con otros hombres, o personas que trabajan en el comercio sexual

- Niños menores de 12 años de edad, cuyas familias han inmigrado de regiones con altas tasas de hepatitis B
- Niños que viven con una persona que tiene hepatitis B
- Parejas sexuales de personas con hepatitis B
- Hombres que tienen contacto sexual con otros hombres
- Usuarios de drogas administradas con inyecciones y sus parejas sexuales
- Aquellos que comparten drogas a través de equipos para inhalar, fumar o inyectar
- Aquellos con muchas parejas sexuales o con una infección sexualmente transmitida recientemente
- Aquellos con enfermedad crónica del hígado, hepatitis C o un transplante de hígado
- Aquellos con enfermedades renales crónicas, tales como pacientes de prediálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal
- Aquellos que han recibido un transplante de riñón o células madre
- Los que padecen de hemofilia o están recibiendo perfusiones repetidas de sangre o productos de sangre
- Los reos en un establecimiento carcelario
- Estudiantes que están tomando cursos de una profesión relacionada con la salud y que puedan tener contacto con sangre y fluidos corporales
- Profesores, personal y alumnos en una guardería infantil donde ha asistido un niño con hepatitis B, cuyo comportamiento o condición médica aumenta sus posibilidades de estar expuestos a la sangre o fluidos corporales de ese niño
- Personal o residentes de una residencia comunitaria para personas de desarrollo limitado.

Si Ud. no califica para recibir una vacuna gratis, converse con su doctor o unidad de salud pública sobre la posibilidad de comprar la vacuna. Es importante mantener un registro de todas las vacunas recibidas.

Beneficios de la vacuna contra la influenza

La vacuna contra la hepatitis B es la mejor forma de protegerse contra la hepatitis B y sus complicaciones, como el daño permanente al hígado, que puede llevar a un cáncer del hígado y la muerte. Cuando Ud. se vacuna, ayuda también a proteger a otros.

Reacciones posibles después de la vacuna

Las vacunas son muy seguras. Es mucho más seguro vacunarse que tener hepatitis B. Entre las reacciones comunes a las vacunas, están los dolores, el enrojecimiento y la hinchazón en el lugar en que se colocó la inyección. Algunas personas pueden sufrir una fiebre leve.

Para la fiebre y los dolores, se puede dar Acetaminophen o Tylenol®. NO se debe dar AAS o Aspirina® a alguien menor de 20 años de edad debido al riesgo del Síndrome de Reye.

Después de recibir cualquier vacuna, es importante quedarse en la clínica 15 minutos porque hay una posibilidad, aunque rarísima, de que se produzca una reacción alérgica grave llamada anafilaxis. Esto puede incluir urticaria, dificultad para respirar o hinchazón de la garganta, la lengua o los labios. Si esto ocurre después que Ud. sale de la clínica, llame al 911 o al número local para emergencias. Esta reacción puede ser tratada y se produce en menos de una persona en un millón que han recibido la vacuna.

Sírvase informar sobre cualquier reacción inesperada o seria a su enfermera o médico de salud pública.

¿Quiénes NO deberían recibir la vacuna?

Consulte a su enfermera de salud pública o doctor si Ud. ha tenido una reacción con peligro de muerte a una dosis previa de la vacuna contra la hepatitis B o a cualquier componente de la vacuna, incluyendo la levadura o el látex.

¿Qué es la hepatitis B?

La hepatitis B es un virus que ataca el hígado. Puede causar enfermedades serias, como el daño permanente al hígado (cirrosis). La hepatitis B también es la principal causa del cáncer al hígado, el que puede ser fatal. El virus de la hepatitis B se propaga de una persona infectada a otra por contacto con la sangre o los fluidos corporales, tal como en un pinchazo

accidental con una aguja usada, contacto sexual íntimo, recibir una salpicadura de sangre infectada en la boca, nariz u ojos, recibir un mordisco de una persona infectada o compartir artículos contaminados con sangre, tales como un cepillo dental, hilo dental u hoja de afeitar. Las madres infectadas con el virus de la hepatitis B pueden traspasar el virus a sus bebés recién nacidos durante el parto.

Después que el virus penetra su cuerpo, toma habitualmente de dos a tres meses para mostrar síntomas de la enfermedad. Muchas personas que se contagian con la hepatitis B no exhiben síntomas y pueden ignorar que tienen la enfermedad. Hayan o no síntomas de la enfermedad, se puede transmitir el virus a otros.

Consentimiento de menor maduro

Se hacen esfuerzos para solicitar la autorización de los padres o tutores antes de la vacunación. Los niños menores de 19 años que pueden entender los riesgos y beneficios, pueden dar su consentimiento a las vacunas, o bien rechazarlas, independientemente de los deseos de los padres o tutores. Se aconseja que los padres/tutores y sus niños menores de edad conversen de antemano sobre las vacunas y le hagan las preguntas que tengan sobre este tema a su enfermera o médico.

Para obtener información sobre otros temas del BC HealthFile, sírvase ver www.bchealthguide.org/healthfiles/index.stm, o visite su unidad local de salud pública.

Llame a la BC NurseLine para conversar con una enfermera registrada, disponible las 24 horas todos los días:

- Dentro de la región del Gran Vancouver, llame al 604-215-4700
- En BC, llamar gratis al 1-866-215-4700
- Personas sordas y personas con problemas de audición, llamar a: 1-866-889-4700
- Farmacéutico disponible todos los días, de las 5 pm a las 9 am
- Se dispone de servicios de traducción a más de 130 idiomas.

Visite BC HealthGuide OnLine – un mundo de información confiable acerca de la salud en www.bchealthguide.org