

Consultation des praticiens de médecine non traditionnelle, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus,, Canada, 2000-2001

Consultation des praticiens de médecine non traditionnelle	Total, consultation d'un praticien de médecine non traditionnelle	Consultation d'un praticien de médecine non traditionnelle		Pas de consultation d'un praticien de médecine non traditionnelle		Consultation d'un praticien de médecine non traditionnelle, non déclarée	
	Nombre	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
2000-2001							
Total, 12 ans et plus	25 801 719	2 832 503	11,0	22 958 100	89,0	11 116E	0,0E
Hommes	12 705 415	1 011 577	8,0	11 686 787	92,0	7 051E	0,1E
Femmes	13 096 304	1 820 926	13,9	11 271 313	86,1	4 065E	0,0E
12 à 19 ans	3 243 281	160 200	4,9	3 081 353	95,0	F	F
Hommes	1 662 580	62 232	3,7	1 599 536	96,2	F	F
Femmes	1 580 701	97 968	6,2	1 481 817	93,7	F	F
12 à 14 ans	1 154 646	30 616	2,7	1 123 027	97,3	F	F
Hommes	601 795	13 579	2,3	587 483	97,6	F	F
Femmes	552 851	17 037	3,1	535 544	96,9	F	F
15 à 19 ans	2 088 635	129 584	6,2	1 958 326	93,8	F	F
Hommes	1 060 785	48 653	4,6	1 012 052	95,4	F	F
Femmes	1 027 850	80 931	7,9	946 274	92,1	F	F
20 à 34 ans	6 303 776	818 298	13,0	5 482 265	87,0	F	F
Hommes	3 191 212	296 090	9,3	2 892 189	90,6	F	F
Femmes	3 112 564	522 208	16,8	2 590 076	83,2	F	F
20 à 24 ans	2 130 833	230 167	10,8	1 899 382	89,1	F	F
Hommes	1 081 580	81 305	7,5	998 990	92,4	F	F
Femmes	1 049 253	148 861	14,2	900 391	85,8	F	F
25 à 34 ans	4 172 944	588 131	14,1	3 582 883	85,9	F	F
Hommes	2 109 632	214 785	10,2	1 893 199	89,7	F	F
Femmes	2 063 311	373 347	18,1	1 689 684	81,9	F	F
35 à 44 ans	5 319 716	732 082	13,8	4 585 050	86,2	F	F
Hommes	2 649 765	253 787	9,6	2 395 004	90,4	F	F
Femmes	2 669 951	478 295	17,9	2 190 047	82,0	F	F
45 à 64 ans	7 287 155	908 055	12,5	6 376 734	87,5	F	F
Hommes	3 607 491	323 784	9,0	3 282 005	91,0	F	F
Femmes	3 679 663	584 271	15,9	3 094 729	84,1	F	F
45 à 54 ans	4 449 730	622 091	14,0	3 826 362	86,0	F	F
Hommes	2 197 419	221 516	10,1	1 974 985	89,9	F	F
Femmes	2 252 312	400 575	17,8	1 851 377	82,2	F	F
55 à 64 ans	2 837 424	285 964	10,1	2 550 371	89,9	F	F
Hommes	1 410 073	102 268	7,3	1 307 020	92,7	F	F
Femmes	1 427 352	183 696	12,9	1 243 352	87,1	F	F
65 ans et plus	3 647 791	213 867	5,9	3 432 698	94,1	1 225E	0,0E
Hommes	1 594 367	75 684	4,7	1 518 054	95,2	F	F
Femmes	2 053 424	138 184	6,7	1 914 644	93,2	F	F
65 à 74 ans	2 156 504	142 633	6,6	2 013 295	93,4	F	F
Hommes	1 004 986	54 618	5,4	950 011	94,5	F	F
Femmes	1 151 518	88 015	7,6	1 063 284	92,3	F	F
75 ans et plus	1 491 287	71 235	4,8	1 419 403	95,2	F	F
Hommes	589 380	21 066	3,6	568 043	96,4	F	F
Femmes	901 906	50 169	5,6	851 360	94,4	F	F

Consultation des praticiens de médecine non traditionnelle, selon le groupe d'âge et le sexe, population à domicile de 12 ans et plus,, Canada, 2000-2001

1. Source des données : Statistique Canada, *Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2000-2001*
2. Personnes de 12 ans et plus qui ont consulté un praticien de médecine non traditionnelle au cours des 12 derniers mois.
3. Les praticiens de médecine non traditionnelle incluent les massothérapeutes, les acupuncteurs, les homéopathes ou les naturopathes, les enseignants des techniques Feldenkrais ou Alexander, les relaxologues, les enseignants des techniques de rétroaction biologique, les « rolfer », les herboristes, les réflexologues, les guérisseurs spirituels, les guérisseurs religieux, etc.
4. Les coefficients de variation (CV) et les intervalles de confiance (IC) de 95 % ont été calculés selon la méthode de rééchantillonnage « Bootstrap ».
5. Les données dont le coefficient de variation (CV) se situe entre 16,6 % et 33,3 % sont marquées d'un (E) et doivent être interprétées avec prudence.
6. Les données présentant un coefficient de variation (CV) supérieur à 33,3 % ont été supprimées (F) en raison de l'extrême variabilité d'échantillonnage.
7. Les régions socio-sanitaires sont définies par les gouvernements provinciaux comme étant les secteurs de responsabilité des conseils régionaux de santé (établis aux termes de la loi), ou encore comme des régions intéressant les autorités sanitaires.
8. Un « groupe de régions homologues » est un groupe de régions socio-sanitaires qui comportent des caractéristiques sociales et économiques similaires.
9. À Terre-Neuve-et-Labrador, les régions socio-sanitaires sont généralement appelées des régions « Health and Community Services (HCS) ».
10. À l'Île-du-Prince-Édouard, les deux régions socio-sanitaires divisent la province selon une entité « rurale » et une entité « urbaine ».
11. L'Île-du-Prince-Édouard a délimité des régions socio-sanitaires pour les seuls besoins statistiques; lesquelles ne correspondent en rien aux cinq régions socio-sanitaires créées à des fins de gestion.
12. En Nouvelle-Écosse, les régions sont appelées des « zones » et correspondent aux limites administratives des régions socio-sanitaires de la province.
13. En Ontario, les « Public Health Units (PHU) » gèrent les programmes de promotion de la santé et de prévention de la maladie, tandis que les « District Health Councils (DHC) » sont des organismes consultatifs de planification en matière de santé.
14. Compte tenu de la faible population de Churchill au Manitoba (1 110 habitants en 1996), l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes recueille seulement des données pour l'agrégat de Burntwood et Churchill (régions 4680, 4690).
15. En Saskatchewan, des « service areas (SA) » ont été créées en regroupant les 33 districts de santé.
16. En Alberta, les régions socio-sanitaires sont appelées « Health Authorities (HA) » ou « Regional Health Authorities (RHA) ».
17. Les signes suivants sont employés dans les publications de Statistique Canada : (..) nombres non disponibles et (...) nombres n'ayant pas lieu de figurer.
18. Tableau CANSIM numéro 01050062.



Statistique
Canada

Statistics
Canada



Institut canadien
d'information sur la santé
Canadian Institute
for Health Information

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada

© Ministre de l'Industrie, 2002
© Institut canadien d'information sur la santé

Le contenu de cette publication peut être reproduit en totalité ou en partie, pourvu que ce soit à des fins non commerciales et que les sources soient clairement identifiées.