

د کووید-19 واکسین معلومات پلې

5.0 نسخه - اپریل 1، 2021

دا سند یوازی لوړمنې معلومات وړاندی کوي او د دی هدف د طبی مشوري، تشخيص یا درمانې، او یا قانوني مشوري وړاندی کول یا خای نبول ندي.

تر دی دمه، د کانادا روغتیا اداري لاندی د کووید-19 واکسینونو ته په کانادا کي د کارولو اجازه ورکړې:

د فایزر-بلنټک کووید-19 واکسین، د مادرنا کووید-19 واکسین، د استرازنیکا کووید-19 واکسین، کوویشیلک کووید-19 واکسین، او جانسن کووید-19 واکسین. د جانسن کووید-19 واکسین په اړه معلومات به په دی سند کي هغه وخت اضافه شي چې کانادا ته یي اکمالات تایید شي. په کانادا کي د استعمال پیاره تول د کووید-19 واکسینونه د کانادا روغتیا اداري لخوا د سختو معیارونو په کارولو سره ارزول شوي دي. د کانادا روغتیا اداره به هتلولو واکسینونو خارني ته دوام ورکړي ترڅو داد ترلاسه کړي چې دا خوندي او موثره دي.

مهربانی وکړئ دا معلومات پلې په دقت سره ولولی او دا ترلاسه کړي چې ستاسوتوولي پونستي د واکسین ترلاسه کولو دمځه د روغتیا پاملنې چمتو کوونکي لخوا خواب شوي دي.

کووید-19 خه شي دی؟

کووید-19 یو عفونت دی چې د نوي کورونا ویروس (SARS-CoV-2) له امله رامینځته کېږي. کووید-19 د لوړۍ خل لپاره په دسمبر 2019 کي پېژندل شوی و او له هغې راهیسي ګردنه نږي کي خوربدو سره د وبا سبب شوي دي. کووید-19 په عام دول د یو کړر تن خنه نورو ته هغه وخت کي انقالپري چې کړر تښتونه وکړي، پرنجي وکړي، سندره وایي، خبرې کوي یا ساه راکاړي. دا خبره یادول مهم دي چې کړر کسان دا عفونت هغه وخت هم خورولی شي چې خپله علامي نلري. **د کووید-19 یه علامو کېتونه کول، د ساه لنډېل، تبه، ساره، ستريا او د بوي یا ذايقي د حس له لاسه ورکول شاملېدلې شي.** خېنې کسان چې په ویروس کړر شوي وي هیڅ علامي نلري، په داسې حال کي چې نور داسې علامي لري چې د خفيف نه تر شدید پورې توپېر لرلې شي.

د کووید-19 واکسینونه څرګه د کووید-19 خه حفاظت کوي؟

تول واکسینونه زمونږ بدنه د یو داسې خه په ورکولو کار کوي چې هغه د عفونت په څېرښکاري ترڅو زمونږ بدنه حفاظتي سیستم زده کړي چې څرګه طبی حفاظت تولید کړي. دا طبیعی حفاظت بیا په راتلونکي کي د مریضی مختیوی کوي که چيرته تاسو راتلونکي کي د کووید-19 ویروس سره مخامخ شي. د واکسین نه تاسو ته کووید-19 نشي ګېدلې.

په دی اړه چې د کووید-19 واکسینونه څرګه حفاظت برابروي نور تفصيلي معلومات د [Public Health Ontario's COVID-19 Vaccines](#) او [What You Need to Know About COVID-19 Vaccines \(PHO\)](#) وېبیلنې او په [COVID-19 Vaccines: Viral Vector-Based Vaccines](#) کي موندل ګېدلې شي.

د کووید-19 تول واکسینونه چې کانادا کي یې د کارولو اجازه ورکړي شوي د علامو، لاپراتوار خه تایید شوي مریضو خه حفاظت کي اغېزمن دي. په سترو تحقیقاتي مطالعو کي کومو کي چې خلکو ته د واکسینو دواړه خوراکونه ورکړي شوي ووټولو واکسینو په دی کي دېرسنې کار کړي و چې د خلکو د علامو لرونکي، لاپراتوار کي تایید شوي کووید-19

څخه د مریضیدو مخنیوی وکړي. د واکسین اغېزمنتیا د لومړی خوراک څخه 14 ورځی وروسته او د دویم نه مخکي د فایزر/بیونیت ک او مادرنا لپاره 90 فیصده پکل شوی او استرازنکا/کوویشیلد لپاره 70 فیصده. د واکسین اغېزمنتیا د سپارشن تني شوی وقفي څخه وروسته دویم خوراک سره فایزر/بایفیت ک او مادرنا لپاره د 90 فیصد نه زیات او استرازنکا/کوویشیلد لپاره د 80 فیصد نه زیات پکل شوی ده. دا مهمه ده چې تاسو ته ددې و واکسینو دوه خوراکونه درکړي شي). د کووید-19 څخه اوږدمهاله حفاظت تر هغه وخته نشي ترلاسه کېدلې ترڅو چې دویم خوراک نه وي ګول شوی. ټول هغه د کووید-19 واکسینونه چې کانادا کي یې د کارولو اجازه ورکړي شوی ده روغتون کي له بستري کېدو په مخنیوی کي هم پېر اغېزمن دي.

دا واکسینونه چاته ګول کېدلې شي؟

د واکسینو یو بشپړ تسلسل باید هغو افرادو ته وراندي کړي شي چې واکسینو له امله کومي ستونزی سره نه مخ کېږي او دا مهال د لومړیتوب په پېژندل شوو ډلو کي وي.

- کووید-19 لپاره د فایزر/بایوفیت ک د واکسینو اجازه دا مهال هغو افرادو لپاره ورکړي شوی چې عمر یې 16 کاله يا زیات وي.
- کووید-19 لپاره د مادرنا د واکسینو اجازه دا مهال هغو افرادو لپاره ورکړي شوی چې عمر یې 18 کاله يا زیات وي.
- کووید-19 لپاره د استرازنکا د واکسینو او کوویشیلد اجازه دا مهال هغو افرادو لپاره ورکړي شوی چې عمر یې 18 کاله يا زیات وي. په دې وخت کي د ايمني کولو په اړه د ملي مشاورت کمته (NACI) سپارشن تنه کوي چې کووید-19 لپاره د استرازنکا واکسین او کوویشیلد باید 55 کالو نه کم عمر والا بالغانو لپاره ونه کارول شي.

ددی خبری د معلومولو لپاره چې آیا تاسو دي وخت کي د واکسین ترلاسه کولو مستحق یاست لطفاً د اوتیمار یو د کووید-19 د واکسینو یلان ته مراجعيه وکړئ.

د واکسین ترلاسه کولو دمځه، د روغتیا پاملنۍ چمتو کوونکي خبر کړئ څوک چې تاسو ته واکسین درکوي که:

- تاسو اوس مهال د ناروځی احساس کوي یا د کووید-19 ښې او علایم لرئ.
- تاسو پخوا د کووید-19 واکسین یا د کووید-19 واکسینونو، یا بل کوم واکسین د اجزاوو په وراندي حساسیتی غېګون بشودلې وي.
- تاسو کوم ډول حساسیت یا حساسیتی ناروځی لرئ.
- تاسو حامله یئي یا کیدلې شي وئي یا طلف ته شبدي ورکړئ.
- د ناروځی یا درملنی له امله مو دفاعي سیستم زیانمن شوی وي یا د ذاتي دفاعي سیستم (ټو امیون) د ناروغ په توګه مو تشخيص شوی وي.
- د پخوانی واکسین کولو یا عملیات سره تاسو بې هېښه شوی یاست، یا د ستني کولو اړوند د لوری کېږي ویره لرئ. د روغتیا پاملنۍ چمتو کوونکي ممکن ستاسو د ملاتير لپاره تاسو ته د مرستي ورانديز وکړي، د بېګکي په توګه د دې ورانديز کول چې تاسو واکسین په ملاستي وکړئ ترڅو د بې هېښی مخه ونبول شي.
- تاسو د خونریزی ناروځی لرئ یا داسي درمل کاروئ چې کولی شي د ويني په ټوکتني کېدلو باندي اغیزه وکړي. دا معلومات به د روغتیا چمتو کوونکي سره مرسته وکړي چې د ستني څخه د خونریزی یا زخمی کېدلو مخه ونیسي.
- تاسو په تیرو 14 ورڅو کي بل کوم واکسین ترلاسه کړي وي (د کووید-19 واکسین نه).

د ځاګري نفوس لیاره د واکسین سیارش تټي لارېشود سند د هغو خلکو لپاره اضافي معلومات ورلاندي کوي چې طفل ته شپږي ورکوي یا اميندواره وي، حساسیت لري، ذاتي دفاعي سیستم (ٺيو اميون) ناروغۍ لري، یاد ناروغۍ یا درملنۍ له امله یې دفاعي سیستم زیانمن شوي وي، او همدارګه د هغو نوبو خوانانو لپاره چې د کووید-19 څخه د جدي پایلو له خورا لور خطر سره مخ وي. که تاسو پدي اړه پيونتې لرئ چې ایا ستاسو د طبی حالت پراساس واکسین کول درته سم دی او کنه تاسو باید د څيل روغتیا پاملنې چمتو کوونکي سره غږپږي.

څوک باید د دې واکسینو په ترلاسه کولو کې ځنډ وکړي؟

- هغه اشخاص چې په تیرو 14 ورځو کي ېې بل کوم واکسین ترلاسه کړي وي (د کووید-19 واکسین نه).
- هغه اشخاص چې د لنډمهالي ناروغۍ ټښي لري؛ دا اشخاص باید تر هغه وخته انتظار وباسې چې ټښي په بشپړ ډول حل شوي وي ترڅو د ناروغۍ له امله رامینځته شوي اخلاقلاتو مختنيوی وشي ترڅو د واکسین پوري اړونده اغیزو ته زیان ورسوی.
- هغه خلک چې د کووید-19 ټښي لري. د کووید-19 د انتقال خطر کمولو لپاره، که چېږي دا اشخاص د واکسین کلينيك/ محل ته ورشي، دوى ته به لارېشونه وشي چې د سيمه ايزې عامې روغتیا اداري او سنې اقدامات تعقیب کري او معایناتو کولو ته به و هڅوں شي.
- د کرونابسکاره اوپې علامې لرونکي اشخاص چې د مشکوک یا تایید شوي کووید-19 انفکشن له امله یا د کووید-19 قضيې سره د نېړدي اړيکي له امله ورته د ئجان منزوی کولو ویل شوي باید د واکسین کلينيك ته حاضر نه شي او انتظار وباسې تر څو د واکسین ترلاسه کولو ترمه د دوى د انزوا موده پاي ته ورسېږي.

واکسین څرګه ګول کېږي؟

واکسین د یوی ستني په تګه د څګل پاسنې برخه (د دیلتويډ عضله) کي ګول کېږي. ولايت د اینې ګبدو د ملي مشاورت د کمېتې یه دی سیارش تټو عمل کوي چې کووید-19 لپاره د فایزر/بايونتك، مادرنا او استرازنکا/کوویشیلاد د واکسینو د لوړۍ خوراک نه وروسته تر دویم خوراک پوري وقهه تر 4 میاشتو پوري اورده وکړي.

- د فایزر/بلینټک د واکسینو لپاره د لوړۍ خوراک څخه دویم خوراک پوري سپارش تنه شوي وقهه 4 میاشتني ده.
- د مادرنا واکسینو لپاره د لوړۍ خوراک نه وروسته دویم خوراک پوري سپارش تنه شوي وقهه 4 میاشتني ده.
- د استرازنکا او کوویشیلاد واکسینو لپاره د لوړۍ خوراک نه وروسته دویم خوراک پوري سپارش تنه شوي وقهه 4 میاشتني ده.

افرادو ته باید د واکسینو د بشپړ تسلسل لپاره د کووید-19 یو واحد واکسیني تولید ګټول شي (یعنې یو فرد ته باید د هماګه یو واکسین لوړۍ او دویم خوراک ګټول شي) د مختلفو ډولونو واکسینونه (لكه viral vector، mRNA) باید مختلف واکسینونه ګټول شي او باید په یو واحد تسلسل کې ونه کارول شي.

په واکسینونو کي شامل مواد خه شى دي؟

استرازنيكا او کوويشيلد	مادرنا	فائزر/بايوتك	شامل مواد
غیر نقل والا ويرل (ChAd)	mRNA	mRNA	طبی
Disodium edetate dihydrate (EDTA) ایتانول L-Histidine L-Histidine hydrochloride monohydrate Polysorbate 80	distearoyl--1,2 sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC) کولفتروول PEG2000 DMG SM-102	ALC-0315 ALC-0159 – a polyethylene glycol (PEG) Distearoyl--1,2 sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC) کولفتروول	ليبيذ
Magnesium chloride hexahydrate Sodium chloride	Acetic acid Sodium acetate trihydrate Tromethamine Tromethamine hydrochloride	Dibasic sodium phosphate dihydrate Monobasic potassium phosphate Potassium chloride Sodium chloride	ملکي
سوکروز	سوکروز	سوکروز	شکر
پيچكاری لپاره او به	پيچكاری لپاره او به	پيچكاری لپاره او به	

دي ليست ته په احتیاط سره کته کول مهم دي څکه جي ځینې خلکښن ایې د **polyethylene glycol (PEG)**، او **tromethamine** او/يا **polysorbate 80** په شمول دي شاملو موادو سره حساسیت ولري. خو دا پېر شاذ و نادر حساسیتی غږکون رامینځته کوي. Polyethylene glycol (PEG) په داسې تولیداتو کي موندل کېږي لکه دوایاني، کولونسکوپي لپاره د کولمو د چمتو کولو تولیدات، جلاپیات، هت وخی شربتونه، د سیگار تولیدات، د پوستکي ملهمونه، هغه طبی تولیدات چې په پوستکي او د عملیاتو پر مهال کارول کېږي، د غلبونو پاسته کنتکت لینسونه او د کتفکت لینسونو د حل مواد. Polyethylene glycol همداراز د خوراک او چېن اک تولیداتو کي موندل کېډلی شي، خو د خوراک او چېن اک خخه بې حساسیتی غږکونونه معلوم ندي. Polysorbate 80 په طبی تولیداتو په چمتو کونونکو (لکویتامینې تیلوګولو، او سرطان ضد مواد) او د سیگار تولیداتو کي موندل کېډلی شي. Tromethamine د کټر است میدیا، د خولی او پارینترال دوایانو یوه برخه ده.

د واکسین جانبي عوارض خه شى دى؟

د کووید-19 واکسینونه، د نورو واکسینو په خير، ممکن د جانبي عوارضو لامل شي، که خه هم هرڅوک دا نه تجربه کوي او کوم کسان چي دا تجربه کوي اکثرا د کوچنيو جانبي عوارضو راپور ورکوي. د کووید-19 واکسین ترلاسه کولو وروسته بيرى عام راپور شوي جانبي عوارض ځائي غړگونونه دي په شمول د ستي کولو ځاي کي درد، سوروالى یا پرسوب، ستریا، سر درد، د عضلاتو درد، د مفصلونو درد، لرزه او خفيفه تبه.

پدي کووید-19 واکسینونو باندي روانې مطالعې یې چي تر نزنېتې موندل شوي جدي جانبي عوارض پير نادر دي. هغه خلک چي پدي مطالعاتو کي یې واکسین ترلاسه کريدي د اوردهاله جانبي عوارضو لپاره خارل کيري.

د کلينيك کارمندان چمتواли لري چي د پېښېل په صورت کي شديد حساسيتی غړگون اداره کري. کله چي د کووید-19 واکسین دويم دوز ترلاسه کوي، نو د روغتیا پاملنۍ چمتو کوونکي ته خوک چي تاسو ته دويم دوز درکوي ووايast که چيري تاسو د لوړي دوز وروسته کوم دوں جانبي عوارض درلودل.

په دير ندرت سره، د استرازنيكا/کووېشيل واکسین د واکسین کولو وروسته د یو غيرمعمولې وينېتوتھه کيدو سره تراو لرلې دی. داکران دا د "vaccine-induced prothrombotic immune thrombocytopenia" په نوم يادوي. دا د وينېتوتھي دوه مهمي ځاګړتیاوي لري: دا د واکسین کېدلو وروسته له 4 خخه تر 20 ورڅو پېښېري، او دا هتیت پلټنیونو (د وينې هغه کوچنۍ حجري چي خونریزی مخنيوي لپاره د وينېتوتھي جوري دوکي مرسته کوي) سره تراو لري. داسي معلومېري چي VIPIT دير نادر پېښېري، په هر 125,000 خلکوکي له 1 کس خخه تر هر 1 میلون کسانو کي 1 کس نه پېښېري. دا حالت د 55 کالو خخه کم عمر لرونک ميرمنو کي خورا عام دي. مهرباني وکړئ د نورو معلوماتو لپاره [VIPIT Following AstraZeneca COVID-19 Vaccination](#) ګورئ.

د کانادا روغتیا اداري دا حالت ارزیابی کري او دا یې پهکوتھه کري چي د کووید-19 خخه د کانادايانو په ساته کي د استرازنيكا/کووېشيل واکسینګتېسي د هغې د خترونو په پرتله دېري دي. د وينېتوتھه کيدل عام دي، په ځاګړي تونکه په زړو خلکو کي. په خپله کووید-19 د وينېتوتھه کولو سره تراو لري، ځکه نو د کووید-19 تسلول واکسین لاهم د هغو خلکو لپاره وړاندیز کېږي چي په تېرو وختونو کي یې د وينېتوتھه کېدلو ستونزه درلوده، يا هغه خوک چي د وينېتوتھه کيدو موروثي سابقه لري او د وينې نري کولو درمل کاروي.

زه خپل د روغتیا پاملنۍ چمتو کوونکي ته کله بايد تلیفون وکرم؟

که تاسو داسي جانبي عوارض تجربه کري چي تاسو انډۍ من کوي یا داسي نه برېښې چي د خو ورڅو وروسته د مینځه لار شي، نو خپل د روغتیا پاملنۍ چمتو کوونکي سره اړیکه ونسی یا د روغتیا پاملنۍ غښتنه وکړئ.

که چيري د واکسین کولو وروسته د دریو ورڅو په موده کي لاندې ذکر شوی کوم یو منفي غړگون ولرئ نو نېړدي عاجلي ځاګې ته لار شي یا **911** ته زنګ ووه:

• لمې

- د مخ يا خولي پرسوب
- په ساه اخپستلو کي ستونزه
- د رنگ زيات پیکه والی او جدي بېخواي
- لوره تبه (له 40 سانتي گرید څخه پورته)
- نتشنج يا حمله راتلل
- نوري جدي علامي (د بېگني په تکه، ستني چو خبدل يا بي حسي)

که تاسو د استرازينيكا /کووبيشيل واكسين کري وي او تاسو د واكسين کولو وروسته لاندي کومه یوه علامه ولرئ، سمدلاسه روغتنيا پاملننه ترلاسه کري:

- ساه لندی
- په سينه کي درد
- په لاس يا پنه کي پرسوب يا سوروالی
- پلګپدہ کي دوامداره درد
- جدي يا مخ په خرابيدو سر درد يا د نظر تبدل
- متعدد کوچني زخمونه، سره يا ارغوانی رګه خاپونه يا د پوستکي لاندي وينه لرونکي تنه اکي همدارکه تاسو کولي شئ د خپلي سيمه ايزى عالمي روغتنيا خاکي سره د پعنـتنو کولو يا منفي غېگون راپور ورکولو لپاره اريکه ونيسي.

د خپل دويم دوز واكسين لپاره کله بيرته راشم؟

که دا ستاسو د کووید-19 واكسين لومړي دوز وي، نو دا یقيني کري چي خپل دويم دوز واكسين لپاره بيرته راشئ لکه خگه چي تاسو ته د واكسين کلينيك لارښونه کري يا د روغتنيا پاملنني چمتو کوونکي چا چي تاسو ته لومړي دوز درکريدي. دا مهمه ده چي تاسو د واكسين دوه دوزه ترلاسه کري چکه چي د کووید-19 پروراندي محافظت تر هغه وخته پوري مطلوبه نه نلري ترڅو چي د واكسين دويم دوز ترلاسه نشي. کله چي د واكسين دويم دوز لپاره راخئ نو خپل د واكسين رېکارډ له خانه سره راوړئ. دا خورا مهمه ده چي تاسو دويم دوز ترلاسه کري ولو که تاسو په اول دوز کي جاني عوارض هم لول.

که کومه پعنـته لرم نو باید چا سره تماس ونیسم؟

که تاسو کومه پعنـته لرئ نو مهربانۍ وکړئ خپل د روغتنيا پاملنني چمتو کوونکي يا هغه شخص سره چي واكسين درکوي اريکه ونيسي.