

衛生廳

COVID-19 疫苗接種後

2.0 版本 2021 年 3 月 29 日

隨後數天，預期會有什麼情況？

- 常見副作用有注射部位疼痛、紅腫、疲勞、頭痛、肌肉痛、發冷、關節痛和低燒。
- 很少發生嚴重副作用。如果接種疫苗後三天內出現以下不良反應，請致電醫生或執業護士，或就近去急診科：皮疹、臉部或口腔腫脹、呼吸困難、面色蒼白和嚴重嗜睡嚴重、高燒（40° C 以上）、抽搐或痙攣，或是其他嚴重症狀（如「針刺感」即麻木）。
- 阿斯利康/COVISHIELD 疫苗與一種非常罕見的副作用有關，稱為[疫苗誘導的血栓性免疫血小板減少症（VIPIT）](#)。如果您在接種疫苗後出現以下任何症狀，請立即就醫：呼吸急促、胸痛、手臂或腿部腫脹或冰涼、持久性腹痛、嚴重或加重的頭痛或視力模糊，或是多處小瘀傷、紅色或紫色斑點或皮下血泡。

我還需要遵循 COVID-19 公共衛生措施嗎？

- 疫苗是保護自己免受 COVID-19 感染的另一種途徑。接種任一劑 COVID-19 疫苗後，您應繼續遵循 COVID-19 防疫措施，如戴口罩、保持身體距離和洗手。
- 留意是否出現 COVID-19 症狀，如果出現症狀，應接受檢測。

我應該何時回來接種第二劑？

- 您需接種兩劑疫苗才能完全免疫。如果這是您接種的第一劑 COVID-19 疫苗，請務必按照接種診所或預約系統的指示接種第二劑。按預約前去接種第二劑時，務必帶上今天列印給您的疫苗憑據。