

پس از دریافت واکسن COVID-19

نسخه 2.0، 29 مارس 2021

طی چند روز آینده باید انتظار چه مواردی را داشته باشم؟

- عوارض جانبی رایج عبارتند از درد، قرمزی، تورم در محل تزریق، خستگی، سردرد، درد عضلانی، لرز، درد مفاصل، و تب پایین.
- عوارض جانبی جدی نادر هستند. در صورت بروز هر یک از واکنش‌های نامطلوب زیر ظرف سه روز پس از دریافت واکسن، با پزشک یا کارشناس پرستاری خود تماس بگیرید یا به نزدیکترین بخش اورژانس مراجعه کنید: کهیر، تورم صورت یا دهان، مشکل تنفسی، رنگ پریدگی شدید یا خواب‌آلودگی حاد، تب بالا (بیش از 40 درجه سانتیگراد)، حملات صرع یا تشنج، یا سایر علائم جدی (مانند حس "سوزن سوزن" شدن یا کرختی).
- واکسن AstraZeneca/COVISHIELD با نوعی بسیار نادر از عوارض جانبی موسوم به [ترومبوسیتوپنی ایمنی پروترومبوتیک ناشی از واکسن \(VIPIT\)](#) مرتبط شناخته می‌شود. اگر بعد از دریافت واکسن دچار هر یک از علائم زیر شدید، لطفاً فوراً به دنبال مراقبت‌های پزشکی باشید: تنگی نفس، درد در قفسه سینه، تورم یا سردی در بازو یا پا، درد مداوم شکم، سردرد یا تاری چشم حاد یا در حال بدتر شدن، کبودی‌های متعدد کوچک، نقطه‌های قرمز یا بنفش یا تاول‌های خونی زیر پوست.

آیا همچنان باید اقدامات بهداشت عمومی را رعایت کنم؟

- این واکسن یک روش دیگر برای محافظت از شما در برابر COVID-19 است. پس از هر یک از دوزهای واکسن COVID-19، شما باید به رعایت اقدامات مربوط به COVID-19 ادامه دهید، از جمله استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری فیزیکی و شستن دست‌ها.
- علائم COVID-19 را تحت نظارت داشته باشید و در صورت بروز علائم، آزمایش بدهید.

چه زمانی باید برای دوز دوم واکسن خود مراجعه کنم؟

- برای اینکه کاملاً ایمن شوید، به دو دوز واکسن نیاز دارید. اگر این اولین دوز از واکسن COVID-19 شماست، مطمئن شوید که دومین دوز خود را مطابق با دستور کلینیک یا سیستم رزرو وقت دریافت کنید. رسیدن چابی واکسن خود را که امروز به شما داده شده، در نوبت مراجعه دوم همراه خود بیاورید.