

Gesundheitsministerium [Ministry of Health]

Nach der COVID-19 Impfung

Version 2.0 29. März 2021

Was kann ich in den nächsten Tagen erwarten?

- Häufige Nebenwirkungen sind Schmerzen, Rötung, Schwellung an der Einstichstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Schüttelfrost, Gelenkschmerzen und leichtes Fieber.
- Ernsthafte Nebenwirkungen sind selten. Rufen Sie Ihren Arzt oder Ihre Krankenschwester an oder gehen Sie in die nächste Notaufnahme, wenn innerhalb der nächsten drei Tage nach der Impfung eine der folgenden Nebenwirkungen auftritt: Nesselfieber, Schwellung im Gesicht oder im Mund, Atembeschwerden, sehr blasse Hautfarbe und starke Müdigkeit, hohes Fieber (über 40 °C), Krampfanfälle oder andere schwerwiegende Symptome (z. B. "Kribbeln" oder Taubheitsgefühl).
- Der AstraZeneca/COVISHIELD Impfstoff ist mit einer sehr seltenen Nebenwirkung verbunden, die als [Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia \(VIPIT\)](#) [Impfstoff-induzierte prothrombotische Immunthrombozytopenie (VIPIT)] bekannt ist. Wenn sich nach der Impfung eines der folgenden Symptome entwickelt, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf: Kurzatmigkeit, Schmerzen in der Brust, Schwellung oder Kältegefühl im Arm oder Bein, anhaltende Unterleibsschmerzen, schwere oder sich verschlimmernde Kopfschmerzen oder Sehstörungen, mehrere kleine Blutergüsse, rote bzw. blaurote Flecken oder Blutbläschen unter der Haut.

Muss ich weiterhin die öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen für COVID-19 befolgen?

- Der Impfstoff ist ein ergänzender Schutz gegen COVID-19. Nach jeder Dosis des COVID-19-Impfstoffs sollten Sie sich weiterhin an die dementsprechenden öffentlichen Maßnahmen halten, wie das Tragen einer Maske, die Beibehaltung von körperlichem Abstand und gründliches Waschen Ihrer Hände.
- Achten Sie auf Symptome von COVID-19 und lassen Sie sich testen, wenn diese auftreten.

Wann sollte ich zu meiner zweiten Dosis zurückkehren?

- Sie benötigen zwei Dosen des Impfstoffs, um vollständig geschützt zu sein. Wenn dies Ihre erste Impfstoffdosis gegen COVID-19 ist, müssen Sie die zweite Dosis gemäß den Anweisungen der Klinik oder des Buchungssystems vornehmen. Bringen Sie die Kopie der Impfquittung, die Sie heute erhalten haben, zu Ihrem zweiten Termin mit.