

보건부

COVID-19 백신 접종 후

버전 2.0 – 2021 년 3 월 29 일

다음 며칠간 어떤 것을 예상해야 하나요?

- 일반적인 부작용으로는 통증, 빨개짐, 주사 부위의 부기, 피로, 두통, 근육통, 오한, 관절통, 미열이 있습니다.
- 심각한 부작용은 드뭅니다. 백신 접종 후 3 일 이내에 다음과 같은 부작용이 발생하는 경우, 의사나 전문 간호사에게 전화하거나 가까운 응급실로 가십시오: 두드러기, 얼굴이나 입의 부기, 호흡 곤란, 매우 창백한 안색과 심각한 졸림, 고열(40°C 이상), 경련이나 발작, 또는 기타 심각한 증상(예 : "찌릿함" 또는 무감각)
- 아스트라제네카/코비실드 백신은 [백신 유발 부혈전 면역 혈소판 감소증\(VIPIT\)](#)으로 알려진 매우 드문 부작용과 관련이 있습니다. 백신 접종 후 다음과 같은 증상이 나타나면 즉각적인 치료를 받으십시오: 숨참, 가슴 통증, 팔이나 다리의 부기 또는 차가움, 지속적인 복통, 심각하거나 악화되는 두통 또는 흐린 시력, 여러 개의 작은 멍, 붉은 색이나 보라색 반점 또는 피부 아래의 피 물집.

여전히 COVID-19 공중 보건 대책을 따라야 하나요?

- COVID-19 백신 접종 후에는 마스크 착용, 물리적 거리 두기, 손 씻기 같은 COVID-19 방역 대책을 계속 따라야합니다.
- COVID-19 증상을 모니터링하시고 증상이 있으면 검사를 받으십시오.

언제 2 차 접종을 받으러 가야 하나요?

- 완전 예방 접종이 이루어지려면 2 회 접종이 필요합니다. 이것이 1 차 COVID-19 백신 접종인 경우, 클리닉 또는 예약 시스템의 지시에 따라 2 차 접종을 받으러 가십시오. 오늘 받으신 백신 접종 영수증을 2 차 예약 방문에 지참하십시오.