

ستاسو د کووید-19 واکسین کولو څخه وروسته

2.0 نسخه مارچ 29، 2021

په راتلونکو څو ورځو کې باید د څه تمه ولرم؟

- په عادي متوقع جانبي عوارضو کې لاندې څه شامل دي: د ستنې کولو ځای کې درد، سوروالی یا پړسوب، ستړیا، سر درد، د عضلاتو درد، لږزه، د مفصلونو درد، اوبتېټه تبه.
- د واکسین تر لاسه کولو وروسته شدید جانبي عوارض نادر دي. خو بیا هم، که تاسو د واکسین کولو وروسته د دريو ورځو موده کې دننه لاندې کوم منفي غبگبون ولرئ، خپل ډاکټر یا نرس سره اړیکه ونیسئ او یا د روغتون عاجل یا بیرنۍ څنګې ته ورشئ: لرمې، د مخ یا خولې پړسوب، په ساه اخیستلو کې ستونزه، د رنگ زیات پیکه والی او جدي بېخوابي، لوړه تبه (له 40 سانتیګریډ څخه پورته)، تشنج یا حمله راتلل، نورې جدي علامې (د بیګې په تګه، ستنې چوڅېدل یا بې حسې).
- استراژنیک/کووید شیلډ واکسین له ډیر نادر جانبي عوارض سره تړاو لري چې د [Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia \(VIPIT\)](#) په نوم یادېږي. ددې واکسین له تطبیق وروسته د لاندې حالتونو د رامنځته کېدو په صورت کې، روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړئ: په ساه اخیستو کې ستونزه، د سینې درد، په ښو او مت کې د پړسوب یا یخنی احساس کول، د خټې دوامدار درد، سخت سر درد چې لاپسي زیاتېږي او د سترګو تیاره کیدل، د پوستکي پرمخ څو تور داغونه، او د پوستکي لاندې سري یګلابي نقطې.

ایا اوس هم باید د کووید-19 په باب د عامې روغتیا تدابیر رعایت کړم؟

- واکسین د کووید-19 په وړاندې د ځان د حفاظت یوه بله لاره ده. د واکسین د هر ډوز له اخیستلو وروسته باید تاسو د کووید-19 په باب د عامې روغتیا ادارې تدابیر لکه د ماسک اغوستل، د فزیکي وېن رعایت او د لاسونو مینځل په پام کې ونیسئ.
- د کووید-19 علایم وڅارئ او د علایمو د موجودیت په صورت کې، خپل معاینات ترسره کړئ.

د خپل دویم ډوز واکسین کولو لپاره کله بیرته راشم؟

- د پوره مصنوئیت لپاره تاسو د واکسین دوه ډوزونو ته اړتیا لرئ. که دا ستاسو د کووید-19 واکسین لومړی ډوز وي، نو دا یقیني کړئ چې د کلینیک یا اړونده سیستم د لارښوونې په اساس خپل دویم ډوز واکسین تر لاسه کړئ. د واکسین د تطبیق چاپ شوی رسید چې نن تاسو ته درکړل شو، د دویم ډوز د تر لاسه کولو په ورځ له ځانه سره راوړئ.