

Ministerstwo Zdrowia

# Po szczepionce przeciw COVID-19

Wersja 2.0, 29 marca 2021

## Czego mogę się spodziewać w ciągu najbliższych kilku dni?

- Częste skutki uboczne to ból, zaczerwienienie, obrzęk w miejscu wktucia igły, zmęczenie, ból głowy, bóle mięśni, dreszcze, bóle stawów i niewielka gorączka.
- Poważne skutki uboczne są rzadkie. Skontaktuj się z lekarzem lub pielęgniarką albo udaj się do najbliższego oddziału pogotowia ratunkowego, jeśli w ciągu trzech dni po szczepieniu wystąpi u Ciebie jakakolwiek z następujących niepożądanych reakcji: pokrzywka, obrzęk twarzy lub ust, trudności z oddychaniem, bardzo blada skóra i znaczna senność, wysoka gorączka (ponad 40°C), konwulsje lub napady drgawkowe, lub inne poważne objawy (np. mrowienie lub drętwienie).
- Szczepionka AstraZeneca/COVISHIELD jest kojarzone z bardzo rzadkim objawem ubocznym zwanym [poszczepionkowa małopłytkowość odpornościowa na zakrzepicę \(VIPIT\)](#). Natychmiast zwróć się do lekarza w przypadku wystąpienia następujących objawów po przyjęciu szczepionki: zadyszka, ból w klatce piersiowej, obrzęk lub uczucie zimna w ramieniu lub nodze, uporczywy ból brzucha, silne lub pogarszające się bóle głowy lub nieostre widzenie, lub liczne niewielkie siniaki, czerwone lub fioletowe plamki lub pęcherzyki krwi pod skórą.

## Czy muszę nadal przestrzegać zaleceń zdrowia publicznego w zakresie COVID-19?

- Szczepionka to dodatkowy sposób ochrony przed COVID-19. Po każdej dawce szczepionki należy nadal przestrzegać zaleceń w zakresie COVID-19, takich jak noszenie maseczki, dystans fizyczny i mycie rąk.
- Zwracaj uwagę na objawy COVID-19 i przetestuj się, jeśli masz objawy.

## Kiedy należy przyjąć drugą dawkę?

- Uzyskanie pełnego zabezpieczenia wymaga dwóch dawek szczepionki. Jeśli przyjmujesz pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19, koniecznie przyjmij drugą dawkę zgodnie z zaleceniami przychodni lub systemu rejestracji. Na drugą wizytę przynieś ze sobą na potwierdzenie szczepienia otrzymane dzisiaj.